

হোমিওপ্যাথি-প্রচার]

[ তৃতীয় সংখ্যা।

হোমিওপ্যাথিমতে  
জ্বর-চিকিৎসা।

বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত

তিনভাগ-একত্র

নূতন সংস্করণ।

শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্তী কর্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

ঢাকা।

মহেশ্বর-যন্ত্রে শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী

কর্তৃক মুদ্রিত।

১৩০১

১০ই ভাদ্র।

*All Rights Reserved.*

বিজ্ঞাপন ।

# শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্তীকৃত

হোমিওপ্যাথিক পুস্তক ।

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রদর্শিকা ।

---

পঞ্চম সংস্করণ ।

ইহাতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া, আদিকার, আয়মিক প্রয়োগ, লক্ষণাদি সমস্ত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় ; ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহারতত্ত্ব ; এবং সকল রোগের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ, কারণ ও চিকিৎসাদি সন্নিবিষ্ট আছে । সংক্ষেপতঃ একখানি পুস্তক অবলম্বনে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা ও চিকিৎসার জ্ঞানই এই পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহা গৃহস্থ, ছাত্র, ও চিকিৎসক সকলের পক্ষেই উপযোগী । আকার বয়েল আটপেজি ১০৬০ পৃষ্ঠা । মূল্য ৫।০ টাকা, ডাকমাণ্ডলাদি ৮০ আনা । পুস্তকের প্রাপ্তিতে সমালোচনা দ্রষ্টব্য ।

---

## ওলাউঠার চিকিৎসা ।

ডিমাই ১২ পেজি ১৩২ পৃষ্ঠা । মূল্য ৮।০ আনা, ডাক মাণ্ডল ২১০ আনা । এই পুস্তকে ওলাউঠার নিদানাদি ও চিকিৎসাদি সম্বন্ধে অনেক নূতন ও প্রয়োজনীয় বিষয় আছে । ভৈষজ্যতত্ত্বের প্রথমে সমালোচনা দ্রষ্টব্য । ২০১. কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, ত্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাওয়া যায় ।

---

ଆସିବି ଆଶ୍ରୟନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟ ଉପଚୟ, ଉପଶୟ, ପର୍ଯ୍ୟାସ ଓ ଦେଶକାଳାଦିର ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଷ । ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ବାଚୀତ ଔଷଧେର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପିତ ହୁଏ ନା, ଏବଂ ଔଷଧେର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ବାଚୀତ ଅକୃତ ଔଷଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରା যায় না ।  
 বিশେଷ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣି ଆସିବି ଅକୃତ ଲକ୍ଷଣେର ଆଲୁସନ୍ନିକ । ଉଦାହରଣ ମୂଳ ଲକ୍ଷଣ ପରି-  
 ତାଗ କବିବା କେବଳ ଆଲୁସନ୍ନିକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣେର ବାଳ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କବା  
 ବିହିତ ନହେ । ଔଷଧେର ସାଧାରଣ ଓ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣେର ସମସ୍ତ  
 ବୋଗୀର ଲକ୍ଷଣେର ସହିତ ଐକ୍ୟ କବିସାହି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ  
 କେବଳ କେବଳ ବୋଗେ ଓ କେବଳ କେବଳ ଔଷଧେ ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ୟକ୍ ସାଦୃଶ୍ୟ ନିରୂ-  
 ପଣ କରା ସମ୍ଭବ ନହେ । ସେ ସକଳ ସ୍ତରେ କେବଳ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିସାହି  
 ଔଷଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ରୋଗେର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣେ ଓ ଔଷଧେର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣେ  
 ଠିକ୍ ସାଦୃଶ୍ୟ ଥାକିଲେ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ଆବୋଗ୍ୟ ହୁଏ । ଏହି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣି ବଡ଼ି  
 ଆୟୋଜନୀୟ ।

୪ । ବ୍ୟାଧି ଏକାକୀନ ବୋଗ ନହେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବାକୀନ ବୋଗ । ପ୍ରତ୍ୟେକ  
 ବ୍ୟାଧିର ଆବିର୍ଭାବକ କ୍ରିୟାର ଓ ବିବାଦେ ଏକାକୀନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସେ ଏକାକୀନ ସ୍ଥିତି  
 ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ହୁଏ । ଅତଏବ ବୋଗୀର ପ୍ରକୃତିଗତ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ  
 ଗୁଣିର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରାହଣ ପ୍ରକୃତ ଔଷଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କବିତେ ପାରିଲେ ଏକାକୀନ  
 ଲକ୍ଷଣେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କବିତେ ଓ ସର୍ବାକୀନ ଲକ୍ଷଣ ଦୂରୀକୃତ ହୁଏ ।

୫ । ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣି ବୋଗେର ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାରୀରିକ  
 ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଗେର ପ୍ରକୃତ ଗୁଣି । ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା, ବୋଗେର ନିଦାନ, ରୂପ,  
 ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତି (ପାଥଲଜି), ଗତି ଓ ବିଶେଷ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୋଗୀର ବାହ୍ୟ,  
 ଜୀବନସ୍ଥିତି ଓ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରାପ୍ତିର ମୂଳ ଓ ଔଷଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଆୟୋଗ  
 କବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ବୋଗୀର ଲକ୍ଷଣ ସକଳେର ସମସ୍ତ ଏକାକୀନ ମନେ କବିସାହି ଠିକ୍  
 ତାହାର ସଦୃଶ ଔଷଧ ନିରୂପଣ କବିବା ଗୋଟି ଉଚିତ । ଲକ୍ଷଣ ସମସ୍ତ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍  
 ପୁଞ୍ଜେ ବିଭକ୍ତ କବିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷଣ ପୁଞ୍ଜେ ଔଷଧ ହିସାବ କବା ବିହିତ ନହେ ।  
 କେବଳ ଔଷଧେର ଲକ୍ଷଣେ ଯଦି ବୋଗୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷଣେର ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରାହଣ ହେବ  
 ଆଶା କରା যায় না, ତখন ବିଶେଷ ବିଶେଷ ବୋଗୀର ପ୍ରକୃତିଗତ ବିଶେଷ ବିଶେଷ  
 ଲକ୍ଷଣ ନିରୂପଣ ଓ ବିଶେଷ (ସ୍ୟାନାଲିସିସ) କବିସାହି ତାହାର ସମ ଔଷଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ  
 କବା ଶ୍ରେୟ । ଲକ୍ଷଣ ବିଶେଷରେ ଚିକିତ୍ସାକେର ନୈମିତ୍ତିକ ଆକାଶ ପାୟ ଏବଂ ।

ইহাতে অকৃতকার্য্য হইলে বোগারোগেও অকৃতকার্য্য হইতে হয়। (বিশেষণ-প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত স্থানান্তরে দেওয়া হইল)।

৬। প্রকৃত সদৃশ ঔষধ প্রয়োজিত হইলে বোগের নিয়মিত বৃদ্ধির সময় রোগ বিবর্তিত হয় না। অতএব কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রয়োগের পরেও রোগের উপচয় (এগ্রাভেশন) উপস্থিত হইলে অথবা একেবারেই উপচয় উপস্থিত না হইয়া বোগ ক্রমে ক্রমে কঠিনতর হইয়া উঠিলে ঠিক সদৃশ ঔষধ যে নির্বাচিত ও প্রয়োজিত হয় নাই ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ঔষধ প্রয়োগে যেমন বোগের লক্ষণেব তীব্রতাব হ্রাস হয়, তেদ্বাক্ষর সময়ে সময়ে উহা বৃদ্ধিও পাইতে পাবে। এপ্রকার ঘটিলে এবং সম্প্রাপ্তি-গত কোন বৈলক্ষণ্য না জন্মিয়া থাকিলে ঔষধ পরিবর্তন না করিয়া পূর্ববৎ চিকিৎসা করা কর্তব্য। বোগীক কতকগুলি লক্ষণ অন্তর্ভুক্ত ও কতকগুলি পূর্ববৎ তীব্রাভাবে অবশিষ্ট থাকিলে যে ঔষধে এই প্রকার পরিবর্তন জন্মে তাহাই ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু চিকিৎসাকালে কখন কখন এরূপ নূতন ও স্বতন্ত্র লক্ষণরাশি প্রকাশিত হওয়া পড়ে যে পূর্বের লক্ষণ সকলের সহিত উহাদের কোন সম্বন্ধ থাকে না, এরূপ অবস্থায় ঔষধ পরিবর্তন করা আবশ্যিক।

৭। সাধাবশতঃ তৎকাল রোগে ঔষধেব নিয়ন্ত্রণ ও পুৰাতন বোগে উচ্চ-ক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বোগীক ধাতু, প্রকৃতি ও ঔষধ-গ্রাহিতা-শক্তি যখন ভিন্ন ভিন্ন, তখন মাত্রা ও ক্রম সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট নিয়ম নির্দ্ধারিত থাকা সম্ভবপর নহে। পুৰাতন বোগে নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা উচ্চক্রম অধিকতর ফলপ্রসূ। নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারে পুৰাতন বোগে অনেক সময় বোগের লক্ষণ বিবর্তিত হয়।

৮। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ পুনঃপ্রয়োগেব সাধারণ নিয়ম এই যে প্রয়োজিত ঔষধে নিশ্চিত উপকার দাশলে ঔষধ প্রয়োগে বিরত থাকিয়া শরীরের স্বাভাবিক আবেগা-শক্তিব কায়া হইতে দেওয়া উচিত। অনন্তর কৃত উপকার স্থগিত হইলে তৎকালীয় লক্ষণানুসারে সেই ঔষধ বা অত্র ঔষধ পুনরায় ব্যবহার করা কর্তব্য। (মংকৃত ভৈবজ্যাত্তে মাত্রা ও ক্রম বিচার কর্তব্য)।

৯। এলোপ্যাথি, কবিবাজী বা অত্র কোন মতে চিকিৎসিত কোন বোগীকে হোমিওপ্যাথিকমতে চিকিৎসা কবিত্তে হইলে পূর্ব ঔষধেব ক্রিয়া



নষ্ট করিবার নিমিত্ত চিকিৎসাব্যবস্থার এক হই মাত্রা কাম্ফা, নক্সতমিকা বা সলফার ব্যবহৃত হয়। একপ অবস্থায় অনেক সময় তরুণ বোলে নক্সতমিকা ও পুরাতন বোলে সলফার সমধিক উপযোগী।

১০। রক্তস্রাবস্থা ও গর্ভাবস্থায়ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

১১। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেৱন কালে অল্প কোন প্রকার ঔষধাদি, ঔষধ-গুণবিশিষ্ট জবা, ও কর্পূর সেৱন করা নিষিদ্ধ। ঔষধ সেৱনের অন্তর এক ঘটিকা পূর্বে বা পরে পান, তামাক ও জল খাওয়া কর্তব্য নহে।


১২। চিকিৎসক বোগ-পৰীক্ষাকালে রিপোর্টরিব পৰিচ্ছেদামূৰূপ রোগীর আত্মপূৰ্ণিক সমগ্র ইতিবৃত্ত জানিয়া বা লিখিয়া লইবেন, অর্থাৎ (১) জন্মের নিদান বা গৌণ ও মুখ্য কারণ; (২) গাত্র-তাপ; (৩) নাড়ীর অবস্থা; (৪) জরের অবস্থা, (ক) পূৰ্ণ লক্ষণ, (খ) শীতের আরম্ভ-স্থান, (গ) শীতের অবস্থান, (ঘ) শীতাবস্থায় প্রকাশিত সম্ভাব্য লক্ষণ; (ঙ) শীতের ভ্রাস-বৃদ্ধি; (চ) শীতের ছায় উত্তাপের বিশেষ, অবস্থা ৫ উত্তাপাবস্থায় প্রকাশিত লক্ষণাদি; (ছ) ঘর্মাবস্থার বিবরণ, অর্থাৎ ঘর্ম শীতল কি উষ্ণ, অধিক কি অল্প, শরীরের কোন স্থানে প্রকাশিত প্রভৃতি লক্ষণ, (জ) জরের অবস্থাত্তরে কোন অবস্থায় সমধিক প্রাবল্য বা একেবারে অভাব; (ঝ) বিরামকালীন লক্ষণ; (ঞ) বোগীর মানসিক লক্ষণ; (৫) রোগীর ধাতু; (৬) বিশেষ লক্ষণ অর্থাৎ অল্প কোন বোগীতে সচরাচর প্রকাশিত হয় না এমন কোন লক্ষণ, (৭) জ্বরের প্রকৃতি, (৮) জ্বরের উপস্থিতির সময়; ইত্যাদি বিবরণ গুলি লিখিয়া লইয়া বোগীর লক্ষণ বিশ্লেষণ পূৰ্ণক প্রকৃত ঔষধ নির্ধারিত করিবেন। (বিশ্লেষণ-প্রাক্রম্য দৃষ্টব্য)।

১৩। সন্ধান জ্বরের চিকিৎসায় শীতের আরম্ভ স্থান ও জ্বরের সময়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। কোন কোন প্রধান চিকিৎসক শীতের আরম্ভস্থান ঔষধ নির্ধারিত অতিশয় পাব্যধীন দান করেন।



## উপক্রমণিকা ।

গাত্রতাপ ।—তাপমান যন্ত্রদ্বারা শরীরের তাপের পরিমাণ সহজে নিকপিত হইয়া থাকে । চিকিৎসায় তাপমান যন্ত্রের নিত্যই আবশ্যক । একটি সেলফ রেজিষ্টারিং ক্লিনিক্যাল থার্মোমেটার রাখাই ভাল । তাপমান একটি পারদ পূর্ণ কাচের নল । ঐ নলের গায়ে কতকগুলি বেধা ও সংখ্যা আছে । উহার আকৃতি এইরূপ :—



ইহার এক একটা বড় রেখা এক ডিগ্রী ( অংশ ) এবং দুইটা বড় বেধার মধ্যে যে ক্ষুদ্র রেখা আছে উহার এক একটি এক ডিগ্রীর পঞ্চমাংশ জ্ঞাপক । ৯৮.৪ ডিগ্রীতে যে ক্ষুদ্র বানটিক আছে উহাকে ইণ্ডিক্স বা নির্দেশক চিহ্ন বলে । উহা শরীরের স্বাভাবিক তাপ জ্ঞাপক । তাপমানের ইনডেক্সস্থিত পারদ ( ক ) পর্যন্ত উখিত হইলে শরীর-তাপ ১০০°৪, ( খ ) পর্যন্ত উখিত হইলে ১০৩°৮, এবং ( গ ) পর্যন্ত উখিত হইলে ১১০ ডিগ্রী হয় । ক, খ, গ, অক্ষর গুলি তাপমানে নাই । কেবল সুবিধার্থে এখানে উল্লিখিত হইয়াছে । শরীরের তাপ গ্রহণ কবিরাব পূর্বে ইনডেক্স হইতে পারদ নাগাইয়া ৯৮.

ডিগ্রীতে আনিতে হয়। দক্ষিণ হস্তে তাপমানমাত্র ধারণ করিয়া আস্তে আস্তে বাম হস্ত-তলে আঘাত করিলেই পারদ নামিয়া আইসে। অমন্তব্য তাপমানেব কন্দদেশ বা পারদকুণ্ড বোগীর কক্ষতলে স্থাপন করিয়া ৫—১০ মিনিট রাখিতে হয়, পরে বাহির করিয়া দেখা যায় পারদ কত ডিগ্রী উঠিয়াছে। বস্তু উঠে বা নামে শরীরেব তাপ তত ডিগ্রী। তাপমান যত্ন রোগীর গাত্রে সংলগ্ন করিবার পবে উহা ধোত করিয়া বাখা উচিত।

স্বাস্থ্যস্থার মধ্য শরীরেব তাপ গড়ে ৯৮.৪ ; মুখগহ্বরেব তাপ ৯৯.৫ ; রক্তের তাপ ১০০ অংশ। শরীরেব তাপ ৯৯.৫ অংশেব উক্কে উঠিলে অথবা ৯৭.৩ অংশেব নিম্নে নামিলে কোন প্রকাব বোগ আছে বলিয়া বুঝা যায়। পারদ নিম্নে নামিলে দ্রুত অবসন্নকব রোগ, অথবা দীর্ঘকালব্যাপী বোগজনিত জীবনীশক্তিৰ ক্ষীণতা ; এবং উক্কে উঠিলে জন কিস্বা তৎসংস্থত অন্ত কোন ব্যাধিব বিদ্যমানতা বুঝায। ১০০ হইতে ১০১ সামান্ত জ্বব ; ১০৩২ অসুংকট জ্বর ; ১০৫ উৎকট জ্বব ; ১০৬—১০৭ সক্ষটস্থচক বা সাংঘাতিক জ্বর জ্ঞাপক। প্রতিদিন এক সময়ে বোগীর গাত্রতাপ পরীক্ষা করা কর্তব্য। পূর্ক্বে ও অপরাহ্ন ৮ ঘটিকা তাপ পরীক্ষাব প্রশস্ত সময়। উৎকট বোগে প্রতিদিন ৪।৫ বার গাত্র-তাপ পরীক্ষা কবা কর্তব্য।

গাত্রতাপ আড়াই ডিগ্রী অধিক হওয়া অপেক্ষা এক ডিগ্রী কম হওয়া অধিক আশঙ্কার কাৰণ। মস্তিষ্কেব আবরণ-ঝিল্লীৰ প্রদাহ, ও ফুসফুস প্রদাহ প্রভৃতি বোগে গাত্রতাপ ১০৬ বা ১০৭ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠিয়া থাকে। গাত্রতাপ ১০৮.৫ হইলে বোগীর নিশ্চয় মৃত্যু হয়। ১০৯ বা ১১০ ডিগ্রী আসন্ন মৃত্যু-জ্ঞাপক। পক্ষান্তরে অবিবাম জ্বর, সবিবাম জ্বর, অন্তবিধ জ্বব, পতনাবস্থা, ও ক্ষয়ক্ষয় পুরাতন বোগে স্বাভাবিক শারীরিক উত্তাপের অধিক পরিমাণে ক্রমাগত হ্রাসও মৃত্যুব আসন্নতা স্যাজক।

বালকের শরীরেব উত্তাপ যুবকেব শরীরেব উত্তাপ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। কখন কখন পাকশয়ের পীড়া বশতঃ বালকের গাত্রতাপ শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। অতএব কেবল তাপাংশ দৃষ্টে বালকদিগের উৎকট বোগ হইয়াছে সহসা এক্ষণ মনে করা বিহিত নহে।

• “টাইফয়েড জবে দ্বিতীয় সপ্তাহে সাধারণ তাপাংশ ১০২ বা ১০৩ হইলে

সামান্য অব. এবং ১০৫ বা তদুর্দ্ধ হইলে উৎকট অব বুঝা যায়। দ্বিতীয় সম্ভায়ে সন্ধ্যাকালে গাত্রতাপ কমিয়া যাইতে থাকিলে উহা টাইফয়েড অব নয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সম্মিপাত ও অন্ত্রাশ্র জরে রক্তপ্রাবাদি উপসর্গ উপস্থিত হইবার পূর্বে গাত্রতাপ বৃদ্ধি পায়। কম্পজরে জ্বর প্রকাশিত হইবার কতিপয় ঘটিকা পূর্বে হইতেই গাত্রতাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং উত্তাপেব অতিশয় আধিক্যে রোগের গাঢ়মূলতা বুঝায়। হামজরে পীড়কা বিনির্গত হইবার পরেও পুনরায় গাত্রতাপের বৃদ্ধি ফুসফুসের প্রদাহাদি উৎকট উপসর্গ সূচক। আমবাতে তাপাংশ ১০৪ হৃৎকোটে প্রদাহ, এবং হৃৎকোজরে ১০৫ পেলভিক সেলুলাইটিস উপস্তির সন্দেহ সূচক। ফুসফুস-প্রদাহে ১০৪ ভয়ব্যঞ্জক। বোগের আরোগ্যানু্য অবস্থায় গাত্রতাপের বৃদ্ধি পুনরাক্রমণ জ্ঞাপক। গাত্রতাপের আধিক্য প্রদাহের আনু্যঙ্গিক। অতএব প্রদাহের লাঘবের সঙ্গে সঙ্গে গাত্রতাপেরও লাঘব হয়। সন্ধ্যার সময় উত্তাপ বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাস পড়িলে স্নলক্ষণ মনে করিতে হয়। সন্ধ্যার সময় গাত্র-তাপ বাড়িলে, আত্মাশ্র স্নলক্ষণ থাকিলেও কোন উপসর্গ উপস্থিত হইতেছে বা পু্য জন্মিতেছে বুঝা যায়।”

নাড়ী, শ্বাস ও গাত্র তাপের সম্বন্ধ।—শরীরের উত্তাপ এক অংশ বর্দ্ধিত হইলে প্রতি মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন ১০ বাব ও শ্বাসের গতি ২।৩ বার বর্দ্ধিত হয়, যথা,—স্বভাবতঃ গাত্রতাপ ৯৮°৪ অংশ, এবং প্রতি-মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন ৭৫ ও শ্বাসের গতি ১৮ বার থাকিয়া যদি শরীরের উত্তাপ বর্দ্ধিত হইয়া ১০০ ডিগ্রী হয় তবে নাড়ীর স্পন্দন ৯০।৯৫ এবং শ্বাসের গতি প্রায় ২৩ হইবে। সামান্যতঃ স্নহাবস্থায় এক একবার শ্বাসে ৪ বার নাড়ীর স্পন্দন হয়।

নাড়ী।—শরীরের যে সকল শ্রোত (নালী) দ্বারা হৃৎপিণ্ড হইতে সর্ব্বশরীরে রক্ত প্রবাহিত হয় তাহাদিগকে ধমনী বা নাড়ী কহে। সাধা-রণতঃ মণিবন্ধে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে। গ্রীবা ও জাহ্নদেশেও নাড়ীর বেগ অনুভব করা যাইতে পারে। স্নহাবস্থায় সাধারণতঃ প্রতি-মিনিটে বয়ঃক্রমানু্যসারে যেরূপ নাড়ীর স্পন্দন হয় নিম্নে তাহার সংখ্যা উল্লিখিত হইল :—

জন্ম হইতে প্রথম বৎসর পর্য্যন্ত	প্রতিমিনিটে	১৪০ বার
দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় বৎসর পর্য্যন্ত	"	১২০ বার
চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ বৎসর পর্য্যন্ত	"	১০০ বার
সপ্তম হইতে সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্ত	"	৯০ বার
অষ্টাদশ হইতে পঞ্চাশৎ বৎসর পর্য্যন্ত	"	৭৫ বার
বৃদ্ধ বয়সে	"	৭০ বার

কোন কোন ব্যক্তির নাড়ী স্বভাবতঃই মৃদু বা দ্রুত থাকে। তাহা দেখিয়া রোগ মনে করা উচিত নহে। স্বাভাবিক স্পন্দন অপেক্ষা ৮।১০ বার নূন স্পন্দন হইলে জীবনী-শক্তি হ্রাস পড়িযাছে অনুমান করা কর্তব্য।

বিচক্ষণ চিকিৎসক অঙ্গুলী দ্বাবাই নাড়ীর গতি নিকূর্ণ করিতে পারেন। কুল, কোমল ও দ্রুত নাড়ী অবযোগেণ পূর্ণায়া জ্ঞাপক। দ্রুত, কঠিন ও পূর্ণ নাড়ী প্রদাহশূচক। আহাযান্ত্রে বা সন্দ্যাকালে নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি বিলোপী জরোব লক্ষণ। নাড়ীর বিষম গতি, পর্যায়শীলতা ও উৎক্ৰেপণ ছত্রোগেণ পবিচায়ক। ক্ষীণ সূত্রবৎ নাড়ী, দ্রুত অবসাদকর রোগ অর্থাৎ বিহরিকা ও রক্তস্রাবাদি হইতে উৎপন্ন হয়।

হৃৎপিণ্ডের আকৃষ্ণনের নূনাদিক্য অল্পসাবে নাড়ীর মন্দ বা দ্রুতগতি জন্মে। নাড়ীর দ্রুতগতি দ্বাবা স্নায়বীয় বোগ এবং দুর্বলতা সহকারে উত্তেজনা বুঝা যায়। এক আকৃষ্ণন হইতে অল্প আকৃষ্ণনের মধ্যবর্তী সময় প্রতিনিয়ত সমান হইলে নাড়ীর সমগতি এবং মধ্য মধ্য দ্রুত ও মধ্য মধ্য মন্দ হইলে বিষমগতি বলে। সময়ে সময়ে নাড়ীর স্পন্দন বিলুপ্ত হইলে উহাকে ক্ষণ-বিলুপ্ত বা পর্যায়শীল নাড়ী কহে। নাড়ীর সমগতি সুলক্ষণ। রক্ত-সঞ্চলন, নিশ্বাস ও স্নায়ুগুলের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য। নাড়ীর বিষমগতি জন্মিবার কাৰণ। সাধাবণতঃ হৃৎপিণ্ড বা হৃৎসূত্রে রক্তসঞ্চলনের ব্যাঘাত বশতঃ নাড়ী পর্যায়শীল হয়। হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনীতে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাহাব পবিমাণানুসাবে নাড়ীর সূত্রবৎ বা স্নায়ব জন্মে। ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা বহু হইলে নাড়ী কোমল ও দুর্বল হয়।

শ্বাস।—সাধাবণতঃ প্রতিমিনিটে ১৬ বার নিশ্বাস গৃহীত ও ১৫ বার প্রশ্বাস পবিভ্যাক্ত হইয়া থাকে। শবীরেণ বক্তেণ ভাগ কম হইলে শ্বাস শীঘ্র

হয়। শীতল খাঁস মূত্ৰাব লক্ষণ। ফুসকুসেব বোগে খাঁসেব বৃদ্ধি এবং দুৰ্ব্বলতা দি হইলে উহার ন্যূনতা জন্মে। শিশুৰ খাঁসেৰ সংখ্যা স্বভাবতঃ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক।

পিপাসা।—অব ও প্রদাহে মুখগহ্বৰে বক্তাবিকা বশতঃ মুখ-শোষ জন্মে। শরীৰে বক্তেব স্বন্নতা অথবা রক্তেব জলীয়াংশেব স্বন্নতা হইলেই পিপাসাব উৎপত্তি হয়।

ক্ষুধা।—পুৰাতন পীড়ায় ও বোগেব পৰিণামাবদ্বায় ক্ষুধামান্দ্য সুলক্ষণ নহে। পাকশস্যেব উত্তেজনা, কামদোষ বা মধ্যান্ত্রগতিব পীড়ায় অতি ক্ষুধা জন্মে।

মুখাকৃতি।—“মুখমণ্ডল সমস্ত শরীৰেব দপণ স্বৰূপ।” বোগে প্রশান্ত ও প্রসন্ন বদন শুভ লক্ষণ। কিন্তু অদ্রোগে অনেক বস্ত্ৰণাব পৰ বোগীৰ প্রশান্ত ও প্রসন্ন মুখাকৃতি সুলক্ষণ নহে। মুখাকৃতিব চিত্তাকুলতা তবণবোগেব প্রাবৃত্ত্যাসিকাস, বাস্তবিক-প্রদাহ ও জননেন্দ্ৰিয়েৰ বোগেব পৰিচায়ক। আতঙ্ক-চিহ্ন জলাতঙ্ক, শ্লেণ্ডিতস্ত্রাব, উন্নততা ও দুৰ্ব্বলতা, নিষ্পন্দভাব দুৰ্ব্বলতা, সংজ্ঞা-শূন্যতা ও মুচ্ছাবানু; সন্ধিক্ততা পানাতাণ, কোপনভাব উন্নততা, জলাতঙ্ক, ও মস্তিষ্ক-প্রদাহ; সলজ্জতা ও অবশীৰ্ষতা ক্লম্মিম মৈথুন ও ধ্বজভঙ্গ, নবনে অনিচ্ছা ও উৎসাহশূন্যতা, মৃণমণ্ডলেব মলিনতা বা আবলভবাণ, ওষ্ঠাদেব ও দন্তে কৃষ্ণবর্ণ মলসঞ্চয় অব, মুখমণ্ডলেব অস্বাভাবিক পৰিপূৰ্ণতা ও বক্তাবিকা সংপিণ্ডেব বিবৃদ্ধি, স্ববাসক্ততা, সন্ন্যাস বোগ ও টাইকয়েড অব; এবং “নাসাগ্ৰেব সূক্ষ্মতা, নবনেৰ নিমগ্নতা, শয্য বা লগাট-পাণ্ডেব অবনাত, লগাট-দ্বকেব কুঞ্চিততা ও বিস্তৃকতা, কণেব শীত-স্পৰ্শ ও সঙ্কুচিততা, কণ-সন্ধিকাব উৎপত্তিতা, মুখমণ্ডলেব হৰিৎ, কৃষ্ণ, নীল বা সাসবৎ, শ’ মূত্ৰাব আশ্রয়তা জ্ঞাপক।

চক্ষু।—চক্ষেব রক্তবর্ণ স্থানিক প্রদাহ, অথবা মাস্তিক ও মাস্তিক-কিণীৰ রক্ত-সঞ্চয় ও প্রদাহ জ্ঞাপক। কুঞ্চিত কনানিকা মস্তিষ্কেব উত্তেজনা বশতঃ, জন্মে, এবং অপস্মাব, মস্তিষ্ক-প্রদাহ, সংজ্ঞান, মস্তিষ্কোদক প্রভাত বোধে বিদ্যমান থাকে। প্রসাবিত কনানিকা চক্ষে আলোক প্রবেশেৰ প্রতিবন্ধকতা, মস্তিষ্কেৰ জলসঞ্চয় বা প্রচাপন, সংজ্ঞাসংযোগ, মস্তিষ্কোদকেব শ্বেষাবস্থা, এবং আশ্রয় বা অস্ত্ৰেৰ উত্তেজনা হইতে উৎপন্ন হয়। মস্তিষ্ক-বোগেৰ প্রথমাব-

স্থায়ী কুঞ্চিত কনীনিকা শীঘ্র প্রসারিত হইয়া পড়িলে মস্তিষ্কে মল-ক্ষয় বা অত্রাবিধ পরিবর্তন বুঝা যায়। আলোকাতঙ্ক মস্তিষ্কের প্রদাহ ও উত্তেজনায় এবং চক্ষুর বিধান-তত্ত্ব প্রদাহের লক্ষণ। মস্তিষ্ক ও দর্শন-স্বায়ুর বোগের প্রাকালে ক্ষীণ দৃষ্টি, যুগল-দৃষ্টি, অন্ধদৃষ্টি ও মন্দিদৃষ্টি প্রভৃতি জন্মে। তির্গাকদৃষ্টি সংশ্রায় বা মস্তিষ্ক-রোগের লক্ষণ।

জিহ্বা।—(১) জিহ্বার শুষ্কতা তখন অব, (২) অত্যন্ত আরক্ততা ফোটজব, (৩) প্রান্ত ও অগ্রভাগে আবর্ততা পিত্তজব, (৪) বিদ্যাবিত জিহ্বা সমিধাতজব, (৫) লেপাবৃত জিহ্বা সর্লপ্রকায় অব, (৬) লক্ষ্যমরিচের শুঁড়িকা বিক্ষিপ্তবৎ জিহ্বা আবর্তজব; (৭) মধ্যভাগ লেপাবৃত ও প্রান্তদেশ আবর্ত জিহ্বা বিলেপী জর জাপক, (৮) প্রান্তভাগ হইতে ক্রমশঃ জিহ্বা পবিদ্ধার হইতে থাকিলে আবোপ্যোগুথতাব স্থচনা ও জিহ্বা উত্তরোত্তর অধিকতর কপিধবর্ণ, মলিন ও শুষ্ক হইতে থাকিলে বিপদেব আশঙ্কা জন্মে; (৯) পাণ্ডু, শুভ্র, লোহিত, প্রসারিত ও প্রকাম্পিত জিহ্বা দুর্লভতা ও-রক্তের জলীয়তা, (১০) উজ্জ্বল আরক্ততা শবীরেব বক্রপ্রধানতা; (১১) জিহ্বার কাল এবং বেঙণি বৎ ফুসফুসে বক্রসঞ্চলনেব প্রতিবন্ধকতা জাপক। (১২) জিহ্বাব প্রান্তে আবর্ততা ও মধ্যভাগে বিশেষতঃ মূলদেশে লেপ অগ্নিমান্দ্য; (১৩) জিহ্বাব চবিদ্রাবর্ণ পাণ্ডুরোগ সূচক। (১৪) জিহ্বাসঞ্চলনে অসম-র্থতা, অথবা বাহির করিলে একপার্শ্বে বক্র হইয়া পড়া জর ও অগ্রান্ত তকণ বোগে কুলক্ষণ, পক্ষাদাতেও জিহ্বাব এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ঘর্ম্ম।—প্রায়ত্বক ধব স্পন্দ, কক্ষ, দাহযুক্ত ও উত্তপ্ত থাকিলে জর বুঝা যায়। এই অবস্থাব পবে ঘর্ম্ম মূলক্ষণ বটে। পিণ্ডমজব ও প্রাদাহিক জরাদির পবে ঘর্ম্মস্রাব হইলে অনেকটা উপশম বোধ হয়। কিন্তু ঘর্ম্ম হইলেও যদি জ্ববেব অগ্রান্ত লক্ষণ হ্রাস না পড়ে তবে অল্প কোন উপশম আছে বলিয়া আশঙ্কা জন্মে। সামান্য শ্রমে ঘর্ম্ম হইলে দুর্লভতা এবং গীত ■ জ্ববেব পরে সাক্ষিতে অধিক ঘর্ম্ম হইলে বিলেপী অব বুঝা যায়।

কম্প।—বিষমজব, স্মৃতিকাজব, ও অগ্রান্ত তাঁর জ্ববেব প্রথম অবস্থায় পুনঃ পুনঃ প্রবল গাত্রকম্প হয়।

বমন ।—আমাশয়ের উপদাহ এবং বস্তিক, ছৎপিণ্ড, কৃগকৃস ও জরাসু  
প্রভৃতি যন্ত্রের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য বশতঃ বমন হয় ।

হিকা ।—বক্ষোদর-ব্যবচ্ছেদক-পেশীর কণ্ডারী আকৃকন বশতঃ হিকা  
জন্মে । কৃমি, আমাশয় বা যকৃতের প্রদাহ, জরায়ুর উপদাহ প্রভৃতি নানা  
कारणे হিকা হয় ।

বেদনা ।—প্রদাহেব বেদনা চাপিলে ও পেশীব বেদনা সঞ্চালনে  
বৰ্দ্ধিত হয় । শায়শুলের বেদনার, চাপনে ও সঞ্চালনে কোন পরিবর্তন ঘটে  
না । যকৃতে প্রদাহ হইলে দক্ষিণ কক্ষে এবং ছৎপিণ্ডেব পীড়ায় বাম বাহতে  
বেদনা অনুভূত হয় ।

মল ।—পাণ্ড বা কৰ্দমবর্ণ মলে পিত্তের অভাব; কৃষ্ণবর্ণ মলে  
পিত্তাধিক্য, সবুজবর্ণ মলে পাকস্থলীর অন্নহ, এবং মলে আমরক্ত অস্ত্রের প্রদাহ  
সূচক । তুলাস্থবৎ মলে ওলাউঠা, আনময় মলে অস্ত্রের শ্লেষ্মিক ক্রিমীর  
উপদাহ ও কঠিন শুষ্ক মলে উহার শুষ্কতা বা শিথিলতা বুঝা যায় ।

মূত্র ।—স্বস্থকায় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ২৪ ঘণ্টায় প্রায় এক সেব হইতে  
এক সের দশ ছটাক পরিমাণে মূত্র নিঃসৃত হয় । ( ১ ) লোহিত ও অকমজ  
প্রদাহ; ( ২ ) প্রচুব পাবিমাণ পবিকাব মূত্র, শায়বীষ বোগ; ( ৩ ) মূত্রের  
দুগ্ধবৎ স্বেতবর্ণ, কৃমি; ( ৪ ) ধূস্রবর্ণ, বক্তের বিদ্যমানতা; ( ৫ ) গাঢ় হরিদ্রা  
বর্ণ, পিত্তের অবস্থিতি, ( ৬ ) লোহিতবর্ণ, অন্নহ, ( ৭ ) আবিলতা, শ্লেষ্মা বা  
পুয়ের বর্তমানতা, ( ৮ ) মলিন কপিশ বা মূত্রের স্বেবৎ কৃষ্ণবর্ণ বক্তের বিগ-  
লিত অবস্থা, ( ৯ ) মূত্রের ফেনাব অদৃশ্যতার অভাব, অণ্ডাল, ( ১০ ) মূত্রে  
অধঃপতিত পদার্থ সাধারণতঃ যকৃদ্রোগ; এবং (১১) মূত্রে রক্ত, বৃক্কের প্রদাহ,  
বৃক্ক হইতে মূত্রাশয়ে অগ্নির গতি, ঝীকচাব ও সন্ধিপাত অগ্নি জ্ঞাপক ।  
( ১২ ) মূত্রে শর্করা মধুমেহ; শুক্র, শুক্রমেহ, অণ্ডাল, বৃক্কপ্রদাহ বা  
টাইটল ডিজিজ; শ্লেষ্মা, মূত্রাশয়ের প্রদাহ; ও প্রস্তরবেণু, অশ্মবি বুঝায় ।  
মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০১° হইতে ১০২৫ ।

প্রতিহারক ।—এই পুস্তকে যে সকল ঔষধ ব্যবস্থিত হইয়াছে যদি  
তাহার অতিমাত্রা বশতঃ কোন অস্বস্থকব লক্ষণ উপস্থিত হয় তবে ছই বিম্ব  
কর্ণের উগ্র অরিষ্ট অথবা কাকির উগ্রফান্ট পান করিলেই তাহা নিবারণিত



হইবে। কিন্তু কর্পূর সেবনে হাইড্রাটিস ও সিমিসিফুগার ক্রিয়া বিবর্তিত হইয়া থাকে। লক্ষণানুসারে বিষম-গুণ ঔষধ গুলিও ব্যবহৃত হয়।

পথ্য।—অধিকাংশ তরুণ রোগেই অদ্রব পথ্য ব্যবস্থেয় নহে। বিণ্ডুক জল, এবোক্রট ও মাগুব মণ্ড, যবেব মণ্ড, লাজমণ্ড, আফুব, বেদনা, কমলা-লেবু ও ইক্ষুবস এবং মাংসেব কাথ ইত্যাদি পথ্য প্রদান করা উচিত। পুরাতন বোগে নিম্নমিত ও অভাষ আহাব পবিসৰ্ত্তন করার বিশেষ আবশ্যক কবে না। তবে বোগীব যাহা সজ হয় না অথবা যাহাতে তাহাব শাবীরিক ক্রিয়াব বৈলক্ষণ্য জন্মে এ প্রকার কোন কোন দ্রব্য বর্জন করা বিহিত।

## জ্বরের লক্ষণ-বিশ্লেষণ।

প্রথমতঃ চিকিৎসক রোগীব লক্ষণগুলি লিখিয়া লইবেন; তৎপরে এই বিপাটরি লটয়া নিম্নোক্ত প্রণালীতে সেই সকল লক্ষণেব ঔষধ নির্দ্ধাবণ করিবেন এবং যে ঔষধেব সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখ দেখিবেন তাহাই নির্দ্ধাচন ও ব্যবস্থা করিবেন। ব্যবস্থাকালে পুস্তকেব শেষভাগে ব্যবস্থেয় ঔষধেব বিবরণ ও লক্ষণ ভাল করিয়া পড়িয়া লইবেন। দৃষ্টান্ত বথা :—

## জ্বরের প্রকৃতি।

দ্ব্যাহিক,—১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

## শীতের পূর্বে,—

অঙ্গে বেদনা,—কার্বো-ভে, \* ইউপ-পার্কো, \* নম্ব, অ্যাট-মিউ, বস।

জ্বন্তু,—এন্ট-টাট, আর্গ, \* আর্স, 'ইলাট, \* ইউপ-পার্কো, ইমে, ইপিকাক, নিক, \* অ্যাট-মিউ, নম্ব, বস।

## শীত।

সময়, পূর্বাহ্ন ১১টা :—\* ক্যাক্ট, কার্বো-ভেজি, ক্যাম, চিন-সল, হাইওস, ইপিকাক, গোল, \* \* অ্যাট-মিউ, \* \* নকস, ওপি, পলিপ, পলস, \* সিপি, সিলি, সগফ।

কম্পকর :—একন, এগাব, এম কা, এনাক, এণ্ট-ক্রড, \* এণ্ট-টার্ট, আস', বেল, বার্ক, \* ব্রাই, ক্যাক, \* ক্যাম্ফ, ক্যাহ, ক্যাপ্স, কষ্ট, \* চেলিড, \* \* চিন, চিন-সল, কক, কুপ, ডলক, \* ইলাপ্স, \* ইউপ-পার্পু, জেলস, গ্রাক, \* হিপ, \* \* ইগ্নে, ইপি, \* কালী-আইওড, ক্রিয়োস, \* লরো, লোব, লাইকো, ম্যান্স, মেনি, মার্ক, \* \* মিউব-এসি, \* \* ট্রাট-মিউ, \* \* নকস্, \* ওপি, \* পেট্রো, \* ফস, \* কস-এসি, \* পডো, পলস, \* বস, সাবড, শাঙ্ক, \* সিকেল, \* সিপি, \* \* সিলি \* ষ্ট্রাক, ট্রাম, সলফ, \* \* থুজা, তিরাত।

অগ্রগামী :—\* আস', \* ব্রাই, চিন, চিন-সল, ইগ্নে, ট্রাট-মিউ, \* নকস্।

অঙ্গ-বেদনা :—একন, আস', বেল, ব্রাই, ডলক, ইলাট, \* ইউপ-পার্কো, ইউপ পার্পু, গ্রাক, হেল, ল্যাক, লাইকো, মারকিউরিয়াল, মেজ, ট্রাট-মিউ, \* \* নকস্, ওপি, \* পলস, \* বস, \* সাবড, সিপি, সলফ।

নথের নীলবর্ণ :—আস', \* এসাক, এপিস, আর্গ, আস', \* কার্কো-ভেজি, \* চিন-সল, কক, কোন, \* ড্রোস, \* ইউপ-পার্কো, ইপি, মেজ, \* \* ট্রাট-মিউ, \* নক্স, \* পেট্রো, ফস-এসি, সলফ, \* থুজা।

ভ্রকের নীলবর্ণ ও চিহ্ন :—\* \* নক্স।

আবৃত থাকিতে ইচ্ছা :—আর্গ, ক্যাম্ফ, \* ইউপ-পার্কো, ফস, ট্রাট-মিউ, \* নক্স, \* ট্রাম।

জলপানান্তে বমন :—আর্গ, \* আস', \* ইউপ-পার্কো, নক্স।

শিরোবেদনা :—২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জলপানে শীতের বৃদ্ধি :—এলম, \* আস', এগাব, ক্যান, \* \* ক্যাপ্স, \* চিন, কক, \* ইলাপ্স, ইউপ-পার্কো, \* লোব, লাইকো, মেজ, \* \* নক্স, \* রস, সিলি, টার, \* তিরাত।

নিদ্রা :—এণ্ট-ক্রড, এণ্ট-টার্ট, এপিস, জেলস, \* কালী-আইওড, লাইকো, মার্ক, মেজ, \* ট্রাট-মিউ, \* নক্স-ম, নক্স, ওপি, পডো, সো'ব, সিলি।

নিদ্রা, শীতান্তে :—\* এপিস, আস', ক্যাম্ফ, লাইকো, মেজ, নক্স-ম, \* নক্স, শ্যাবিন।

## উত্তাপ ।

শিরোবেদনা :—৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

পিপাসা :—৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

বদন এসবার আরক্ত, একবার পাণ্ডুর :—একন, বেল, বোভ, ক্যাপ, ক্রোক, ইপিকাক, নক্স, ওপি, রস, পলস ।

নড়িলে চড়িলে কম্প :—এপিস, \* আর্গ, \*\* নক্স, পডো, ট্রামো ।

গালের আরক্ততা ও উত্তপ্ততা :—কার্কো-এ, চেলিড, \* সিনা, কক, ডিহি, \* ইউপ-পার্কো, ফেরি, কালী-কা, ল্যাক, লাইকো, \* মেনি, মার্ক, নক্স, রস, রোব, \* ভিরটি ।

অঙ্গবেদনা :—আর্স, ব্রাই, ক্যাক, ক্যাপ, কার্কো-ভেজি, চিন, \* ইউপ-পার্কো, ইউপ-পার্পু, লাইকো, পলস, রস, সিকেল, সিপি, সলফ ।

## ঘর্ম ।

প্রভূত :—৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

ঘর্মে বেদনার শাস্তি :—\* আর্গ, বেল, ক্যালোড, চেলিড, \* ল্যাক, \*\* ভাট মিউ, \* নক্স, সিকেল ।

## বিরাম ।

মুখমণ্ডলের পীতবর্ণ :—\* আর্গ, \* আর্স, ক্যাপ, চিন, \* ইউপ-পার্কো, ফেরি, \* ভাট-মিউ, \* নক্স, পেট্রা, রস, সিপি ।

এহলে লক্ষণের সমষ্টি ২৪ । এবং লক্ষণে ঔষধের অধিক উল্লেখ্য সংখ্যা,—  
নক্স ২৩, ভাটমিউ ১৬, ইউপ-পার্কো ১৪, আর্স ১৪, চিন ১০ ।  
সুতরাং এই নোগীব পক্ষে নক্স-ভমিকা ব্যবস্থের ।

(২) দৃষ্টান্ত যথা :—ত্রিশবৎসর বয়স্কা একজন স্ত্রীলোক চারিমাংস যাবৎ পৈত্তিক সবিরাম জরে ভোগিতেছিলেন । কুইনাইন ও ক্যালোমেণ সেবন করা হইয়াছিল । কুইনাইন সেবনে অবের প্রকৃতি চাপা পড়িয়াছিল

ঘাট কিন্তু তাহার অস্থিতে অবিরাম ও আকৃষ্টবৎ বেদনা, অন্তরে অতিশয় উত্তাপ, পিপাসার আধিক্য, শ্রান্তি, শিরোঘূর্ণন, দুর্বলতা, ক্লান্ত্য করিতে অশক্তি, রাত্রিতে স্ননিদ্রার অভাব, ক্ষুধাহীনতা প্রভৃতি লক্ষণ অবশিষ্ট ছিল। অনন্তর একদিন অপরাহ্নে সহসা শিরোঘূর্ণন ও শীত উপস্থিত হইয়া পূর্ববৎ প্রবল জ্বর প্রকাশ পাইল। বমন হইতে লাগিল। বিদীর্ণ ও আকৃষ্টবৎ অস্থি-বেদনা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। রোগিণী বলিতে লাগিলেন যে তাহার মস্তকে ও শিবির অভ্যন্তরে বেন অগ্নি স্থাপিত রহিয়াছে। বক্ষঃস্থলে গুরুত্ব; উৎকর্ষা; চক্ষুর জ্বালা ও আরক্ততা; অবিরত বমন; অত্যন্ত পিপাসা; দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে শীতল, দুর্বলকর, আঠা আঠা ঘর্ষের উদ্বেক; প্রভৃতি লক্ষণ ছিল। অস্থি-বেদনা অত্যন্ত অসহ্য হওয়াতে অবকালীন ল্যাকেসিস ব্যবস্থা করাতে তখনই বেদনার শান্তি জন্মিয়াছিল। অনন্তর জ্বরের বিরাম হইবার একটু পরেই আর্সেনিক ব্যবস্থা করাতে আর জ্বর ফিরিল না এবং তিনি ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। বিশ্লেষণ যথা,—

(১) শীত ও আন্তরিক উত্তাপ :—এনাক, আর্স, ক্যাক, কার্বো, হেলি, কালি, নক্স ভম, ফস, ফস-এসি, পলস, স্তাব, ষ্টান, সলফ, ভিবাট &c। (২) অপরাহ্নে জ্বর :—আর্স, নক্স-ভম, ফস, ফস-এসি, পলস, ষ্টান, সলফ, ভিবাট &c। (৩) শীতল, আঠা আঠা, দুর্বলকর, ঘর্ষ :—আর্স, নক্স, ফস, ফস-এসি, ষ্টান &c। (৪) উত্তাপাবস্থায় পিপাসা :—আর্স, নক্স, ফস &c। (৫) অস্থিতে বিদীর্ণকর বেদনা :—আর্স। সুতরাং সকল লক্ষণ গুলিই আর্সেনিকে উপশম হয় বলিয়া আর্সেনিকই এস্থলে ঠিক ব্যবস্থের ঔষধ।

## নূতন সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

কয়েকখানি সুপ্রসিদ্ধ অব-চিকিৎসা গ্রন্থ ও অশ্রুত চিকিৎসা গ্রন্থ অব-লম্বনে এই ক্ষুদ্র পুস্তকেব নূতন সংস্করণ সঙ্কলিত হইল। এ সংস্করণে প্রথম সংস্করণেব ককালমাত্র অবশিষ্ট বহিষাছে। বহুল পরিমাণে নূতন উপাদান সন্নিবিষ্ট হইয়া ইহার কলেবর সমধিক পবিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এক্ষণ, আঘাতনেব সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকেব কার্যকাবিতা পরিবর্দ্ধিত হইয়া অর-জজীবিত বঙ্গদেশের কিকিৎ উপকারে আসিলেই পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। আঘাত। ১৩০১।

## প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন ।

এইক্ষণ অববোগে এদেশে যেরূপ জর্জবিত, বিশেষতঃ সুচিকিৎসক বিহীন পল্লগ্রাম জুলা এই বোগ দ্বারা যে প্রকাব প্রাদীড়িত তাহাতে অর-চিকিৎসা সম্বন্ধে ভ্রষ্টলোক মাত্রেই কপকিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এই মতেব ঔষধ গুলি অতিশয় সূখ-সেবা ও স্বল্প মূল্য। বোগের প্রথম উপক্রমে ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিলে এবং পুরাতন রোগেও প্রকৃত ঔষধ নির্কা-চিত ও ব্যবহৃত হইলে অনেক সময় বিষনী-লোকদিগের হস্তেও এতদ্ভাবে আশ্চর্য উপকাব দণে। এই সকল কারণে আগার পরম সুস্থৎ পরদুঃখ-কৃত্তর শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বোষ আমাকে একখানি অব-চিকিৎসা লিখিতে অহুবোধ ববেন। তাঁহাবই অনুরোধে ও উপদেশে কয়েকখানি ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আমি এই অব-চিকিৎসা সঙ্কলন করিয়াছি। এই পুস্তকে এতদ্দেশে সচবাচব যে সকল অর হইয়া থাকে তাহার বিবরণ ও চিকিৎসা, অববোগে ব্যবহৃত ঔষধ সকলের বিশ্কারিত লক্ষণ, এবং নাড়ী ও গাত্রতাপাদির পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রভৃতি অর চিকিৎসার একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণ, এই ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা অরাকান্ত ব্যক্তিদিগের কিঞ্চৎপরিমাণে উপকাব দণিবেই পরিশ্রম সফল মনে করিব। আগষ্ট, ১৮৮০।

## জ্বর-চিকিৎসার সূচীপত্র ।

জ্বর সন্নিবাহ	২	ফিবার ইন্টারমিটেন্ট	২
„ প্রচ্ছন্ন	২১	„ মাল্ভ	২১
„ দূষিত বিষম	২২	„ পারিশস্ ইন্টার মিটেন্ট	২২
„ স্বল্পবিবাহ	২৫	„ নিমিটেন্ট	২৫
„ ( শিশু )	৩৮	„ ( ইনফ্যান্টাইল )	৩৮
„ অবিরাম	৩৯	„ কণ্টিনিউড	৩৯
„ সামান্য	৩৯	„ সিম্পল	৩৯
„ সামান্য সম্ভূত	৪১	„ কণ্টিনিউড	৪১
„ সরিপাত	৪৩	„ টাইফয়েড	৪৩
„ মোহ	৫৫	„ টাইফস	৫৫
„ অভিভ্রাস	৬৭	„ আর্ডেন্ট	৬৭
„ স্মৃতিকা	৬৭	„ পিউর্যাব পাবল	৬৭
„ চক্ষু	৬৯	„ মিক্স	৬৯
„ পৌনঃপুনিক	৬৯	„ বিল্যাপ্সিং	৬৯
„ পীত	৭২	„ ইয়ালো	৭২
„ স্ফোট	৭৪	„ ইবাপ্টিব	৭৪
„ বসন্ত	৭৪	„ অলপক্স	৭৪
„ পানিবসন্ত	৮৪	„ চিকেন পক্স	৮৪
„ হাম	৮৫	„ মিজলস	৮৫
„ আরক্ত	৮৯	„ স্বার্লেট	৮৯
„ ডেঙ্গু	৯০	„ ডেঙ্গু	৯০
„ বিলেপা	৯১	„ হেক্টিক	৯১

## শুদ্ধিপত্র ।

জ্বর-চিকিৎসা ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৭	১২	১০৩২	১০৩	৩৭	১৮	টিউক্রিয়	টিউক্রিয়র।
২	১৮	০২	২	৩৮	৬	দিগেঘ	দিগের।
৫	১৮	অর্জ	অর্জ	৩৮	১০	এব	এবং।
৬	৩	জীবানু	জীবানু।	৪০	১৩	ধাকিলে	ধাকিলে।
৬	৪	ফুসফুস	ফুসফুসে।	৫২	৭	আউণ্ড	আইণ্ড।
৯	১৪	বোগেব	বোগেব লক্ষণ।	৬১	৭	তাপে	তাপ।
১১	১০	প্রত্যাহ	প্রত্যাহ।	৬২	৪	লোকদিগকে	লোক- দিগের।
২১	১৩	মানি	মানি।	৬২	২১	অণুজালিক	আণুজা- লিক।
২২	৮	ডেণ	গ্রেণ।	৬৩	৪	শোণিত	শোণিতে।
২৫	১৭	আবেশকীয়	আবশ্যক।	৬৩	২৪	অত্যন্ত	অত্যন্ত।
২৮	১৮	আমণয়িক	আমায়িক	৬৪	২৪	বাক	বাক্য।
২৮	২১	নারী	নারী।	৬৯	১৩	ব্যবস্থা	ব্যবস্থা করা।
৩৩	২৪	মসিনার	মসিনার।	৮৪	১৩	দিলে	দিলে।
৩৪	২০	{১১৪হইতে ১৪০	{১৪হইতে ১৪০।				

# জ্বর-চিকিৎসা ।

সর্বপ্রকার অব্যেই অস্বাভাবিক গাত্রোত্তাপ, জ্বতনাড়ী, সেপাবৃত ত্বিহা, আমাশয়ের ক্রিয়াবিকার, স্বপ্ন ও আরক্ত মূত্র এবং অতিশয় শিপাসা প্রভৃতি সাধারণ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে । অধিকাংশ প্রাদাহিক রোগে এবং উপঘাত প্রাপ্তির পরে জ্বর লক্ষণ অবস্থিতি করে । কিন্তু অত্যন্ত ব্যাধির সহিত সংসৃষ্ট না থাকিয়াও স্বয়ং স্বতন্ত্র রোগ স্বরূপ জ্বর প্রকাশ পায় । প্রতিষ্ঠায় বা অজীর্ণ অথবা ম্যালেরিয়া বা অন্ত কোন প্রকার বিষবৎ শব্দার্থ দ্বারা রক্ত দূষিত হইয়া এইরূপ জ্বর উৎপন্ন হয় । এই শ্রেণীকৃত প্রকারের জ্বর প্রধানতঃ দুই ভাগে \* বিভক্ত যথা,—সবিরাম ও অবিরাম । তন্মধ্যে এতদ্ব্যতীত যে গুলি সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহারই বিষয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উল্লিখিত হইল ।

জ্বর সহকারে পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে বসন্তজ্বর বা মোহজ্বর ; শিরঃ-পীড়া ও অতিশয় থাকিলে সন্নিপাত জ্বর ; মস্তকে সর্দি থাকিলে হামজ্বর ; এবং অতিশয় শিরঃপীড়া থাকিলে মোহজ্বর সন্দেহ করা বাইতে পারে ।

জ্বরে গাত্রোত্তাপ ১০৩ তাপাংশ হইলে জ্বর উগ্র ; ১০৪ তাপাংশ হইলে উগ্র ; ১০৫ তাপাংশ হইলে অতিশয় উগ্র ; ১০৬ তাপাংশ হইলে সঙ্কটজনক ; এবং ১০৭ তাপাংশ হইলে সাধারণতঃ সাংঘাতিক জ্বর বলিয়া অবধারণিত হইয়া থাকে ।

লিঙ্গ, বয়ঃক্রম, ষাৎ, প্রকৃতি ও জাতি অনুসারে জ্বরের প্রকৃতির ভিন্নতম্য আছে ।

---

\*কেহ কেহ পুতিবাস্পজ বা ম্যালেরিয়া অনিত জ্বর, সন্তত জ্বর, (একজ্বর) ও ফেটিজ্বর এই তিন ভাগে জ্বরের শ্রেণী বিভাগ করিয়া থাকেন ।



## সবিরামজ্বর ।

(ক) পুতিবাস্পজ-জ্বর-ম্যালেরিয়াস ফিভারস ।

(১) বিষমজ্বর গ-ইন্টারমিটেন্ট ফিভার ।

যে দেশে অধিক পরিমাণ অনুপভূমি ও পযঃপ্রণালীবহীন পলিভূমি আছে সেই দেশেই বিষমজ্বর ও স্বল্প বিরামজ্বর বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে । ভূমি শুষ্কই কর্তিত ও পরিশুদ্ধ হয় এবং পযঃপ্রণালীর যতই আধিক্য জন্মে ততই এই সকল বোগ হ্রাস প্রাপ্ত হয় ।

বিষমজ্বর পর্যায়ক্রমে শীত, উষ্ণ ও বর্ণাবস্থা বিশিষ্ট এক প্রকার মুক্তাঙ্ক-বন্দী জ্বর । এই অব শীত হইয়া আরম্ভ হয় ও বর্ণ হইয়া বিরাম :পায় এবং কিয়ৎকাল বিরামের পরে পুনর্বার প্রকাশিত হয় । কিছুকাল সম্যক বিবামের পরে পুনরায় জ্বর প্রকাশ পায় বলিয়া ইহাকে বিষমজ্বর, সবিরামজ্বর, বা সপর্ষায় জ্বর বলে । জ্বরের উষ্ণাবস্থাকে প্রকোপকাল এবং বিচ্ছেদ অবস্থাকে বিরামকাল কহা যায় ।

সকল প্রকার বিষমজ্বরেরই এই বিশেষ প্রকৃতি দৃষ্ট হয় যে জ্বরের প্রারম্ভ-বস্থায় যখন রোগী শীতানুভব করিতে থাকে, তখন সহসা ক্রতঃপে শরীরের উত্তাপ বর্দ্ধিত হয় এবং জ্বরের শেষ অবস্থায় বিরামকাল যতই নিকটবর্তী হইতে থাকে ততই শারীরিক উত্তাপ শীঘ্র শীঘ্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় । বিষমজ্বরে গাভ্রতাপ ১০৫।১০৬ ডিগ্রী পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় ; এবং সময়ে সময়ে ১০ মিনিটে ১২ ডিগ্রী করিয়া বর্দ্ধিত বা হ্রাস প্রাপ্ত হয় ।

প্রকারভেদ ।—বিষমজ্বর অত্রেহ্যাদ (ঐক্যিক), তৃতীয়ক (ত্যাহিক) ও চতুর্থক (ত্যাহিক) প্রধানতঃ এই তিন প্রকারে বিভক্ত । ঐক্যিক (কোটিডিয়ান) ২৪ ঘণ্টা অন্তর প্রতিদিন একবার প্রকাশ পায় এবং উষ্ণ-

---

† নিদানোক্ত বিষমজ্বর ভাষায় সবিরামজ্বর, সপর্ষায়জ্বর, পালাজ্বর, ও কম্পজ্বর নামে সচবাচর অভিহিত হইয়া থাকে ।

প্রধান দেশে বসন্তকালেই অধিক উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ প্রাতঃকালে এই জ্বরের আক্রমণ প্রকাশ পায়। ইহাতে শীত কম ও তাপ অধিক থাকে। তৃতীয়ক (টার্শিয়ান) জ্বর ৪৮ ঘণ্টা অন্তর অর্থাৎ এক দিবস পরে এক দিবস মধ্যাহ্নকালে প্রকাশ পায়। নাতিশীতোক্ত দেশে এবং শিশু, যুবক, ও শৈশবিক-প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে বসন্ত ও বর্ষাকালে ইহার আধিক্য দৃষ্ট হয়। চতুর্থক (কোয়ার্ট্যান) জ্বর ৭২ ঘণ্টা অন্তর প্রায়ই শরৎ ও হেমন্তকালে অপরূপে উপস্থিত হয়। বিষমজ্বর প্রত্যহ দুইবার প্রকাশ পাইলে উহাকে দ্বীকালীনজ্বর বলে। প্রতিদিন জ্বরান্তের সময় আঁতুরাইরা আসিলে অগ্রগামী বা এন্টিসিপেটিং এবং পিছাইরা পড়িলে পশ্চাকামী বা রিটার্ডিং জ্বর বলে। জ্বরের পশ্চাকামীতে স্নানক্ষণ, ইহাতে জ্বব শীঘ্র আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা; অগ্রগামীতে স্নানক্ষণ, ইহাতে সবিরামজ্বরের এক-জরে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। এই সকল জ্বরের শীতাবস্থা যতই দীর্ঘ থাকে, জ্বরের ভোগকাল ততই সংক্ষিপ্ত হয়।

যে সকল ব্যক্তি পুতিবাম্প (ম্যালেরিয়া) প্রধান স্থানে বাস করে তাহাদের শারীরিক উত্তাপ-উত্তাবনী শক্তির ক্ষীণতা জন্মে এবং অনায়াসে ঋতু-পরিবর্তন সহ্য হয় না; সুতরাং যে সকল শারীরিক ক্রিয়াধারা শরীর-গত পুতিবাম্প নিঃসারিত হয়, তাহা বিকৃত হইয়া পড়ে এবং পুনঃ পুনঃ জ্বরের আক্রমণ প্রকাশ পায়। জ্বরের শীতাবস্থায় আভ্যন্তরিক বস্ত্রে রক্ত-সঞ্চয় বশতঃ গ্রীহা, বক্ষঃ, অস্ত্র ও সময়ে সময়ে বৃক্কের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য জন্মে। রোগীর বর্ণ মলিন, অঙ্গ ক্লান্ত, উদর ক্ষীত ও কোষ্ঠ রুদ্ধ হয়। গ্রীহা সবিশেষ বিবর্তিত হইয়া থাকে। গ্রীহা আরোহণ না হইলে প্রায়ই জ্বর আরোহণ হয় না। যত দিন গ্রীহা বিবর্তিত থাকে, ততদিন বারংবার জ্বর প্রকাশ পায়। বিষমজ্বরের পর কিছুকাল পর্যন্ত শরীর একপাশে স্থির থাকে, যে সামান্য কারণে পুনরায় জ্বর হইতে পারে। বিষমজ্বর স্থান বিশেষে বা দেশ বিশেষে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে স্থানিক (এণ্ডেমিক) রোগ কহে।

কারণ।—ম্যালেরিয়া বা পুতিবাম্প অর্থাৎ একপ্রকার অদৃশ্য হুঁসুটি বিষমজ্বর পদার্থ এই রোগের উদ্ভাবক কারণ। শ্রান্তি, অবসন্নতা, মানসিক অবসাদ, অপর্যাপ্ত বা অল্পপুষ্ট আহার, অমিতাচার, নিশা-বায়ু এবং বিষম-

ଜ୍ୱରର ପୂର୍ବାକ୍ରମଣ ଇହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାରଣ । କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଲେରିଆ ସେ କି, ଆଜିଓ ତାହାର ସର୍ବମନ୍ଦତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଆଁମାଂସା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୁଏ ନାହିଁ । ତବେ ହାନ ବିଶେଷେ କତକଂଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟଶୀଳ ବୋଗେର ପ୍ରାଚୁର୍ତ୍ତାବ ଦେଖିବା ଏହିରୂପ ମିଳାନ୍ତି ହୁଏତା ଯେ, ସେହି ସକଳ ହାନ ହୁଏତେ ଏକପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ବାମ୍ପ ଉଦ୍ଭୂତ ହୁଏନା ଏହି ସମସ୍ତ ରୋଗ ଜନ୍ମେ । ଏହି ବାମ୍ପହି ମ୍ୟାଲେରିଆ ବା ପୂତିବାମ୍ପ ନାମେ ଅତିହିତ ହୁଏତା । ନଦୀର ଆର୍ଦ୍ର କୂଳ-ଭୂମି, ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ନିମ୍ନସ୍ଥ ନିବିଡ଼ ବନ, ନାମୟିକ ଜଳମ୍ବାବନାଦୀନ ହାନ, ଅନୁପ-ଭୂମି ଏବଂ ଜଳ-ସିକ୍ତ ନିମ୍ନସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୁକ୍ ବାଲୁକାମୟ ଅନୁର୍କ୍ତର ପ୍ରେମେଶ ମ୍ୟାଲେରିଆର ଆବାସ ଭୂମି । ଗଳିତ ଉଦ୍ଭିଦ ହୁଏତେହି ସେ କେବଳ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଉଦ୍ଭୂତ ହୁଏ ଇହା ସତ୍ୟ ନାହିଁ । ସିକ୍ତ ଭୂମି ଶୁକ୍ ହେବାର ସମୟ ଉହା ହୁଏତେଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏନା ଥାକେ । ଅତରାଂ ସେ ସକଳ ହାନ ବଂଶଦେର କେନ ସମୟ କେବଳ ଜଳସିକ୍ତ ହବ ସମସ୍ତାନ୍ତବେ ତାହା ଅସ୍ବାହ୍ୟକର ହୁଏନା ଉଚ୍ଛିତ୍ତେ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ସେ ହାନେବ ନିମ୍ନସ୍ଥ ନିରନ୍ତର ଆର୍ଦ୍ର, ସେହି ହାନ କଦନହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁକ୍ ହୁଏ ନା ବଳିଆ ସର୍ବଦାହିଁ ଅସ୍ବାହ୍ୟକବ ଥାକେ ।

ମୋସୁମି ବାୟୁର ( ମନସୁନ ) ଅବ୍ୟାବହିତ ପବେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ ଅକ୍ଟୋବର ମାସେର ଶ୍ରବ୍ଧର ମୁହୂର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତାପେ ଧନ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଶୁକ୍ ହୁଏତେ ଥାକେ, ତଦନହିଁ ଅଧିକ ପରିମାଣେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଧନାର୍ଥ ବାୟୁତେ ଭାସମାନ ଥାକିଆ ବିଚ୍ଚରଣ କରେ । ଭୂ-ପୃଷ୍ଠେ ବାସ ବା ଧ୍ୟାନ କରିଲେ ଷଡ଼ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜନିତ ଜ୍ୱର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏକଟୁ ଉଚ୍ଚହାନେ ବା ଗୃହେର ଉପରି ତଳେ ଥାକିଲେ ତତ ହୁଏନା ବଳିଆ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବାୟୁ ଅପେକ୍ଷା କିଞ୍ଚିତ୍ ଶୁକ୍ ବଳିଆ ବୋଧ ହୁଏ । ରାତ୍ରିକାଳେହିଁ ମ୍ୟାଲେରିଆର ଅଧିକ ପ୍ରାଚୁର୍ତ୍ତାବ । ଯେହେତୁ ନିଶାବାୟୁ ସେବନେହିଁ ପୂତି ବାମ୍ପଜ ରୋଗ ଅଧିକ ଜନ୍ମେ । ବାୟୁ କର୍ତ୍ତୃକ ଏହି ବାମ୍ପ ଏକ ହାନ ହୁଏତେ ହାନାନ୍ତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ; ଅତରାଂ ଅନୁପଭୂମି ବା ପୂତି ବାମ୍ପମୟ ହାନେର ମଧ୍ୟାଦିନା ସେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଯାହାରା ସେହି ବାୟୁର ବିପରୀତ ଦିକେ ଯନ୍ତକ ରାଖିଆ ଧ୍ୟାନ କରେ ତାହାରା ନିଧାସ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପରିମାଣେ ଐ ବାମ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରେ ଅତରାଂ ସହର ଅରାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏନା ପଡ଼େ । କିନ୍ତୁ ବାୟୁର ପଞ୍ଚାଂ ଦିକେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଜ୍ୱର ଜନ୍ମେ ନା । ସେ ହାନ ହୁଏତେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେହି ହାନ ଓ ଯନ୍ତ-ସ୍ତୋର ଆବାସ ଭୂମିର ମଧ୍ୟେ ବୃକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀ ଥାକିଲେ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ବିନିଷ୍ଠ ଅଥବା ଉଦ୍ଭୂତ ଗତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ । ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତାପେଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନୈ ହୁଏ, ଅଜ୍ଞ ଏବ

ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে রাত্রিতে প্রবল অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিলে উপকার দর্শে । কেহ কেহ বলেন, ইউক্যালিপ্টস বৃক্ষ, সূর্যমুখী ফুল ও তুলসী ম্যালেরিয়া নাশক । বাতীতে উহাদের বৃক্ষ রোপণ করিলে ম্যালেরিয়া দ্বারা অপকার জন্মে না ।

ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে কয়েকটি নির্দ্ধারিত নিয়ম দৃষ্ট হয়, যথা:—(১) নিয়ম ও অর্জি স্থানেই ম্যালেরিয়ার সমধিক প্রাবল্য দেখা যায় । (২) ৬০ তাপাংশের নীচে ইহা প্রায় বিকসিত হয় না । (৩) ৩২ তাপাংশ উত্তাপে ইহার প্রবল কার্যকারিতা প্রতিকূল হয় । (৪) বিবুরেখা ও সমুদ্রকূলের নিকটেই ম্যালেরিয়ার অধিক প্রাচুর্য্য ও প্রাবল্য দেখা যায় । (৫) নিবিড় বৃক্ষ-পঞ্জ্রে ম্যালেরিয়া সংগৃহীত ও উহার গতি সংরুদ্ধ হয় । (৬) বায়ু সহকারে পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া প্রবাহিত হইতে পারে । (৭) যেখানে ম্যালেরিয়া নাই সে স্থানেও পতিত ভূমি কর্ষণ, রেলওয়ের রাস্তা নির্মাণ ও খাদ্যাদি ধনন করাত্তে ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হইতে পারে । (৮) অভিজ্ঞতা দ্বারাই কেবল ম্যালেরিয়ার বিদ্যমানতা জানা যায় । (৯) জলরাশি ম্যালেরিয়া আকর্ষণ ও পরিশোধন করে । (১০) ম্যালেরিয়া-প্রধান প্রদেশ সকল বস্তই পরিকৃত ও অধ্যুষিত হয় ততই ম্যালেরিয়া জনিত পর্য্যায় অব বিলুপ্ত হইতে থাকে । কেবল যে গলিত উদ্ভিদ ও অনাবৃত সজল ভূমি হইতেই ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয়, এমন নহে । গৃহের অভ্যন্তর ভাগ অর্ধ থাকিলে অথবা গৃহের নিম্নদেশ বা নিকট দিয়া পয়ঃপ্রণালী থাকিলেও বায়ু দূষিত হইয়া বিবিধ প্রকার পুতিবাস্পজ রোগ উৎপন্ন করে ।

ম্যালেরিয়া-জরের কারণ সম্বন্ধে আধুনিক মত এই যে এক প্রকার কীটাপু হইতে এই জ্বর উৎপন্ন হয় । পুতিবাস্পাদিতে এই কীটাপু বাস করে । চক্র অগোচর অণুবীক্ষণ-দৃষ্ট এক জাতীয় জীবাণুকে ব্যাকটেরিয়া বলে । এই জীবাণু পরাক্ষপুষ্টি অর্থাৎ অপর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে । বিশ্চিকাদি ব্যাপক ও সংক্রামক রোগ সকল এই সকল পরাক্ষপুষ্টি জীবাণু হইতেই সমুৎপন্ন হয় । এই জীবাণুর ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে । এই ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতেই ভিন্ন ভিন্ন সংক্রামক রোগ সম্ভূত হয় । প্রথমে জল বায়ু বাস্পাদি সহযোগে এই সকল জীবাণুর বিজ প্রসার-

দেহে প্রবিষ্ট হয় এবং তথ্য কিছু কাল পরিশুষ্টি ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া শরীরের বিকার জন্মান ও রোগ উৎপন্ন করে। ম্যালেরিয়া ব্যাসিলস এই জাতীয় একপ্রকার জীবাণু রক্তে ইহাদের অবস্থিতি বলতই ম্যালেরিয়াজ্বর উৎপন্ন হয়। এই সকল জীবাণু বা কীটাদি নিশ্বাস দ্বারা কুসকুস অথবা পানাহার সহযোগে উদবে প্রবিষ্ট হইয়া অল্প কাল মধ্যে বিবর্তিত, বিবর্দ্ধিত ও সংখ্যাভীত হইয়া পড়ে এবং রক্তে ও লীহাদি-বস্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে। অল্পবীক্ষণ বস্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে অব-কথ ব্যক্তির মূত্রে ও ঘর্শে ম্যালেরিয়া ব্যাসিলস নামক জীবাণু দেখা যায়। ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানের মৃত্তিকা ও বায়ুতেও এই সকল জীবাণু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জীবাণুপূর্ণ মৃত্তিকা জলেব সহিত মিশ্রিত করিয়া সূক্ষ্ম ব্যক্তিব শোণিতে প্রবিষ্ট করিলে ম্যালেরিয়া বিষ-দূষিত বোগীর ভ্রার লক্ষণ এবং পর্য্যায় জ্বর ও লীহার বিরূক্তি সমুৎপন্ন হয়।

গৃহীত ম্যালেরিয়ার পরিমাণ এবং বোগীর স্বাস্থ্য ও বলায়ুসারে রোগের উগ্রতার তারতম্য জন্মে। অধিক পরিমাণে ম্যালেরিয়া গ্রহণ করিলেই প্রবল বদন-বিরাম জ্বর উৎপন্ন হয়। কখন কখন সংযত আকাবে অধিক পরিমাণে ম্যালেরিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বর প্রকাশ না পাইয়া হিমাইসের ভ্রায় এক প্রকার অবস্থা জন্মে এবং উহাতে কতিপয় ঘটকার মধ্যেই বোগীর প্রাণ বিরোপ হয়। ম্যালেরিয়ার প্রভাব বলতঃ সহসা রূপান্তরের ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া একরূপ ঘটে। ইহাকেই দূষিত বিষজ্বর বলে। পক্ষান্তরে সময়ে সময়ে এত অল্প পরিমাণে ম্যালেরিয়া শরীরস্থ হয়, যে শিবঃ পীড়া, গ্লানি বা উদরাময় ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়াই উহাব বিবক্রিয়া নিঃশেষিত হইয়া পড়ে। কখন কখন এতদ্বারা রক্তাতিসার বা শিরঃশূল জন্মিয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই বিষ গ্রহণ সময়ে শরীরের যে যন্ত্রের ক্ষীণতা থাকে তাহাতেই উহার ক্রিয়া সহজে প্রকাশ পায়। অমিতাচারী, ক্ষীণবল ও গণ্ডনালাগন্ত ব্যক্তিব যে পরিমাণ ম্যালেরিয়া দ্বারা পীড়িত হইয়া পড়ে, বলিষ্ঠ ও সুস্থকার ব্যক্তিদিগের তাহাতে তত অপকাবে জন্মে না।

এই বিষ একবার মানব দেহে প্রবিষ্ট হইলে এতদ্বারা যে সকল বিশেষ বিশেষ রোগ জন্মে পুনর্বার ম্যালেরিয়া গ্রহণ ব্যতীতও তাহা উৎপন্ন হইতে পারে। ম্যালেরিয়া জনিত রোগ আরোগ্য হইবার পরেও কয়েক মাস ক

কণ্ঠের বৎসর পূর্ণাঙ্ক শরীরের এমন একপ্রকার অবস্থা থাকিয়া যায়, যে সামান্য কারণে অর্থাৎ সর্দি বা রৌত্র লাগাইলে, আহারের অভ্যাচায়ে বা আর্দ্র যন্ত্র ধারণ করিলে কিম্বা সিক্তপদে অধিকক্ষণ থাকিলে পুনর্বার ক্ষয় উপস্থিত হয়।

লক্ষণ ১—প্রথমতঃ পূর্বরূপ অবস্থার অর্থাৎ সাধারণতঃ বিষগ্রাহকের চতুর্দশ দিবসের মধ্যে অবসন্নতা, দুর্বলতা, অস্থিরতা, জ্বরণ (হাইতোলা); অঙ্গ-মর্দ (আড়ামোড়া ভাঙ্গা), এবং আমাশয়ে একপ্রকার যাতনা; কখন কখন বা জ্বর, পৃষ্ঠ বা কটিদেশে বেদনা বা গ্লানি, অথবা চক্ষু ও করতলে দাঁহ, কণ্ঠ শব্দ, কিম্বা সামান্য শিরঃপীড়া প্রকাশ পায়। অনন্তর (১) সর্বাঙ্গে বিশেষতঃ পৃষ্ঠবংশে শীতাহুতব; মুখমণ্ডল ও অঙ্গুলী সঙ্কুচিত এবং শুষ্ক রোমাঙ্কিত হয়। তৎপরে কক্ষ ও দন্ত-বর্ষ জন্মে। সময়ে সময়ে পূর্ববর্ণিত পূর্ব রূপাবস্থার লক্ষণগুলি উপস্থিত না হইয়া প্রথমেই শীত ও কক্ষ প্রকাশিত হয়। কক্ষ সহকারে নাসাগ্র ও গুষ্ঠ নীল বর্ণ, নিখাস ক্ষত, নাকী বেগবতী, জিহ্বা শুভ্র ও শুষ্ক হয়। এবং পৃষ্ঠ, কটি ও অঙ্গে প্রবল বেদনা থাকে। ইহাকেই বিবন্ধু জ্বরের শীতাবস্থা বলে। এক্ষণে রোগীব শীতাহুতব সত্ত্বেও কক্ষতলে তাপমান-প্রয়োগে তাহার গত্র-তাপ বিমুক্তিত ও হস্তপাদির তাপ হ্রাসপ্রাপ্ত দৃষ্ট হয়। ম্যালেরয়ার বিবক্রিয়া বশতঃ জ্বৎপিণ্ডের ক্রিয়া সূচাক্রমে সম্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্ত আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্ত-মঞ্চন হইয়া এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্ত সঞ্চিত হইলেই অত্যন্ত অবস্থা অপেক্ষা শীতাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং যে যন্ত্রে রক্ত সঞ্চিত হয়, সেই যন্ত্রের ক্রিয়া-বিকার জনিত লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পায়। অর্থাৎ মস্তিকে রক্তাধিক্য হইলে শিরঃপীড়া, শিরোগোত্র, নিজাবেশ, প্রেলাপ ও কর্ণনাদ; হৃদযন্ত্র ও জ্বৎপিণ্ডে রক্তাধিক্য হইলে বক্ষঃস্থল ভার, ঘনবাস ও নাড়ীর ক্ষীণতা; এবং আমাশয়, বক্ষঃ বা অঙ্গে রক্তসঞ্চিত হইলে বমন, বিবমিষা, পিত্তের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য, উদরায়ম প্রভৃতি লক্ষণ আবির্ভূত হয়। শীতাবস্থা : অবসানের প্রাকালেশ শরীরের অভ্যন্তরে জ্বালা ও বহির্ভাগে শীতলতা অহুত হয়। অনন্তর অর্ধ ঘটিকা হইতে তিন চারি ঘটিকার মধ্যে ক্ষীত ও কক্ষ হ্রাস পড়ে এবং দ্বিতীয় বা উচ্চাবস্থা আরম্ভ হয়। কাহার কাহার একেবারেই শীতাবস্থা প্রকাশ পায়না। শীতের পরিবর্তে অত্যন্ত দ্রাবীয়তা, আমাশয়ে বেদনা,

দেহে প্রবিষ্ট হয় এবং তথায় কিছু কাল পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া শরীরের বিকার জন্মায় ও রোগ উৎপন্ন করে। ম্যালেরিয়া ব্যাসিলস এই জাতীয় একপ্রকার জীবাণু রক্তে ইহাদের অবস্থিতি বশতই ম্যালেরিয়াজ্বর উৎপন্ন হয়। এই সকল জীবাণু বা কীটোণু নিখাস দ্বাৰা ফুলফুল অথবা পানাহার সহযোগে উদরে প্রবিষ্ট হইয়া অল্প কাল মধ্যে বিধগ্নিত, বিবর্দ্ধিত ও সংখ্যাভীত হইয়া পড়ে এবং বক্তে ও গ্লীহাদি-বস্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে। অতীবাক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে অব-রূপ ব্যক্তির মূত্রে ও ঘৰ্শে ম্যালেরিয়া ব্যাসিলস নামক জীবাণু দেখা যায়। ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানের মৃত্তিকা ও বায়ুতেও এই সকল জীবাণু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জীবাণুপূর্ণ মৃত্তিকা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সুস্থ ব্যক্তির শোণিতে প্রবিষ্ট করিলে ম্যালেরিয়া বিষ-দূষিত বোগীব জ্বর লক্ষণ এবং পর্যায়ে জ্বর ও গ্লীহাব বিরুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়।

গৃহীত ম্যালেরিয়ার পবিমাণ এবং বোগীব স্বাস্থ্য ও বলাহুসারে রোগের উৎপত্তি তারতম্য জন্মে। অধিক পরিমাণে ম্যালেরিয়া গ্রহণ করিলেই প্রবল জ্বর-বিরাম জ্বর উৎপন্ন হয়। কখন কখন সংঘত আকাবে অধিক পরিমাণে ম্যালেরিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অব প্রকাশ না পাইয়া হিমাইনের ভায়ে এক প্রকার অবস্থা জন্মে এবং উহাতে কতিপয় ঘটকাল মধ্যেই বোগীর প্রাণ বিয়োগ হয়। ম্যালেরিয়ার প্রভাব বশতঃ সহসা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিলুপ্ত হইয়া একরূপ ঘটে। ইহাকেই দূষিত বিষমজ্বর বলে। পক্ষান্তরে সময়ে সময়ে এত অল্প পরিমাণে ম্যালেরিয়া শরীরে হয়, যে শিরঃ-পীড়া, গ্লানি বা উদরাময় ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়াই উহাব বিবক্রিয়া নিঃশেষিত হইয়া পড়ে। কখন কখন এতদ্বারা রক্তাভিসার বা শিবঃশূল জন্মিয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই বিষ গ্রহণ সময়ে শরীরের যে বস্ত্রের ক্ষীণতা থাকে তাহাতেই উহার ক্রিয়া সহজে প্রকাশ পায়। অমিতাচারী, ক্ষীণবল ও গণ্ডমালাগ্রস্ত ব্যক্তির যে পরিমাণ ম্যালেরিয়া দ্বারা পীড়িত হইয়া পড়ে, বলিষ্ঠ ও সুস্থকার ব্যক্তিদিগের তাহাতে তত অপকার জন্মে না।

এই বিষ একবার মানব দেহে প্রবিষ্ট হইলে এতদ্বারা যে সকল বিশেষ বিশেষ রোগ জন্মে পুনর্বার ম্যালেরিয়া গ্রহণ ব্যতীতও তাহা উৎপন্ন হইতে পারে। ম্যালেরিয়া জনিত রোগ আরোগ্য হইবার পরেও কয়েক মাস কা

কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত শরীরের এমন একপ্রকার অবস্থা থাকিয়া যায়, যে সাধারণ কারণে অর্থাৎ সর্দি বা বৌদ্ধ লাগাইলে, আহারের অভ্যাচারে বা আর্দ্র রক্ত ধারণ করিলে কিম্বা মিক্রপদে অধিকক্ষণ থাকিলে পুনর্বার জ্বর উপস্থিত হয়।

**লক্ষণ ।**—প্রথমতঃ পূর্বরূপ অবস্থার অর্থাৎ সাধারণতঃ বিষগ্রহণের চতুর্দশ দিবসের মধ্যে অবসন্নতা, দুর্বলতা, অস্থিভা, জ্বন্তণ (হাইতোলা); অঙ্গ-মর্দ (আড়ায়েড়া ভাঙ্গা), এবং আমাশয়ে একপ্রকার যাতনা; কখন কখন বা জন্বা, পৃষ্ঠ বা কটিদেশে বেদনা বা গ্নানি, অথবা চক্ষু ও করতলে দাহ, বর্ণে শঙ্ক, কিম্বা সারান্ত শিবঃপীড়া প্রকাশ পায়। অনন্তর ( > ) সর্কাক্ষে বিশেষতঃ পৃষ্ঠবংশে শীতাহুতব; মুখমণ্ডল ও অঙ্গুলী সঙ্কুচিত এবং ত্বক্ রোমা-ক্কিত হয়। তৎপরে কম্প ও দন্ত-বর্ষ ভয়ে। সময়ে সময়ে পূর্ববর্ণিত পূর্ব রূপাবস্থার লক্ষণগুলি উপস্থিত না হইয়া প্রথমেই শীত ও কম্প প্রকাশিত হয়। কম্প সহকারে নাসাগ্র ও ওষ্ঠ নীল বর্ণ, নিখাস দ্রুত, নাকী বেগবতী, জিহ্বা শুভ্র ও শুষ্ক হয়। এবং পৃষ্ঠ, কটি ও অঙ্গে প্রবল বেদনা থাকে। ইহাকেই বিষমু জ্বরের শীতাবস্থা বলে। এক্ষণ রোগীর শীতাহুতব সত্ত্বেও ক্ষতনে তাপমান-প্রযোগে তাহার গাত্র-তাপ বিবর্দ্ধিত ও হস্তপাদির তাপ হ্রাসপ্রাপ্ত দৃষ্ট হয়। ম্যালোরবার বিবক্রিয়া বশতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হ্রাস-রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। এই জন্ত আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্ত-সঞ্চয় হইয়া এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। আভ্যন্তরিক যন্ত্রে রক্ত সঞ্চিত হইলেই অস্তান্ত অবস্থা অপেক্ষা শীতাবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং যে যন্ত্রে রক্ত সঞ্চিত হয়, সেই যন্ত্রের ক্রিয়া-বিকার জনিত লক্ষণ সমস্ত প্রকাশ পায়। অর্থাৎ স্তন্যদে রক্তাধিক্য হইলে শিরঃপীড়া, শিরোগোন্দ, নিদ্রাবেশ, প্রেলাপ ও কর্ণনাদ; কুসমুস ও হৃৎপিণ্ডে রক্তাধিক্য হইলে বক্ষঃস্থল ভার, ঘনখাস ও নাকীর ক্ষীণতা; এবং আমাশয়, বক্ষঃ বা অঙ্গে রক্তসঞ্চিত হইলে বমন, বিবমিষা, পিত্তের ক্রিয়া-টীব্রাঙ্গণ্য, উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ আবিভূত হয়। শীতাবস্থা :অবসানের প্রাক্কালে: শরীরের অভ্যন্তরে জ্বালা ও বহির্ভাগে শীতলতা অনুভূত হয়। অন-ন্তর অর্দ্ধ ঘটিকা হইতে তিন চারি ঘটিকার মধ্যে শীত ও কম্প হ্রাস পড়ে এবং দ্বিতীয় বা উচ্চাবস্থা আরম্ভ হয়। কাহার কাহার একেবারেই শীতাবস্থা প্রকাশ পায়না। শীতের পরিবর্তে অত্যন্ত স্নানবীরতা, আমাশয়ে বেদনা,



অবিরত বমন, অথবা তন্দ্রা-দোষ জন্মে । শিশুদিগের শীতাবস্থায় কখন কখন আক্ষেপ উৎপন্ন হইয়া থাকে । উষ্ণাবস্থায় সর্বাঙ্গে মুখমণ্ডল ও গ্রীবাদেশে, তৎপরে সর্বাঙ্গে দীর্ঘ প্রকাশ পায় । অনন্তর রোগীর মুখমণ্ডলের আরক্ততা, নাড়ীর বেগের ত্রুততা, কপাল-প্রান্তের শিরাম্পন্দন, উগ্রতা, অস্থিরতা ও অতিশয় পিপাসা জন্মে । শীত ও উষ্ণাবস্থায় রোগী বারংবার স্নান, তীক্ষ্ণ ও জ্বালারমুহুর পরিভ্যাগ করে । উষ্ণাবস্থায় গাত্রতাপ সাধারণতঃ ১০৪ হইতে ১০৬ ডিগ্রী হইয়া উঠে । এই অবস্থা তিন হইতে আট ঘটিকা অস্থিতি করে । ( ৩ ) অবশেষে তৃতীয় বা ঘর্ষাবস্থা উপস্থিত হয় । প্রথমতঃ গ্রীবা ও মুখমণ্ডলে, অনন্তর সর্বশরীরে ঘর্ষ হয় । দাহ, পিপাসা, শিরঃপীড়া ও অস্থিরতাদির বিরতি জন্মে । এইক্ষেণে নাড়ী বগতি স্বাভাবিক হইয়া উঠে । রোগী অপেক্ষাকৃত স্নেহতা ও স্বচ্ছন্দতা অর্জন করবে ; এবং সচরাচর নিদ্রিত হইয়া পড়ে । ঘর্ষাবস্থা গড়ে তিন চারি ঘণ্টা থাকে । ঘর্ষাবস্থায় কখন কখন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার বৈলক্ষ্য বা স্তব্ধতা বশতঃ সাংঘাতিক লক্ষণ উপস্থিত অথবা অকস্মাৎ মৃত্যু হইতে পারে । ( ৪ ) ঘর্ষাবস্থার অবসানে অবস্থা হ্রাসিত হইয়া বিরামাবস্থা উপস্থিত হয় । বিরামাবস্থায় ভিন্নভিন্ন বোগীর ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায় । কাহার কাহার কেবল দুর্বলতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্ষুধা ও পরিপাকশক্তি কোন বৈলক্ষ্য জন্মে না । কোন কোন রোগীর দুর্বলতা, অধি-মান্য ও অজ্ঞাত ক্রিয়া-বিকার দেখা যায় । বিষম জরের ভোগ কাল গড়ে ছয়ঘণ্টা, কিন্তু কখন কখন তদপেক্ষা অল্প বা অধিক দৃষ্ট হয় ।

বিষমজরের আক্রমণ কালে তাপমান দ্বারা শরীর-তাপ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে উহা স্বাভাবিক পরিমাণ ৯৮.৪ অংশ হইতে ১০৫ বা ১০৬ অংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় । এই জরের আবেশ আরম্ভ হইবার কতিপয় ঘটিকা পূর্বেই শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং রোগ অন্তর্হিত হইবার কয়েক দিন পরেও এই প্রকার শারীরিক তাপের বর্দ্ধিত ভাব দেখা বাইতে পারে । রোগান্তে যতদিন গাত্রতাপের এক্রপ অবস্থা থাকে, ততদিন রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগ-মুক্ত হয় নাই মনে করা উচিত ।

যদিও প্রকৃত বিষমজরে পূর্বোক্ত লক্ষণ সমস্ত বিদ্যমান থাকে ; কিন্তু ৭৮ সচরাচর, বিশেষতঃ পুনঃ পুনঃ অরাক্রমণের পরে ইহার বিস্তর ব্যতিক্রম দৃষ্ট

হয়। প্রথম প্রকৃতি ঘটে যে, শীতাবস্থা আর প্রকাশ পায়না অথবা অতি অল্প প্রকাশ পায় এবং কম্প ব্যতীত কেবল উষ্ণাবস্থা উপস্থিত হয়। অথবা পুরোপুরি অথবা অল্পের কোন কোন অবস্থা একবারেই অব্যবহিত থাকে। এই রোগে প্রায়ই শীত ও যক্ষ্মাদি আভ্যন্তরিক যন্ত্র গীড়িত হইয়া থাকে। এই সকল যন্ত্রের বিকৃতি ও বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা উহাদের স্বাভাবিক নিরূপণ করা যায়। অনেকানেক রোগীর শিবোলক্ষণ জন্মে এবং জ্বরের প্রকোপ ক্রমে, বিশেষতঃ উষ্ণাবস্থার বিলক্ষণ প্রলাপ উপস্থিত হয়। কাহার কাহারও আমাশয়িক উপসর্গ প্রকাশ পায় এবং অব্যবহিত দুর্নিবাব বমন হইতে থাকে, আহার ওষধ কিছুই আশ্রয় থাকে না।

পরিণাম।—ম্যালেরিয়া জনিত বিষমজ্বর অনেকদিন থাকিলে প্রায়ই স্বল্প-স্বল্পতা বা এনিমিয়া, প্রীণা যক্ষ্মেব কণ্ঠতা, দেহেব শীর্ণতা, শোথ, শীতাদ, ম্যালেরিয়া জনিত ধাতু-বিকার, উদরাময় ও রক্তাতিসারাদি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

বিনির্গম্য।—বিষম জ্বরের বিরামকালে রোগের সকল সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়। স্বল্প-বিরামজ্বরে জ্বরের সম্যক বিরাম জন্মে না, রোগ লক্ষণ, কিয়ৎকাল কেবল মধ্যাবস্থায় থাকে। বালকদিগের বিষমজ্বর প্রায়ই স্বল্প-বিরাম জ্বরে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। যক্ষ্মাব বিলেপী জ্বর ও গভীর-মূল ব্রণ-শোধের পুথোৎপত্তি পূর্ববর্তী অবস্থাতে ম্যালেরিয়া জনিত বিষমজ্বর পৃথক করা বিশেষ কঠিন নহে। যক্ষ্মার জ্বর ও ব্রণ-শোধের জ্বরে যক্ষ্মা ও ব্রণ-শোধের অন্ত্যন্ত যে সকল লক্ষণ থাকে ম্যালেরিয়ার জ্বরে তাহা থাকে না।

অতিরিক্ত কুইনাইন বা আর্সেনিক সেবন বস্তুতঃ ও কখন কখন ম্যালেরিয়ার লক্ষণের স্তায় কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। উহা কুইনাইনের বিষ-ক্রিয়ায় সল, বাস্তবিক জ্বর নহে। উহাকে ডম-এগিউ বা জ্বাণ জ্বর বলা যায়। সামান্যতঃ অতিরিক্ত কুইনাইন সেবন জনিত “ঘুম ঘুবে” জ্বরও বলে।

প্রতিকার।—সামান্য সন্নিহিতমণ্ডল জ্বর সাংঘাতিক নহে। তবে শীত-যক্ষ্মেব বিকৃতি, শোথ, উদরাময় ও যক্ষ্মাদি উপসর্গ বিলক্ষণ গুরুতর। তৃতীয়ক জ্বর অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য; চতুর্থক দুয়ারোগা; ঐক্যিক সমাধিক

সকটাপন্ন। অগ্রগামী অর' রোগেব বুদ্ধি ও পশ্চাৎগামী অর' অর'র হ্রাস  
জ্ঞাপক।

**চিকিৎসা।**—হোমিওপ্যাথিতে বিষম-অর'র চিকিৎসা তত সহজ  
নহে। চিকিৎসকের তৈবজ্যাত্তে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও ঔষধ নিরূপণে সম-  
র্থিক পারদর্শিতা না থাকিলে এই অব চিকিৎসার সফর কৃতকার্য হওয়া  
লভ্যবপর নহে। চিকিৎসার প্রথমে রোগীর সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণগুলি  
অর্থাৎ অর'র ভোগ ও বিবাম কালে প্রকাশিত, সকল অবস্থার অভিযাক্ত,  
লক্ষণ-সমষ্টি অতি সাবধানে সংগ্রহ করা কর্তব্য। অনন্তর সংগৃহীত লক্ষণ  
সমষ্টির ঠিক সদৃশ ঔষধ নির্বাচন করা বিধেয়। ঠিক সদৃশ ঔষধ নির্বা-  
চিত ও প্রয়োজিত না হইলে অবিলম্বে ও নিশ্চিতরূপে অব আরোগ্য হয় না।  
সদৃশ ঔষধ স্থবীকৃত হইলে সাধারণতঃ তদ্রূপ রোগে তাহার নিয়ন্ত্রণ ও  
পূরাতম যোগে উচ্চক্রম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপর নিয় ক্রমে উপকার  
না দর্শিলে উচ্চক্রম, ও উচ্চক্রমে উপকার না দর্শিলে নিয় ক্রমও ব্যবহৃত হয়।  
ক্রম সফলকে কোন নির্দ্ধাবিত নিয়ম হইতে পরে না। ইহা প্রত্যেক চিকিৎ-  
সকের নিজের ভূয়োদর্শনের উপর নির্ভর করে। সবিরাম অর' অর'র বিরাম-  
কালই ঔষধ প্রয়োগের সুসময়, তখন শরীর অপেক্ষাকৃত উপদ্রবশূন্য থাকে  
বলিয়া ঔষধের ক্রিয়া ভালরূপে প্রকাশ পায়। বিরামকালে বথাবিহিত ঔষধ  
ব্যবহারের পল অর'র যদি কোন প্রকার পরিবর্তন লক্ষিত হয় অর্থাৎ অর' যদি  
অগ্রগামী ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, অথবা পশ্চাৎগামী ও হ্রাস প্রাপ্ত হয় তবে  
প্রদত্ত ঔষধের ক্রিয়া হইতেছে জানিতে হইবে, তখন অস্ত্র কোন ঔষধ প্রয়োগ  
করিয়া সেই ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মান উচিত নহে। অর'র আর এক আক্রমণ  
পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকা কর্তব্য। কলতঃ কি নূতন, কি পুরাতন কোন  
রোগেট, কোন ঔষধ প্রয়োগের পর রোগেব অস্পষ্ট বা ক্রমাগত উৎকর্ষ দৃষ্ট,  
হইলে অস্ত্র কোন ঔষধ বা সেই ঔষধের পুনঃ প্রয়োগ বিহিত নহে। (যৎকৃত  
তৈবজ্যাত্তে মাত্রা ও ক্রম-বিচার দ্রষ্টব্য)।

যদিও বিরাম কালই ঔষধ প্রয়োগের উপযুক্ত সময় ঘটে, কিন্তু অর'-কালেও  
কোন কোন লক্ষণের অতিশয় প্রাবল্য থাকিলে ও নিত্যন্ত আবশ্যক বোধ  
হইলে রোগীর স্বপ্ননার উপশমার্থ বিশেষ বিশেষ লক্ষণে বিশেষ বিশেষ ঔষধ

ব্যবহৃত হয়। শীতের আতিশয্যে কক্ষর, ভিরেট্রুম, বা চারনা ব্যবহৃত করিলে শীতভোগ অনেকটা হ্রাস হইয়া পড়ে। দাহাবস্থার অতিশয় অস্থিরতা, পিপাসা ও অস্থিরতা থাকিলে একোনাইট ব্যবহৃত; শিরোবেদনা থাকিলে বেলেডোনা ব্যবহার্য। অধিক বমন হইলে ইপিকাক; ঘর্ম্মাবস্থার প্রাবল্যে কল ফরিক এসিড; ও অবসন্নকর অতিশর্ষে আর্স, কার্বো, ইপি; এবং গাত্র-বেদনায় আধিক্যে ইউপেটোরিয়ম পার্কোলিয়েটম দেওয়া যাইতে পারে। ডাঃ ডিকিন্সন জ্বরফালীন অমৃৎকট জরে জেলসিমিনম এবং উৎকট বা দূষিত ম্যালেরিয়া জ্বরে ভিরেট্রুম ভিবিডি ব্যবহার করিয়া থাকেন। শীতাবস্থার প্রারম্ভ হইতে দাহাবস্থার শেষ পর্য্যন্ত তিনি এলোপ্যাথি চিকিৎসক দিগের নিজস্ব মিক্চারের ভ্রায় এক এক ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা জেলসিমিনম প্রয়োগ করেন এবং তিনি মনে করেন যে এতদ্বারা অধিকাংশ রোগীর জ্বরের জ্বগৎকালের খর্ব্বতা, তীব্রতাব লঘুতা এবং আত্মবলিক শিরঃপীড়া ও গাত্র-বেদনার স্বল্পতা জন্মে। ম্যালেরিয়া বিষেব বিশেষ আধিক্য না থাকিলে এতদ্বারাই জ্বব সত্ত্বব আরোগ্য হয়। তীব্র শীত, তৎসহ অতিশয় অবসন্নতা, মুখমণ্ডলের কৃষ্ণবর্ণ, তৎপরে উগ্র উত্তাপ, পূর্ণ কঠিন নাড়ী, গ্রীবার ধগনীষ দপদপ, ও রক্তবহা নাড়ীর অতিশয় উত্তেজনা লক্ষণে; সংকেপতঃ দূষিত বা রক্তসঞ্চয় সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের ভ্রায় আক্রমণে তিনি ভিরেট্রুম ভিবিডি ব্যবহৃত করিয়া থাকেন।

হোমিওপ্যাথিতে বিবিধ জ্বরের চিকিৎসায় নিম্নোক্ত ঔষধগুলি ব্যবহৃত হয়; (১) কুইনাইন, আর্সেনিকম, চারনা, ইউপেটোরিয়ম, ইয়েশিয়া, ইপিকাক, ল্যাকেসিস, লোবেলিয়া, ভ্রাইম-মিউর, নক্স-ভমিকা, পলস্কেটিল, স্টেকা, সলফার, ভিবেট্রুম; (২) একোনাইট, ইসকিউলস, এন্টিমোনিয়ম-ক্লডম, আর্ণিকা, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যালকেরিয়া, ক্যাপসিকম, কার্বো-ভেজিটেবিলিস, ক্যানোমিলা, দিনা, ফিরম, জেলসিমিনম, লেকটোপু, ওপিয়ম, পডোফিলম, টার্টার-এমেটিক; (৩) এলিট্রিস, এপোসাইনম, ক্যাস্টোরিস, ককিউলস, ককি, কর্ণল ফ্লোরিডা, ড্রিসিরা, হিপার, হাইড্রাট্রিস, হাইও-নারেরীস, লাক্টিকের শোডিয়ম, মারকিউরিয়ম, মেমিরাইস, মেমোরিয়ম, মক্স-টেন্টা, ভাবাভিলা, সাবুকস, সাইমেক্স, সিন্ধিমা, টাকিসেত্রিয়া, ট্রায়োরিয়ম,

থুজা, ভেলেবিশান, (৪) ইলাটেবিশম, এমুহাবা, কাক্তিস, চেমিডোনিয়ম, সিমিসিফুগা, আমোনিয়ম-মিউব, এনাকার্ডিয়ম, চিনাফাইলা, কুশুম, ডিজি-টেলিস, হেলিবোবস, কালী-কার্ক, দসকবাস, টাবাক্সিকম, ভিরেট্রুম-ভিরিডি ; (৫) আর্সেনিফেট-অভ-কুইনাইন, আবেবিয়া ডায়েডিমা, আলষ্টোনিয়া, কাক্সালা-গুয়া, সিড্রন, গলিগোদ্রম, ইউক্যালিপ্টস, কিউবেয়ার। ইহার মধ্যে সিহোনা, সিকোনা-সলফেট বা কুইনাইন, আর্সেনিকম, নয়ভমিকা, ইপিকাক, নাট্রুম-মিউব, ব্রাইওনিয়া, ও ইউপেটোবিয়ম সর্বপ্রধান। এপিস, আরেথিফা, এণ্টিমোনিয়ম কুডম, কাক্তিস, কাক্সালাগুয়া, ক্যাপ্সিকম, সিড্রন, সাইমেক্স, কিউবেয়াব, ল্যাকেসিস, ইউক্যালিপ্টস, লোনেলিয়া, লাইকোপোডিয়ম, পল-সেটীলা, ট্রিমোনিয়ম দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। অগ্নাণ্ড ঔষধগুলি কোন কোন রোগীর পক্ষে উপযোগী। বাস্তবিক রোগীর লক্ষণ সমষ্টি লিখিয়া লইয়া ঔষধের লক্ষণ সমষ্টির সহিত যত্র পূর্বক তুলনা করিয়া ঠিক সদৃশ ঔষধ নিকৃপিত হইলে সে ঔষধ যে শ্রেণীর অন্তর্গত কেন নাহউক তাহাই সেই রোগীর পক্ষে প্রকৃত ও প্রধান ঔষধ বলিয়া গণ্য করা উচিত।

কুইনাইন দ্বারা ম্যালেরিয়া জ্বরের মূলকাবণ ম্যালেরিয়াব্যাসিলি নামক জীবাণু বিনষ্ট হয়। এই জন্য কুইনাইন এই জ্বরের সর্বপ্রধান ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে এবং জ্বরের বিবাকালে সচরাচর ইহাই প্রয়োজিত হয়। কিন্তু সকল রোগীর পক্ষে কুইনাইন উপযোগী হয় না। বাস্তবিকও বিষম জ্বরে নির্দিষ্টভাবে কুইনাইন ব্যবহার সম-মত সঙ্গত নহে। এলোপ্যাথ-থেরাপী কুইনাইন জ্বরের অমোঘ ঔষধ মনে করেন এবং সকল প্রকার সর্বিষম জ্বরেই উহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। বোগ ও বোগীর বিশেষ প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিলে অনেক স্থলেই ঔষধের অপপ্রয়োগ হয়। ঔষধের অপপ্রয়োগ হইলেই অনিষ্ট ঘটে। বিষমজ্বরে সজ্ব ও বিজ্বর অবস্থার সমগ্র লক্ষণের সহিত ঔষধের সাদৃশ্য দেখিয়াই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়। বিবাকালে লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে অবশ্যই কুইনাইন ১৬ ক্রম বা মূল দুই তিন গ্রেণ ( ১ বা ১১০ রতি ) মাত্রায় তিন চারি ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কোন কোন চিকিৎসক কুইনাইনের পরিবর্তে চায়না ১৬ ব্যবহার করেন। অব সম্যক বিবৃত হইলেও একপক্ষ পর্য্যন্ত জ্বরের নির্দী-

দ্রুত দিনে অল্প পরিমাণে এক এক মাত্রা কুইনাইন সেবন করান কর্তব্য । কেননা ম্যালেরিয়া জনিত সবিরাম জ্বর পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে । কেহ কেহ একেবারে অধিক মাত্রায় কুইনাইন সেবন করাইয়া সহসা জ্বর বন্ধ করিয়া থাকেন । এরূপ কবিলে প্রায়ই কিছুদিন পরে পুনরায় জ্বর প্রকাশ পায় । কখন কখন কুইনাইন দ্বারাও তকণ জ্বর আরোগ্য হয় না । কুইনাইন দ্বারা সত্ত্বর জ্বর বন্ধ না হইলে উহা সেবনে বিশেষ ফল দর্শিবাব সম্ভাবনা নাই । বরং তাহাতে অপকারই হইয়া থাকে । পুৰাতন জ্বরেও প্রায়ই কুইনাইন ব্যবহৃত হয় না । এরূপ অবস্থায় লক্ষণানুসারে অত্যাশ্রয় জ্বর ঔষধই ব্যবহার করা বিহিত । জ্বরে কুইনাইন ব্যতীত আর্সেনিক, নক্সভমিক, পলসেটিল ইয়েশিয়া, ইপিকাক, স্ট্রাটম-মিউব, কার্বো-ভেজি, ইউপেটোরিয়ম, ব্রাইওমিয়া, ক্যাম্পিকম, সাইমেজ, সলফাব, মানকিউরিয়স প্রভৃতি ঔষধই সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

জ্বরের কোন এক অবস্থাব অভাব, জ্বালাকর উত্তাপ, দ্রুত অবসাদন, নিশ্চেষ্টতা ও দুর্বলতা, শোথ, পুষ্টিবাস্পজনিত ধাতুবিকৃতি, কুইনাইন অপব্যবহার, এই সকল লক্ষণে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয় ; ফলতঃ জিহ্বা যতই অধিক পরিষ্কৃত থাকে, যতই শীতল জ্বরে একবার আক্রমণে বোগী অধিক অসম্পন্ন হইয়া পড়ে এবং যতই সত্ত্বর এই জ্বরের প্রকৃতিসিদ্ধ পাণ্ডুবর্ণ প্রকাশ পায় ততই আর্সেনিক দ্বারা অধিক উপকার দর্শে । যদি শীতের পূর্বে উত্তাপ অথবা এক সময়েই শীতোত্তাপ থাকে, বিশেষতঃ আমাশয় ও অন্ত্রের লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে নক্সভমিক উপযোগী । হবিংপাণ্ডু (ক্লোরোসিস) ও জলীয়রক্ত লক্ষণে পলসেটিল। ফলপ্রসূ ; কিন্তু পলসেটিল। রায়মণ্ডলে বিশেষ কার্য্য করে না বলিয়া উহার পরে ইয়েশিয়া ব্যবহার্য্য । শীতাবস্থায় পিপাসা ও উষ্ণাবস্থায় পিপাসার অভাব ইয়েশিয়ার বিশেষ লক্ষণ । জর-কালীন আমাশয়িক লক্ষণ ও বমন থাকিলে ইপিকাক ব্যবহৃত হয় । অত্যন্ত শীতধিকো ভিরেটম-এলুম বা কার্বোভেজিটেবিলিস্ উপকারী । প্রাচীন জ্বরে প্রীহা ও মক্কা বিবর্দ্ধিত হইলে এবং রোগীর মুখাকৃতি পাণ্ডু ও পীত বর্ণ মিশ্রিত থাকিলে স্ট্রাটম-মিউরিয়েটিকম্ প্রয়োজ্য । ঘর্ম ও উত্তাপাবস্থা যুগপৎ উপস্থিত হইলে ক্যাম্পিকম্ ফলপ্রসূ । প্রতিদিন একই

সময়ে জ্বর প্রকাশ পাইলে সিড্রণ উপযোগী । শীতের পূর্বে পিপাসা প্রাতঃকালে শীত, জ্বকালীন পিত্তবমন, জ্বরের শেষাবস্থায় অন্ন ঘর্ম, বিশেষতঃ অস্থিবেদনা থাকিলে ইউপেটোরিয়ম্ পারফোলিয়েটম্ বিশেষ উপকারজনক । অতিশয় ঘর্মপ্রধান জ্বরে ফস্ফরিক এসিড উপযোগী । শুষ্ক-কাশাদি বক্ষোলক্ষণ সম্বলিত জ্ববে ব্রাইয়োনিয়া ও রসটক্স ; এবং ক্রিমি-লক্ষণসংগঠ জ্বরে সিন। ব্যবস্থের । ম্যালেরিয়া জনিত ধাতু-বিকৃতি সংশোধনে সলফার মাদারটিংচার ফলোপধায়ক । কোন কোন চিকিৎসক দীর্ঘকালহারী পুরাতন জ্বরে পলসেটিল ও সিনিসিফুগা পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে বিধি দেন । ডাঃ জুর বলেন যে অল্প কোন বিশেষ ঔষধ জ্ঞাপক লক্ষণ না থাকিলে তিনি প্রথমেই ইপিকাক ব্যবস্থা করিয়া অনেক বোগী আবেগা করিয়াছেন । অধিক পরিমাণে কুইনাইন সেবন জনিত আবদ্ধ জ্ববেও এতদ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে । যদিও ইপিকাক দ্বাৰা সকল রোগী আরোগ্যলাভ করেনা বটে, কিন্তু উহা সেবনে জ্বরের অবস্থা একপ্রকার পরিবর্তিত হইয়া উঠে যে ইপিকাকের পরে নক্সভসিক, আর্সেনিক, পলসেটিল, ইয়েশিয়া প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণান্তমারে প্রয়োগ করিলে বোগী অব-মুক্ত হয় । অতিরিক্ত কুইনাইন বা আর্সেনিক সেবন জনিত জীর্ণজ্ববে ইপিক, কার্বো, সিড্রণ, ও সলফ মাদারটিংচার ফলপ্রদ । কুইনাইন অপব্যবহার জনিত এই প্রকার জীর্ণ-জ্বরে বা ধাতু-দুষ্টতায় পর্যায়ক্রমে আর্সেনিক ও ইপিকাক উপযোগী । এবং কুইনাইন শত বা সহস্র ক্রমেও ফলপ্রদ । \*

---

\* বিধম জ্বরের চিকিৎসায় কোন কোন চিকিৎসক শীতাবস্থায় ব্রাই-ওনিয়া, দাহাবস্থায় জেলসিমিনম, ও বিরামাবস্থায় কুইনাইন বা আর্সেনিক ব্যবহার করিয়া থাকেন । কেহ কেহ শীতাবস্থায় ভিরেটুম ভিরিডি বা চায়না, উষ্ণাবস্থায় একোনাইট এবং বিরামকালে কুইনাইন ব্যবস্থা করেন । কেহ কেহ বা শীতাবস্থাব প্রারম্ভ হইতে ঘর্মাবস্থায় অ্চনা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে একোনাইট ও ব্যাপ্টিসিয়া ও বিরাম সময়ে প্রথম দিন পর্যায়ক্রমে আর্সেনিক ও সিনিসিফুগা ও তৎপরবর্তী অন্ত্যস্ত দিন পর্যায়ক্রমে আর্সেনিক ও নক্সভসিকা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন । আবার কেহবা প্রথম দিন একোনাইট ১ক্রম, দ্বিতীয় দিন কুইনাইন ১বা ২ ক্রম, তৃতীয়দিন

# সবিরামজ্বরে সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধ

## সকলের বিশেষ লক্ষণ ।

এণ্টিম-ফুড ।—মধ্যাহ্নের প্রাক্কালে পিপাসাসংযুক্ত শীত । পায়ের  
বরফের ছায় শীতলতা ও তৎসহকাৰে শবীরের অত্যন্ত হ্রাস ঘটে । আমাশ-  
য়িক উপদ্রব, গুত্র লেপাস্বত জিহ্বা ।

এপিস-মেল ।—সুশ্লেষ্ট অরেক আবেশ । বক্ষঃস্থলের সমুখভাগে বা  
জাম্বুতে শীতের আবস্ত, এবং চুল্লীর নিকটে বা উষ্ণস্থানে শীতের বৃদ্ধি ।  
সামান্য সঞ্চলনে শীতের পুনরাবৃত্তি । শীতাবস্থার পিপাসা । ঘর্ম্মাবস্থায় পিপা-  
সার অভাব । অপবাক্ষ তিনটাব সময় জ্বরের আগমন ।

• আরেনিয়া ডায়েডেমা ।—প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে শীতের  
প্রকাশ ; অতিশয় পিপাসা সহ স্থায়ী শীত ।

আর্গিকা ।—শীতের পূর্বে জ্বরণ ও অধিক পিপাসা এবং অধিক জল  
পান । সর্বশরীরে অতিশয় স্পর্শ-দ্রব ; সকল অস্থির অস্থি-বেষ্টে আকৃষ্টতা  
ও ব্যথিততা । মস্তক উত্তপ্ত, শবীরের অবশিষ্টাংশ, বিশেষতঃ আমাশ-  
য়গত শীতল ।

আর্মোনিকম ।—শীত ও দাহাবস্থাব প্রাবল্য, স্নগ্ন ঘর্ম্ম বা ঘর্ম্মাভাব ।  
ঘর্ম্মকালে রোগ-লক্ষণের অল্পপশন, ও অতিশয় পিপাসা সহকারে বিষমিবা  
এবং জলপানান্তে আমাশয়ে বেদনা । ফুইনাইন অপব্যবহারের পববর্তী জ্বর ।

আর্মোনিক ও ক্রম ; প্রত্যহ দুই হইতে চারিমাত্রা ব্যবস্থা করেন । জ্বর  
থামিলে আর ঔষধ দেন না । অব ফিরিলে পুনরায় এইরূপ চিকিৎসাই  
করিয়া থাকেন । কিন্তু এই প্রকার চিকিৎসা প্রকৃষ্ট সম-ব্রত সঙ্গত কিনা  
তাহা স্থির করিতে পারা যায় না । হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় এলোপ্যাথি  
চিকিৎসার জ্ঞান কোন ধরাবাধা ব্যবস্থায় ঔষধ প্রয়োজিত হইতে পারে না ।  
রোগীর লক্ষণের সহিত ঔষধের লক্ষণের ঠিক সাদৃশ্য দেখিয়াই ঔষধ ব্যবস্থা  
করিতে হয় ।



বেলেডোনা ।—প্রবল শিরঃপীড়া । একবার শীত, একবার উত্তাপ ।  
বারংবার মূত্রতাগ ।

ব্রাইওনিয়া ।—শীতের প্রাধান্য । জ্বরের আবেশের পূর্বে তীব্র  
শিরঃপীড়া, উত্তাপাবস্থায় উহার আদিক্য । বন্ধঃস্থলে হৃদী-বেধবৎ বেদনা ।  
ব্যথিত পার্শ্ব শয়নকালে উপশম অনুভব । আশাশয়িক লক্ষণ ।

ক্যাক্টস ।—ঠিক পূর্বাঙ্ক এগাবটা ও অপবাক্ষ এগারটার সময় নিম্নমিত  
রূপে জ্বরের আবেশ । মূত্র-বোধ । পৃষ্ঠে শীতলতা ও শীতল হস্ত ।

ক্যালেকেরিয়া কার্নি ।—শীত ও উত্তাপাবস্থায় পিপাসা । তুষাববৎ  
শীতল হস্ত সহকায়ে মুখমণ্ডলের উত্তাপ । জ্বরের আবেশের পূর্বে সমস্ত  
সন্ধিতে অক্লিষ্টতা, এবং মস্তক ও সর্দশবীণেন গুরুত্ব । শীতমাত্রণে ও অর্ধ  
স্থলে যাহার অধিক কাজ করে তাহাদের জ্বব । গুণমালা ধাতু ।

ক্যাঙ্কালোগিয়া ।—বসন্তকালেব জ্বর । অতি তীব্র শীত । রক্তকেব  
হস্তের জ্বায় ক্লিষ্ট হস্ত ; মুখমণ্ডল, ওষ্ঠ, ও হস্তের অতিশয় পাণ্ডুবতা ।  
পৃষ্ঠবংশেব নিয়ে ও সর্দহ, বিশেষতঃ রাত্রিতে শয্যায় শবিত অনস্থার পুনঃ  
পুনঃ শীত ।

ক্যাম্পিকম ।—তীব্র পিপাসা সহকায়ে শীত । শীতাবস্থায় প্রীহার  
বেদনা বিশিষ্ট বিবৃদ্ধি । শীতাবস্থায় পৃষ্ঠে উত্তপ্ত বস্ত্র প্রয়োগে উপশম ।

কার্বো-ভেজিটেবিলিস ।—জ্বরের পনে ও শিরঃপীড়ার অবস্থিতি ।  
পুরাতন জ্বর ; জ্বরের অনিষমিত আবেশ । আত্মান ।

সিড্রন ।—ঘট্রির জ্বায় ঠিক নিম্নমিত সময়ে জ্বরের আবেশ ।

ক্যামোমিলা ।—সন্ধ্যাবে প্রচাপ, ও পিত্ত-বমন ।

চায়না ।—পশ্চাদর্তী বা অগ্রবর্তী ; অনেক ফণস্থায়ী জ্বরের আবেশ ।  
হর্সলকব প্রভূত ঘর্ষ । শীত ও দাহাবস্থার মধ্যে পিপাসা এবং পুনরাহ  
ঘর্ষাবস্থায় পিপাসা । বিরামকালে অতিশয় হর্সলতা ।

চিনি-সলফ বা কুইনাইন ।—প্রতিবার প্রায় দুইঘণ্টা আশুয়াইয়া  
জ্বরের আক্রমণ । সুস্পষ্ট বিরাম ।

সিনা ।—জ্বরের সমগ্র আবেশ সময়ে মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্বা । কুক্করবৎ  
ঘন ঘন ক্খা সহকায়ে বমন । শীতল ঘর্ষ ।

**ইউপেটোরিয়ম-পার্কো।**—অনম্পূর্ণ বিরাম। শীতের পূর্বে পিপাসা। অস্থি-বেদনা।

**ইপেটোরিয়ম-পার্প।**—দিবসেব ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জ্বরের আবেশ, একদিন পর একদিন অব।

**ফেরুম।**—জ্বর কালে চক্ষের চারিদিকে ক্ষীততা; নীরঙ্কতা।

**জেলসিনিয়ম।**—আয়বীর লক্ষণের প্রাধান্য; আমাশয় ও বক্তের উপজ্বরের সম্যক অবস্থামানত।

**ইগ্নেশিয়া।**—শীতাবস্থায় পিপাসা, দাহাবস্থায় পিপাসাব অবিদ্যমানতা। উত্তপাবস্থায় পাণ্ডেব শীতলতা। জ্বরের অগ্রবর্তী আবেশ।

**ইপিকা।**—কুইনাইন অপব্যবহারের পনবর্তী অব। শীতের পূর্বে প্রবল বমনচেষ্টা। আমাশয়িক লক্ষণের প্রাবল্য।

**ল্যাকেসিস।**—অন্তবে শীত, বাহিরে তাপ। অপরাহ্নে বা সায়াহ্নে জ্বরের আক্রমণ।

**লাইকোপোডিয়ম।**—শীতের পবেই ঘর্ম, অন্তর্বর্তী দাহাবস্থায় অভাব। অপরাহ্ন চাবিটা হইতে আটটাব মধ্যে জ্বরের আক্রমণ।

**মারকিউরিয়স।**—উগ্র হর্গন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম। রাত্রে শয়িত অবস্থায় জ্বরের আক্রমণ।

**ম্যাট্রম-মিউরিয়েটিকম।**—কুইনাইন অপব্যবহারের পর উত্তাপাবস্থায় তীব্র শিরঃপীড়া। সর্জনবীরে, বিশেষতঃ শীতাবস্থায় বেদনা। পদতলে ও কক্ষ-তলে প্রভূত ঘর্ম। পূর্বাহ্নে ( দশটার সময় ) জ্বরের আক্রমণ, কখন কখন আংগুয়াইয়া আংগুয়াইয়া জ্বরের প্রকাশ।

**নক্স-ভমিক।**—শীত ও উত্তাপ বিমিশ্রিত, শীত উত্তাপের একটা আভ্যন্তরিক, অপরাহ্ন বাহ্যিক অথবা উভয়ে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত; বিষার মদিয়া পানের আকাঙ্ক্ষা, বক্তব্য-শিরায় বক্ত-সঞ্চয়। বিরামকালে আমাশয়িক লক্ষণ। স্তম্ভপায়ী শিশুদিগের সবিরাম জ্বর।

**পলমেটিকা।**—অবিবর্ত শীত, শীত অস্থিত, বিরামকালেও শীতানুভব এবং জ্বরের আক্রমণকালে পিপাসাব অভাব, অপবা কেবল উত্তাপাবস্থায়

শিপিাস। স্ত্রীদিগের রক্ত-হীনতা। অপবাক্সে বা সন্ধ্যাকালে জ্বরের আক্রমণ।  
উত্তাপাবস্থায় গাত্রাবরণ উন্মোচনে শীতানুভব।

স্রাশ্মুকস।—শয্যার বাইরা ভাইবার পূর্বে কম্পকর শীত। ঘর্ষণশূন্য  
উত্তাপ, গাত্রবস্ত্র তুলিয়া ফেলিতে অনিচ্ছা। অতিশয় অধিক পরিমাণ, অবসন্ন-  
কর ঘর্ষণ, বিরামকালেও ঘর্ষণ বিদ্যমান থাকে।

সিলিশিয়া।—গণ্ডমালা ধাতু-ছষ্ট বালকদিগেব জ্বব; সর্পশরীরের  
জ্বালকর উত্তাপ; আরক্ত ও ক্ষীত মুখসঙল, প্রতিনিয়ত উদবাসন্ন সহ উদ-  
য়ের ক্ষীততা। জ্বের বিরামকালে শিশুদিগের অতিশয় খিটখিটে স্বভাব,  
স্পর্শ করিলে বা কিছু বলিলে ক্রন্দন।

ভিরেট্রম এলুম।—শীত ও শীতাবস্থায় শীতল পানীর দ্রব্য সেব-  
নের অতিশয় আকাঙ্ক্ষা। শীতল আঠাআঠা ঘর্ষণ।

ভিরেট্রম-ভিরিডি।—উত্তাপাবস্থায় প্রাবল্যে ও বস্ত্রবহানাড়ী মত্ত-  
তার প্রবল উত্তেজনায় উত্তাপাবস্থায় ব্যবহাব করা বাইতে পারে।

## বিষম জ্বরের উপসর্গ।

প্লীহা।—বিষম অবস্থায় শীতাবস্থায় প্লীহায় বক্তসঞ্চয় হইয়া উহার  
বিধানতন্ত্রগুলি প্রদাহিত হইতে থাকে, স্রুতবাং ক্রমে ক্রমে প্লীহা অতিশয়  
বিবর্তিত হইয়া পড়ে, তখন আব সহজে উহা সঙ্কুচিত হইয়া স্বাভাবিক আয়-  
তন প্রাপ্ত হয় না। প্লীহায় রক্তসঞ্চয় হইলে পঞ্জবাস্ত্রের নিম্নভাগে বায়ু কুঞ্চিত  
চাপ দিলে বেদনা অসহ্য হইত হয় এবং অঙ্গুলী দ্বারা প্লীহা স্পর্শ করিলে উহার  
বিবর্তিত অবস্থা বুঝা যায়। কখন কখন বেদনা দি বাতীত ও প্লীহা বর্ধিত হয়।  
প্লীহা রোগাক্রান্ত হইলে বক্তের লোহিত কণা নূন হয়, স্রুতবাং রোগীর বর্ণ  
পাণ্ডুর অর্থাৎ ফেকাসে হইয়া উঠে। কখন কখন অকস্মাৎ বিবর্তিত প্লীহা  
বিদীর্ণ হইয়া ভূত্বা হয়। চিকিৎসা।—বিবর্তিত প্লীহায়—মার্ক বিনি-  
রোড, বের্বেবিস্ ভল্গেবিস্, ইয়েসিয়া, ক্যাপসিকম্, চায়না, আর্সেনিক, ফেরুম,  
এগোবিস. মার্নাবিউবিস. জাট মিউব, কালী স্রোম, স্পিষ্টিয়া ২, সেবিসাইট্রিট

অব্ কুইনাইন এক গ্রেণ মাত্রায় দিনে তিনবার, সিয়েনোথস্ প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হয় এবং বিন্‌আইয়োডাইড্ অব্ মার্কুরিব মলম বা জলপটী বাহ্য প্রয়োগ করা যায়। প্লীহা বেদনায়—একোনাইট, আর্গিকা, ও ব্রাইয়োনিয়া; এবং প্লীহা হইতে রক্তস্রাবে—একন, আর্গ, আর্স চায়না ব্যবহৃত হয়।

যকৃৎ ।—বিষমজ্বরে পুনঃ পুনঃ শীতাবস্থায় প্রকাশ বশতঃ আভ্যন্তরিক যন্ত্রে অবলম্বনে রক্ত ধাবিত হয়। উদরের দক্ষিণ দিকে যকৃৎ (মেটে)-নামক যে যন্ত্র আছে তাহাতে ঐ রক্তসঞ্চিত হইলে উহা প্রসারিত ও বর্ধিত হইয়া উঠে। রক্তসঞ্চয় বশতঃ কখন কখন যকৃতে প্রদাহ উৎপন্ন হয়। লেপার্বত জিহ্বা, প্রাতে মুখের বিরসতা, ক্ষুধাবলক্ষণা, শিরঃপীড়া, কোষ্ঠ-রোধ, বমনেচ্ছা, দক্ষিণ কুক্ষিদেখে পূর্ণতা ও ভাব অস্বভাব, আলস্ত ও বিষমতা এবং সময়ে সময়ে দক্ষিণ দিকে বেদনা যকৃতে রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণ। যকৃতে প্রদাহ জন্মিলে রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণগুলি তীব্রতর হয়। অপিচ, যকৃতে বেদনা জন্মে এবং অঙ্গুলী দ্বারা যকৃৎ নিপীড়ন, দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ ও বামপার্শ্বে শয়ন করিলে কিংবা কাসিলে সেই বেদনা বৃদ্ধি পায়। যকৃৎ-প্রদাহের সহিত কখন কখন জ্বর থাকে, কখন কখন থাকে না। চিকিৎসা ।—যকৃৎ-প্রদাহে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহৃত হয়,—একন (জুব); ব্রাই ও মার্ক পর্যায়ক্রমে (জ্বর হ্রাস পড়িলে); হিপার (যকৃতে ত্রণ উৎপত্তি হইবার আশঙ্কা জন্মিলে); কোনা, ফস, নক্স ভ, ক্যাম; উক্সেদ। যকৃৎ-বিবর্দ্ধনে—গডোকিলম, লেপ্টাণ্ডা, ইসকিউলাস্, ফস, মার্ক, এসিড্-নাইট্, এগার, হাইড্রাস, আর্স, চায়না ফলপ্রদ। ডাঃ ব্রোসেট বলেন যে ম্যালেরিয়া জ্বরের পৰ্য্যন্ত যকৃতের পুরাতন রক্তসঞ্চয়ে তাইপারা বিশেষ উপযোগী। যকৃৎশূলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহৃত হয়—একন (তীব্র বেদনা); ব্রাই (জ্বালাকর, অথবা আকৃষ্ট বা হলবোধবৎ বেদনা, বাতপ্রসূ ব্যক্তিদিগের); মার্ক (অতীব বেদনা); স্ত্রাবাদ (চাচিয়া লওয়ার স্থাব অস্বভাব)। যকৃৎ-রোগবশতঃ উদরী বা উদরশোথে—আর্স, ক্রোট-টিগ, এপোসাই, এপিস, এসিড্-নাইট্, নক্স-ভম দেবন ও উদরে জলপটী বন্ধন উপযোগী।

শোথ ।—কোন প্রতিবন্ধক বশতঃ রক্তসঞ্চলন-ক্রিয়া সন্ধ্যাক প্রকারে

নিম্নম্ন না হইতে পারিলে শিরায় রক্ত-সঞ্চয় হয় এবং উহাব কৈশিকাগুলির আচুষণ-শক্তির হ্রাস বা অভাব হইয়া পড়ে স্তবৎ রক্তের জলিয়াংশ ঐ সকল কৈশিকার প্রাচীরের অভ্যন্তর দিয়া বহির্গত ও বহির্ভাগে সঞ্চিত হয়। ইহা-কেই শোথ বলে। বিষমজ্বরে প্লীহা ও যকৃতের পীড়া জন্ম শোথ জন্মে। এই শোথ প্রথমতঃ নিম্নোদবে উৎপন্ন হয়। হৃদ্রোগ বশতঃ শোথ জন্মিলে প্রথমে হস্তপদে প্রকাশ পায়, অনন্তর ক্রমে ক্রমে সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়।

**চিকিৎসা।—সর্ববাস্তব শোথ।—**একন, টেরেব (জ্বজ্জনিত তরুণ শোথ); আর্স, ইলেট, এপিস, হেলি, চায়না, এপোসাই; ডিজি (হৃদ্রোগ-জনিত)। **একাজ্জন শোথ—**এপোসাই, আর্স, এপিস (উদরেব), আর্স এপিস (উদরেব); আর্স, ব্রাই, ডিজি, হেলি (বক্ষঃস্থলের); আর্স, এপিস, ফির, সলদকুটনা, চায়না (হস্তপদেব); এপিস, আর্স (মুখমণ্ডলেব); হোল এপোসাই, বেল সলফ, কাক-কার্ক, সিলি (মস্তকের); একন, আইয়োড, পলস, ব্রাই (মস্তিষ্ক); আইয়োড, বোড, অবম, গ্রাক (অণ্ডকোষের)।

**দুর্বলতা।—**ফসফরিক এসিড, ক্যালকেরিয়া, সলফা, ফেবম।

**বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ।—**শীত ও বর্ষাকালে সময়ে সময়ে বিষমজ্বর সহকারে বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ দৃষ্ট হয়। এই উপসর্গ উপস্থিত হইলে ব্রাই, এণ্ট-টাট, ইপিকাক প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা কবা যায়। স্বল্পবিরামজ্বর দ্রষ্টব্য।

**পথ্যাপথ্য।—**জ্বর পুরাতন হইলে জ্বরের দিন অন্ন পরিমাণে লঘুপাক পথ্য অর্থাৎ আবারুট, সাগু বা অন্নগুণাদি আহাব কবা উচিত। বিরামের দিন মাণ্ডবাদি স্নমৎস্তেব বোল, স্বেদন রুটি অন্ন পরিমাণে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন ও দুগ্ধ ব্যবহেয়। তরুণ অবস্থার সামান্য জ্বরের স্থায় পথ্য প্রদান করা উচিত। এই জ্বরে স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন কবা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যদি নিতান্ত জ্বর-পীড়িত প্রদেশে বাস কবিতো হয় তবে সন্ধ্যাকালে বা প্রত্যুষে শুল্কোদরে গৃহেব বাহিবে যাওয়া উচিত নহে। প্রাতে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া বাহির হওয়া ভাল। খটাদি উচ্চ শব্দ্যায় অথবা গৃহেব উপরিতলে শয়ন করা বিহিত। দিবাত্নাগে গৃহে বায়ু ও সূর্যালোক প্রবিষ্ট হইতে দেওয়া কর্তব্য, কিন্তু নিশাবাবু প্রতিরুদ্ধ করা সর্বতোভাবে উচিত। জ্বর-ঋতুতে ক্লান্তি, অতিভোজন এবং বায়ুপ্রবাহে অবিকল্প উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান

থাকা নিষিদ্ধ। পুষ্কবদিগের পক্ষে অপ্রয়োজন উপকারজনক। গলদেশ বস্ত্রাঘাত  
রাখিলেও হইতে পারে। পুতিবাম্প-প্রধান স্থানে বাসিকালীন মুখকদ্ধ করিয়া  
কেবল নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস গ্রহণ ফলপ্রদ। \*

প্রাতে ও বাস্ত্রিতে এক এক মাত্রা চারনা সেবন বিষমজ্বরের প্রতিষেধক।  
ঔষধ সকলের বিস্তারিত লক্ষণ পুস্তকের শেষভাগে ও সংকৃত ভৈষজ্যতত্ত্বে  
দ্রষ্টব্য।

—\*—

## (২) প্রচ্ছন্ন জ্বর, ছদ্মজ্বর—ম্যাস্কড ম্যালেরিয়স ফিভার।

শরীরে অল্প পরিমাণ পুতিবাম্প প্রবেশ কবিলে ক্ষীণ ও উপদাহ-প্রবণ  
ধাতুতে দীর্ঘ জ্বর উৎপন্ন হয়, ইহাকেই প্রচ্ছন্ন জ্বর বলে। এই জ্বর সবিরাম  
ও স্নানবিরাম উভয় প্রকারই হইয়া থাকে এবং প্রায়ই শীতাদ রোগেব সহিত  
সংসৃষ্ট দৃষ্ট হয়।

এই রোগাক্রান্ত হইলে উত্তাপ, কক্ষতা, করতল জ্বালা, কখন কখন পদ-  
তল দাহ, সময়ে সময়ে কর্ণনাদ, সর্কাস্কীন ঘনি, অল্প অল্প শিরঃপীড়া এবং  
অগ্রসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। নাড়ী উত্তেজিত হয় না, করতল  
ভিন্ন অল্প কোথাও স্পর্শ করিলে গাত্র উত্তপ্ত বোধ হয় না, কিন্তু তাপমান  
দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে গাত্রতাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ  
অধিক। ক্ষুধার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না বটে, কিন্তু হ্রাসিত হয় না। করতল-  
জ্বালা প্রায়ই সমভাবে থাকে তবে একটু একটু বিরাম পড়ে; তখন হস্তবল  
কিঞ্চিৎ অর্জ হয়; অথবা কবতল-জ্বালার সন্ধ্যা বিরতি জন্মে। এই অবস্থা  
মাসাবধি বা বৎসরাবধি একং সামান্যভাবে বিদ্যমান থাকে যে রোগীর তৎ-  
প্রতি বিশেষ কোন মনোযোগ জন্মে না। কিন্তু কোন কোন রোগীর পক্ষে

---

\* কেহ কেহ অনুমান করেন যে চন্দ্রের আকর্ষণের সহিত ম্যালেরিয়ার  
সম্বন্ধ আছে। অতএব ম্যালেরিয়া জ্বগ্ৰস্ত ব্যক্তিদিগের কোন কোন তিথিতে  
অর্থাৎ পক্ষমী, দশমী, অমাবস্তা ও পূর্ণিমার অব্যবহিত পূর্বে বিশেষ সতর্ক  
থাকা আবশ্যক। সে সময় সর্দি না লাগান, লঘু আহার গ্রহণ ও এক টাই  
মাত্রা জ্বর ঔষধ সেবন বিহিত।

ইহা অসুখ জনক ও বিরক্তিকর হইয়া উঠে। যে সকল ব্যক্তিদিগের এই প্রচ্ছন্ন জ্বর হয় তাহাদেব বড় একটা স্পষ্ট জ্বর হয় না কিন্তু গীহা গীড়িত ও বিবদ্ধিত হইয়া থাকে। অপিচ, হ্রস্বলতা, রক্তস্রবতা, বিনশতা, উদরাময়, অপ্রকৃষ্টতা, পামা, অর্জীর্ণ, হৃৎকম্প প্রভৃতি জন্মে। ইহাকেই পুতিবাস্পজ ধাতুবিরতি কহে।

চিকিৎসা।—একগ্রেণ কুইনাইন চারি আউন্স জলে মিশ্রিত করিয়া এক ড্রাম মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর অথবা কুইনাইন ১৬ ক্রম বা মূল এক হুই ডেণ মাত্রায় ব্যবস্থা করিলেই প্রচ্ছন্ন জ্বর আরোগ্য হয়। কখন কখন লক্ষণানুসাবে নক্স-ভমিক, আর্সেনিক, বেলোডোনা, সিগি-সিফুগা, ইপিকাক, সল্‌ফার প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যিক হয়।



## দূষিত বিষমজ্বর —পার্লিসস্ ইণ্টার- মিটেণ্ট ফিভার।

এক প্রকার উৎকট আকারের বিষম জ্বরে দূষিত বিষমজ্বর বা সাধারণতঃ রক্ত সঞ্চয় জনিত শীত-প্রধান জ্বর বলে। এই জ্বরে সামান্য ম্যালেরিয়া জ্বব অপেক্ষা অতিশয় তীব্রতা ও সাংঘাতিকতা বিদ্যমান থাকে। উষ্ণপ্রধান দেশে ও নিম্ন অনুপ প্রদেশেই ইহার অধিক প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। রোগীর হ্রস্বলতা ও প্রতিক্রিয়াকারিণী শক্তির অভাব বশতঃ পর্যায় জ্বরের শীতাবস্থা অতিশয় উগ্র ও দীর্ঘ হইয়াই দূষিত বিষম জ্বর নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—এই জ্বরে সাধারণতঃ সামান্য বিষম জ্বরের ত্রায় পূর্বে লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ঐক্যাত্মিক বা তৃতীয়ক জ্বরের আবেশের ন্যায় হুই একবার জ্বরের আবেশ উপস্থিত হয়। কিন্তু জ্বরের বিরাম কালে রোগীর অপেক্ষাকৃত অধিক অবসন্নতা, হ্রস্বলতা ও অস্থিরতা দেখা যায়। অনন্তর অতিশয় অবসন্নতা ও গাত্র-পৌরব বিশিষ্ট দীর্ঘকাল ব্যাপী শীত উপস্থিত হইয়া প্রকৃত দূষিত বিষম জ্বর প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তখন চর্ম পাণ্ডুর ও ক্ষুণ্ণিত;

মুখাকৃতি হ্রাস ও সঙ্কুচিত ; ওষ্ঠ ও নাসিকা নীলিম ; জিহ্বা পাণ্ডুব ও লো-  
লিত ; দেহশাখা শীতল, স্পর্শজ্ঞান পরিশূন্য, ও নীলাভ ; নাড়ী ক্ষীণ ; বিষম,  
ও দ্রুত ; এই সকল লক্ষণ আবির্ভূত হয় । সাধারণতঃ কম্প থাকেনা, কিন্তু  
অতিশয় পিপাসা থাকে ; রোগীও অস্থিরতা ; আকুলতা, বক্ষ-গৌরব, ও  
খাসকষ্ট জন্মে ; গাত্ররক ক্রমে ক্রমে অধিকতর শীতল হইয়া পড়ে এবং আঠা  
আঠা ঘর্ষে আবৃত হয় ; কাহার কাহার দেহে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কালিমা  
অর্থাৎ কালশিরা প্রকাশ পায় । কোন কোন রোগীর সাংঘাতিক বিমূঢ়িকার  
স্তায় লক্ষণ উপস্থিত হয় । বাবংবার বমন ও তণ্ডুলাবৃত্ত বিনেচন হইতে থাকে  
এবং বোগীকে সম্ভব অবসন্ন করিয়া ফেলে । যদি প্রতিক্রিয়া না জন্মে তবে  
অবসন্নতা বাড়িতে থাকে, নাড়া ক্রমশঃ ক্ষীণ ও অবশেষে স্পন্দনশূন্য হইয়া  
রোগীর মৃত্যু হয় । অন্তিম কাল পর্য্যন্ত তাহার চৈতন্য থাকে । অধিকাংশ  
রোগীরই এক প্রকাব মোহ বা তন্দ্রা-দোষ জন্মে এবং মৃত্যুর কতিপয় ঘটিকা  
পূর্বে পর্য্যন্ত সেই মোহ বিদ্যমান থাকে । কাহার কাহার প্রলাপও জন্মে ।  
রোগী আরোগ্য হইবার হইলে ক্রমে ক্রমে অশ্রুত লক্ষণগুলি উপশান্ত হয় ।  
তাহার গাত্র উষ্ণ, শীতল ঘর্ষ স্বগিত ; নাড়া ক্রমশঃ সবেল ও নিয়মিত এবং  
অত্যন্ত অবসন্নতা দূরীকৃত হয় । স্নেহ একটু একটু শক্তির পুনরাগমন অনুভব  
কবে ও নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে ।

**প্রকার-ভেদ ।**—দূষিত ম্যালেরিয়া অব ছয়প্রকার ; যথা, (১) মোহ  
প্রধান, (২) প্রলাপ-প্রধান, (৩) অতিশয়-প্রধান ; (৪) শীতলতা-প্রধান ;  
(৫) শ্বেদ-প্রধান ; (৬) পাণ্ডু-প্রধান । ইহার মধ্যে প্রলাপ-প্রধান ও পাণ্ডু-  
প্রধান অপেক্ষাকৃত বিরল ।

**কারণ ।**—সবিরাম জ্বর ও জ্বর বিবাম অবব কাবণেব ন্যায় এই  
জ্বরের কারণও ম্যালেরিয়া বা পুতি বাস্প । কিন্তু ইহাতে গৃহীত ম্যালেরিয়ার  
আধিক্য বা প্রাবল্য থাকে ।

**বিনির্গম ।**—সামান্য সবিরাম জ্বর অপেক্ষা দূষিত বিষম জ্বরের লক্ষণ  
তীব্রতর ও সর্বাস্ত্রীন দুর্বলতা প্রবলতর । সংন্যাসের মোহ ও একাকীন  
পক্ষাঘাত, জ্বর ব্যতীত হঠাৎ উপস্থিত হয়, দূষিত জ্বরের মোহ ও পক্ষাঘাত  
জ্বর সহকারে উৎপন্ন হয় । মিনিঞ্জাইটিস রোগের মোহ প্রলাপাদি হইতে



কয়েক দিনের মধ্যে উপস্থিত হয়, দূষিত জ্বরের মোহ, দুই এক দিবসের মধ্যেই প্রকাশ পায়। দূষিত জ্বরে রক্তে একপ্রকারে বর্ণক পদার্থ; প্রস্রাবে এষুমেনেব অভাব, মল প্রথম দুই একবার রক্ত মিশ্রিত ও অপ্রচুর থাকে; ওলাউটায় রক্তে বর্ণক পদার্থের অভাব, মূত্রে এষুমেন ও মল প্রচুর থাকে।

প্রস্তাবন।—এই জ্বরের ভাবীফল সঙ্কটজনক। জ্বরের প্রথম বা দ্বিতীয় আক্রমণে বোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে, তৃতীয় আক্রমণে প্রায়ই বাঁচে না। সম্বর প্রতিক্রিয়া, হৃৎকের উষ্ণতা ও স্বাভাবিক বর্ণ; পূর্ণ ও নিয়মিত নাড়ী শুভ লক্ষণ। অসম্যক প্রতিক্রিয়া, ক্ষীণ ও বিষম নাড়ী, ও অবসন্নতাস্থ-ভব অশুভ লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে দ্বিতীয় বাব অবাক্রমণের অতিশয় আশঙ্কা থাকে। প্রথমাক্রমণে বোগীর জীবন সমধিক সঙ্কটাপন্ন হইলে বিতীয়াক্রমণে সম্ভবতঃ তাহার মৃত্যু হয়। অতএব আক্রমণ কালে যেমন সাবধান থাকা আবশ্যক, অল্প আক্রমণ প্রতিষেধে ও তদ্রূপ বিশেষ যত্ন-শীল হওয়া উচিত।

চিকিৎসা।—এই জবে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অতঃপর দ্বিতীয় বা তৃতীয় আক্রমণ সময়ে সাবধানে উত্তেজক পদার্থ ব্যবহার করিলে উপকার দশিতে পারে। প্রতিক্রিয়া উদ্বীপনার্থ বাহ্যিক উত্তাপ প্রদানে উপকার দর্শে। উষ্ণ বালুকা বা লবণের পুটলি প্রয়োগ ফলপ্রসূ। অঙ্গদর্ষণ ও উপকাৰী। এই বোগে প্রধানতঃ আর্সেনিকম, ক্যাম্ফর, ভিরেট্রম ও কুইনাইন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### প্রধান প্রধান ঔষধের লক্ষণ।

আর্সেনিকম।—শরীরের ভ্রূষাবৎ শীতলতা; শীতল ঘর্ষ; ওষ্ঠ ও অঙ্গুলীর নীলাভা, অতিশয় উৎকর্ষ ও অস্থিরতা; দুর্বলতা ও অবসন্নতা, ক্ষীণ ও অনিয়মিত নাড়ী; ও অত্যন্ত পিপাসা লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। প্রতিক্রিয়া আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক, তৎপরে দীর্ঘ ব্যবধান কালের পর ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

ক্যাম্ফর।—অত্যন্ত অবসন্নতা, দুর্বল, প্রায় অপ্রাপ্য নাড়ী, গাত্রে আঠা আঠা ঘর্ষ; তজ্জাদোষের প্রবণতা লক্ষণে এই ঔষধ প্রয়োজ্য।

**ভিবেট্রুম ।**—আসিষিক বিহচিকার ছায় লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ভিবেট্রুম এরম ব্যবহৃত হয়। গাত্র ববকের ছায় শীতল, অথচ রোগী শীতলভব করে না। কিন্তু অনাবৃত থাকিতে ভালবাসে, শীতল ঘর্ম্মসিক্ত আকৃষ্ট গাত্রত্বক; স্মৃষ্ণ; কুঞ্চিত মুখাকৃতি, পাতলা তবল পদার্থ বমন, অস্ত্র হইতে তপ্পলাশ্রুৎ বিনেচন; ক্ষুদ্র ও স্তম্ভবৎ নাড়ী, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগের ভাগ শ্বাস, এই সমস্ত লক্ষণে ভিবেট্রুম তৃতীয় দশমিকক্রম প্রতিক্রিয়া আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত পাঁচ মিনিট অন্তর এক একবার ব্যবহৃত হয়।

**কুইনাইন ।**—বিসানকালে কুইনাইন প্রথম দশমিকক্রমের বিচূর্ণ হই প্রণ নাভ্রায় এক ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করা কষ্টব্য। কোন কোন চিকিৎসক পুনর্বার জ্বরাক্রমণ প্রতিষেধার্থে এই জ্বর প্রথম হইতেই কুইনাইন অথবাচ প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

অন্তর্কর্ষী ঔষধ স্বরূপ (১) নোই-প্রধান দূষিত জবে, ওপিয়ম বা রসটক্স; (২) প্রলাপ-প্রধান জবে, হাই ওসারেগাস বা বেলেডোনা; (৩) অতিসাব-প্রধান জবে, আর্সেনিকন, ভিবেট্রুম, পডোফিলম, (৪) হিমাস-প্রধান জবে, ক্যাম্পন; ক্যাস্টোলেজি, ভিবেট্রুম, (৫) ঘর্ম্ম-প্রধান জবে, চাবনা, জাবরগাণ্ডি, ফসফরাস; (৬) পাণ্ডু-প্রধান জবে, মোটেলস, ইউপেটোবিয়ম পার্কো, ব্রাইওনিয়া, প্রভৃতি ঔষধও লক্ষণানুসারে আবেশ্যকীয় হইতে পারে।

### (৩) শ্রমবিবরণ জ্বর ।\* রিমিটেন্ট ফিভার ।

এই জরকে ইংবেজি চিকিৎসা-গ্রন্থে টেবাইফিবার, জঙ্গল ফিবার, বেঙ্গল ফিবার ইত্যাদিও বলে। এই সকল জবেল লক্ষণ সামান্ত্রিকঃ একই প্রকার। স্থানভেদে কেবল নামভেদ হইয়া থাকে।

\* শ্রমবিবরণ জ্বর আয়ুর্বেদোক্ত বাতজ্বর ও পিত্তজ্বরের সহিত ঐক্য হয়।  
এক্ষণ বিদ্যুৎ বাতজ্বর ও পিত্তজ্বর বড় দৃষ্ট হয় না, প্রায়ই দ্বন্দ্বজ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইহা এক প্রকার অসংক্রামকজ্বর, অনিয়মিতরূপে ইহার প্রকোপ ও লাঘব জন্মে । দীর্ঘকাল স্থায়ী উষ্ণাবস্থাকেই ইহার প্রকোপকাল বলে । এই অবস্থার লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিবাক পায় না, কেবল কতকটা হ্রাস পড়ে । এই জন্ত ইহাকে স্বল্পবিবাকজ্বর বলে । ইহাতে তীব্র শিবঃপীড়া, যকৃতের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য এবং সচবাচর অনেক পীতবর্ণ বিদ্যমান থাকে । স্বল্পবিবাকজ্বরে সন্নিপাত-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহাকে টাইফো-ম্যালেরিয়াস কিভার বা সন্নিপাত লক্ষণাপন্ন স্বল্পবিবাকজ্বর বলে ।

**লক্ষণ ।**—কখন কখন এই রোগ সহসা উৎপন্ন হয়, কিন্তু সাধারণতঃ প্রথমে এক দুই দিন চুলগতা, অবসন্নতা, মানসিক অবসাদ ও সর্কাজীন মানি প্রভৃতি পূসকণ বিদ্যমান থাকে, তৎপরে শীত, কম্প, শিরোবেদনা, অক্ষিগোলক-বেদনা, পৃষ্ঠ ও অন্ত্রবেদনা, বিবাকিষা, পিত্তবমন অথবা বিরেচন, আমাশয়-গল্বে চাপ, অস্বচ্ছন্দতা বা বেদনা অল্পভব, মলাবৃত্ত জিহ্বা, রক্ত ও উত্তপ্ত ত্বক এবং প্রভাস্তর চক্ষু প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় । ইহাকেই স্বল্প-বিবাকজ্বরের প্রথমাবস্থা বা শীতাবস্থা বলে । এই শীতাবস্থার বোগী যদিও শীত অল্পভব কবে বটে, তথাপি তাপমান দ্বারা গাত্র-তাপ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, উহা স্বাভাবিক তাপ অপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ।

স্বল্পবিবাকজ্বরের এই প্রথম অবস্থা কেবল অল্পক্ষণ থাকে এবং প্রায়ই কয়েকবার অবাক্রমণেব পরে স্পষ্টরূপে জানা যান না । অনন্তর দ্বিতীয় অবস্থা উপস্থিত হয় । দ্বিতীয় অবস্থা বা দাহাবস্থার ভোগকাল প্রায় ৮ ঘটিকা । এই অবস্থায় নাড়ীর দ্রুততা, নিশ্বাসের গুরুত্ব, অত্যন্ত অস্থিরতা, ও ত্বকের উত্তপ্ততাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় । শরীর-তাপ ১০৩ অংশ হইতে ১০৬° অংশ, নাড়ীর স্পন্দন ১০০ প্রতি ১০০ বাব পর্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে । মুখমণ্ডল আবৃত্ত, চক্ষু বদ্ধবর্ণ, অস্বচ্ছ আলাপ বা প্রলাপ থাকে এবং কখন কখন সহসা বা ক্রমশঃ সর্কাজীন পীতবর্ণ হইয়া উঠে । সময়ে সময়ে আমাশয়ের অত্যন্ত উগ্রতা, হিকা ও হৃদয় বমন উপস্থিত হয় । মূত্র আরক্ত ও স্বল্প এবং মল সাধারণতঃ অবকক থাকে, কাহার কাহার বা প্রকৃত জলবৎ অতিসার জন্মে । এই অবস্থার দুই প্রহরের সময় আবৃত্ত হইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় অথবা রাত্রি দুই প্রহরের সময় আরক্ত হইয়া প্রাতঃকালে মল্যাবস্থা প্রাপ্ত

হয় । এই মধ্যাবস্থাকেই ইহার স্বল্পবিবামকাল বা তৃতীয় অবস্থা বলে । ষষ্ঠ বা ষাটশ ঘণ্টা জ্বর ভোগেব পবে এই বিবামকাল উপস্থিত হয় । ঘর্ম, উত্তাপের ন্যূনতা, নাড়ীর কোমলতা এবং কখন কখন নিদ্রা, জ্বর-বিবামের লক্ষণ । এই জ্ববে বিবামকালে বোগেব লক্ষণ সকল অতি অল্প মাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিষম জ্ববের স্তায় সম্পূর্ণ তিবোহিত হয় না । সাধারণতঃ প্রাতঃকালে বিবামকাল উপস্থিত হইয়া মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি কবে । বোগ উৎকট আকারের হইলে, বিবামকাল নির্ণয় করা সহজ নহে, কিন্তু সতকভাবে উহা আবির্ভাব নিবাক্ষণ করা কর্তব্য । বিষমজ্ব ও স্বল্পবিবামজ্ববে প্রভেদ এই যে, বিষমজ্ববে জ্ববের সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ হয় এবং বিবামকালে বোগ লক্ষণ সকল সন্ধ্যা প্রকাবে বলপূর্ণ থাকে, কিন্তু স্বল্পবিবামজ্ববে জ্ববের সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ হয়না, এবং জ্বব-লক্ষণ গুলিও একেবারে তিবোহিত হয় না, কেবল কথঞ্চিৎ হ্রাস পড়ে । টাইফয়েড বা সন্নিপাত জ্ববে একেবারেই বোগ লক্ষণেব এপ্রকাবে হ্রাস জন্মে না, অগ্নিচ, মলিন কাপণ জিহবা, দস্তে দস্ত-শর্কবা, আঁখ্যান, পীতবর্ণ অতিসাব, মূত্র প্রলাপ, কণ্ডুবা-স্পন্দন বা বধিবতাদি অতি-বিস্কল লক্ষণ থাকে । স্বল্পবিবামজ্ববে সন্নিপাত জ্ববের এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হইলে স্বল্পবিবামজ্বব সন্নিপাত জ্ববে পরিণত হয় ।

স্বল্প বিবাম জ্ববের এক এক আক্রমণ গড়ে ২৪ ঘণ্টা থাকে কিন্তু প্রথম আক্রমণ অপেক্ষা পরবর্তী আক্রমণ গুলি আবও অধিক কাল অবস্থিতি কবে । এই রোগ প্রায় ৭।১৪।২১ দিবস ঐকান্তিকতাপেক্ষা অধিক দিন থাকিবা বোগী আরোগ্য লাভ করে অথবা মৃত্যু মুখে পতিত হয় । সচরাচর অষ্টাহেব মধ্যে মৃত্যু হয় না । বক্তেব জীবনী শক্তির বিনোপ জানিত অবসন্নতা, ফুসফুসে বক্তসঞ্চয়, সন্নিপাত লক্ষণ, অথবা মস্তিষ্কেব উপসর্গ বশতই এইরোগে বোগী মৃত্যু হয় । স্পষ্টে নিবাম, গাত্র তাপ ও নাড়াব বেগের ন্যূনতা, আমাশয়িক উগ্রতার হ্রাস এবং প্রচুর ঘর্ম,—এইগুলি অমুকূল লক্ষণ । দৌর্জল্যের আদিক্য, মলেন সহিত রক্তস্রাব, শীতল ঘর্ম, প্রলাপ, সংজ্ঞা-নাশ,—এই সকল বিপদ জনক লক্ষণ । যদি এতৎসহকারে কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্র পীড়িত হয় তবে এই জ্বব অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পাবে । কখন কখন দ্রৌকালীন আকার দাবণ কবিবা উৎকট একজ্ববে অথবা সন্নি-

পাত লক্ষণাপন্ন হইয়া টাইফয়েড বা মল্লিপাত জ্বরে পরিণত হয়, কখন বা জ্বৰ-লক্ষণ গুলি মন্দীভূত হইয়া স্বল্প-বিবাম অব সবিবাম অবস্থায় পরিবর্তিত হইয়া থাকে ।

কারণ ।—অত্যন্ত ম্যালেরিয়া অবস্থায় কাৰণে উৎপন্ন হয়, স্বল্পবিবাম জ্বর ও সেই কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । রোগীকে ধাতু-প্রকৃতি ও ম্যালেরিয়া বিষয়ে পরিমাণানুসারে কাহার সবিবাম, কাহারও স্বল্পবিবাম জ্বর জন্মে । ম্যালেরিয়া বিষয়ে সহিত টাইফয়েড অব্যবহিক নিম্ন সংযুক্ত হইলেই টাইফো-ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপন্ন হয় ।

নির্ণায়ক ।—স্বল্পবিবাম অবস্থায় সবিবামজ্বর, মল্লিপাতজ্বর, ও পীতজ্বর বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে । স্বল্পবিবাম ও সবিবাম অবস্থায় প্রোভদ এই যে সবিবাম অবস্থায় স্পষ্ট বিবামাবস্থা থাকে, স্বল্পবিবাম অবস্থায় প্রকৃত স্পষ্ট বিবামাবস্থা দৃষ্ট হয়না, মল্লিপাত অবস্থায় স্বল্প-বিবাম অবস্থায় গ্রাস অবস্থায় আবেশ, ত্বকে পীতবর্ণ ও মলিনবর্ণ থাকেনা, কিন্তু জ্বরের একেবারে অবিরাম, ত্বকের পীতবর্ণের অভাব, ও হৃদিতালের গ্রাস পীতবর্ণ মল লক্ষণ থাকে । পীতজ্বরে নিয়মিত স্বল্পবিবাম লক্ষিত হয় না, অধিকন্তু অধিকাংশ বোগীই আমাশয় হইতে বক্তস্রাব হয় ।

প্রত্যয় ।—স্বল্প-বিবাম অবস্থায় ভাগীফল, বিশেষতঃ নাতি-শীতোষ্ণ প্রদেশে প্রায়ই অনিষ্টকর নহে । আমাশয় উপস্থিত হইলে, নাড়ীর দ্রুততা ও পৃষ্ঠতাব হ্রাস, গাত্র-তাপের লাঘব, জ্বরের আক্রমণের প্রচণ্ডতার ক্রমিক হ্রাস, বিসৃত ঘনস্রাব ও তৎপরে বোগের সমস্ত লক্ষণের উপশম এই অবস্থায় লক্ষণ । গাত্র-তাপের বৃদ্ধি, নাড়ীর দ্রুততাব বৃদ্ধি কিন্তু শক্তির হ্রাস, অবসন্ন কর অতিসার বা অল্প হইতে বক্তস্রাব, প্রলাপ, তন্দ্রা দোষ, এবং অত্যন্ত অবসন্নতা অন্তত লক্ষণ ।

উপসর্গ ।—স্বল্পবিবাম অবস্থায় সচিৎ সময়ে সময়ে আমাশয়ের উপসর্গ থাকে এবং জ্বরের উৎপত্তায় অতিশয় বমন হয় । এমন কি ঔষধ ও পথ্য পর্যন্ত উত্তীর্ণ পড়ে । দ্বিতীয়তঃ, মস্তিষ্কের উপসর্গবশতঃ, বিশেষতঃ শীতাবস্থায়, সহসা বোগী মূর্ছা জন্মিতে পারে । অববেচনা পূর্বক রোগীকে দত্তায়মান করা উচিত নহে । এই প্রকার ঘটনা থাকে । তৃতীয়তঃ, মস্তিষ্ক বা

মস্তিষ্কক্লিম্বীৰ উপদাহ বা প্রদাহ জন্মে । মস্তকেব অতিশয় উত্তাপ, প্রলাপ, চক্ষুৰ আবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ দ্বাৰা তাহা অবগত হওয়া যায় । এই উপদাহ বা প্রদাহ ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইয়া সংজ্ঞানাশ বা সম্পূর্ণ অচেতনত্বে পৰিণত হইতে পাৰে । চতুৰ্থতঃ, নাসু-নলীভূজ-প্রদাহ বা ফুসফুস-প্রদাহও উৎপন্ন হয় । কখন কখন বক্ষঃস্থলের উপসর্গ সকল এত অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হয় যে, বিশেষকণে মনোনিবেশ না কবিলে উহা জানা যায় না সূতবাং তদ্বাৰা অতিশয় অপকায় হয় । পঞ্চমতঃ, এই জ্বৰে যকৃৎ কিম্বা প্লীহাতে বক্ষসঞ্চয় বা প্রদাহ জন্মে । ষষ্ঠতঃ, এতৎসহকানে অতিমাত্র বা রক্তাশাশয় বিদ্যমান থাকে । সপ্তমতঃ, এই বোগে প্রথম হইতেই অতিশয় দুৰ্লভতা ও সন্নিপাত-লক্ষণ প্রকাশ পায় ।

### সন্নিপাত ও স্বল্পবিরাম জ্বরে প্রভেদ :—

সন্নিপাত জ্বৰ ।

স্বল্পবিরাম জ্বৰ ।

- ১। দুৰ্ব্বিত্ত জলবায়ু হইতে উৎপন্ন হয় । ১। মালেরিবা হইতে উৎপন্ন হয় ।
- ২। প্রথম হইতেই পীতবর্ণ মলস্রাবী অতিমান থাকে । ২। প্রথমে কোষ্ঠবোধ থাকে বা মলিন পৈত্তিক মল নিঃসৃত হয় ।
- ৩। অঙ্গে স্পর্শবেদন ও বেদনা থাকে । ৩। অঙ্গে বেদনাদি কিছুই থাকে না ।
- ৪। গোলাপী বস্বেল বা বক্তরণেব পীড়কা উৎপন্ন হয় । \* ৪। কোন প্রকাণ্ড পীড়কা উৎপন্ন হয় না ।
- ৫। একেবাবেই জ্বরের বিচ্ছেদ হয় না । ৫। সাধাবণতঃ প্রতিদিন প্রত্যুষে অল্প বিনাম লক্ষিত হয় ।
- ৬। পাণ্ডু বা স্বকেব পীতবর্ণ কচিং থাকে । ৬। পাণ্ডু বা স্বকেব পীতবর্ণ প্রায়ই থাকে ।
- ৭। বিবমিষা, হিকা ও বমন প্রভৃতি আশাশয়িক লক্ষণ কখন কখন থাকে । ৭। আশাশয়িক লক্ষণ প্রায় সৰ্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে ।

\* এ দেশে সন্নিপাত জ্ববে প্রায়ই পীড়কা দৃষ্ট হয় না ।

পীত লক্ষণাপন্ন হইয়া টাইফয়েড বা মল্লিপীত জ্বরে পরিণত হয়, কখন বা জ্বর-লক্ষণ শুলি মন্দীভূত হইয়া স্বল্প-বিবাম অব সবিবাম জ্বরে পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

কারণ।—অত্যন্ত ম্যালেরিয়া অব যে কাৰণে উৎপন্ন হয়, স্বল্পবিবাম জ্বর ও সেই কাৰণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বোগীয় ধাতু-প্রকৃতি ও ম্যালেরিয়া বিদ্যে পৰিমাণানুসারে কাহান সবিবাম, কাহানওবা স্বল্পবিবাম জ্বর জন্মে। ম্যালেরিয়া বিদ্যে সহিত টাইফয়েড অবোৎপাদক বিষ সংযুক্ত হইলেই টাইফো-ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপন্ন হয়।

নির্ণায়ক।—স্বল্পবিবাম অব সবিবামজ্বর, মল্লিপীতজ্বর, ও পীতজ্বর বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। স্বল্পবিবাম ও সবিবাম জ্বরে প্রভেদ এই যে সবিবাম জ্বরে সুস্পষ্ট বিবামাবস্থা থাকে, স্বল্পবিবামজ্বরে প্রকৃতির স্পষ্ট বিবামাবস্থা দৃষ্ট হয়না, মল্লিপীত জ্বর স্বল্প-বিবাম জ্বরের ত্রায় জ্বরের আবেশ, ত্বকেব পীতবর্ণ ও মলিনবর্ণ থাকেনা, কিন্তু জ্বরের একেবারে অবিবাম, ত্বকেব পীতবর্ণের অভাব, ও ত্বকতালেব ত্রায় পীতবর্ণ মল লক্ষণ থাকে। পীতজ্বরে নিয়মিত স্বল্পবিবাম লক্ষিত হয় না, অধিকন্তু অধিকাংশ বোগীয়ই আমাশয় হইতে বক্তস্রাব হয়।

প্রজ্ঞান।—স্বল্প-বিবাম জ্বরের ভাবীক্ষণ, বিশেষতঃ নাতি-শীতোষ্ণ প্রদেশে প্রায়ই অনিষ্টকর নহে। আমাশয়িক উপদ্রবের বিবর্তি, নাতীক্রান্ততা ও পুষ্টিতার হ্রাস, গাত্র-তাপের লাঘব, জ্বরের অক্রমণেব প্রচণ্ডতার ক্রমিক হ্রাস, বিসৃক্ত ঘৰ্মস্রাব ও তৎপরে বোগের সমস্ত লক্ষণের উপশম এই জ্বরে শুভ লক্ষণ। গাত্র-তাপের বৃদ্ধি, নারীক্রান্ততা বৃদ্ধি কিন্তু শক্তির হ্রাস, অবসন্ন কব অতিসার বা অস্ত্র হইতে বক্তস্রাব, প্রলাপ, ভ্রান্ত্যাদোষ, এবং অত্যন্ত অবসন্নতা অন্তত লক্ষণ।

উপসর্গ।—স্বল্পবিবাম জ্বরের সতিত সময়ে সময়ে আমাশয়ের উপসর্গ থাকে এবং জ্বরের উৎপাদনায় অতিশয় বমন হয়। এমন কি ঔষধ ও পথ্য পর্যন্ত উঠিয়া পড়ে। বিতীর্ণতঃ, মস্তিষ্কের উপসর্গবশতঃ, বিশেষতঃ শীতাব-স্থায়, সহসা বোগীর মুচ্ছা জন্মিতে পারে। অববেচনা পূর্বক বোগীকে দত্তব্যমান কবাইলেই এই প্রকারণ ঘটয়া থাকে। তৃতীযতঃ, মস্তিষ্ক বা

মস্তিষ্কখিল্লীর উপদাহ বা প্রদাহ জন্মে। মস্তকেব অতিশয় উত্তাপ, প্রলাপ, চক্ষুৰ আরক্ততা প্রভৃতি লক্ষণ দ্বাৰা তাহা অবগত হওয়া যায়। এই উপদাহ বা প্রদাহ ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইয়া সংজ্ঞানাশ বা সম্পূর্ণ অচেতনত্বে পরিণত হইতে পারে। চতুর্থতঃ, নায়ু-নলীভূজ-প্রদাহ বা কুসফুস-প্রদাহও উৎপন্ন হয়। কখন কখন বক্ষঃস্থলের উপসর্গ সকল এত অজ্ঞাতসাবে উপস্থিত হয় যে, বিশেষকপে মনোনিবেশ না করিলে উহা জানা যায় না সুতরাং তদ্বাৰা অতিশয় অপকার হয়। পঞ্চমতঃ, এষ্ট জবে যকুৎ কিম্বা প্লীহাতে বক্রসঞ্চয় বা প্রদাহ জন্মে। ষষ্ঠতঃ, এতৎসহকাৰে অতিমান বা রক্তমাশয় বিদ্যমান থাকে। সপ্তমতঃ, এই বোণে প্রথম হইতেই অতিশয় দুৰ্ব্বলতা ও সন্নিপাত-লক্ষণ প্রকাশ পায়।

### সন্নিপাত ও স্বল্পবিরাম জ্বরে প্রভেদ :—

সন্নিপাত জব ।

স্বল্পবিরাম জব ।

- |   |  |
|---|--|
| ১। দুৰ্ব্বিত জলবায়ু হইতে উৎপন্ন হয়।                       | ১। ম্যানেবিশা হইতে উৎপন্ন হয়।                       |
| ২। প্রথম হইতেই পীতবর্ণ নলস্রাবী অতিমান থাকে।                | ২। প্রথমে কোষ্ঠরোধ থাকে বা মলিন পৈতিক মল নিঃসৃত হয়। |
| ৩। অগ্নে স্পর্শদেহ ও বেদন থাকে।                             | ৩। অগ্নে বেদনাদি কিছুই থাকে না।                      |
| ৪। গোলাপী বস্তুর বা রক্তবর্ণের পীড়কা উৎপন্ন হয়। *         | ৪। কোন প্রকাৰ পীড়কা উৎপন্ন হয় না।                  |
| ৫। একেবারেই জ্ববেব বিচ্ছেদ হয়না।                           | ৫। সাধাবণতঃ প্রতিদিন প্রত্যবে অল্প বিরাম লক্ষিত হয়। |
| ৬। পাণ্ডু বা স্বকের পীতবর্ণ কচিং থাকে।                      | ৬। পাণ্ডু বা স্বকের পীতবর্ণ প্রায়ই থাকে।            |
| ৭। বিবমিষা, হিকা ও বমন প্রভৃতি আশাশয়িক লক্ষণ কখন কখন থাকে। | ৭। আশাশয়িক লক্ষণ প্রায় সৰ্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে।    |

\* এ দেশে সন্নিপাত জবে প্রায়ই পীড়কা দৃষ্ট হয় না।



চিকিৎসা।—জেলসিমিয়ম, ব্রাইওনিয়া, বেনেডোনা, ইপিকাক, এটিমোনিয়ম-জুডম, ইউপেটোরিয়ম, নক্সভসিকা, মার্ক-সল, ব্যাপ্টিসিয়া ও কুইনাইন স্বল্পবিরাম জ্বরের প্রধান ঔষধ। সন্নিপাত-লক্ষণ (টাইফয়েড সিন-টমস) উপস্থিত হইলে ব্রাইওনিয়া, বসটকা, ব্যাপ্টিসিয়া, হাইওসায়েরাস, ওপিয়ম, ট্র্যামোনিয়ম, ফসফরিক এসিড, আর্সেনিকম প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই জ্বরের প্রথমে জেলসিমিয়ম, তৎপরে ব্রাইওনিয়া, শিলো-লক্ষণে বেনেডোনা, অতিশয় গাত্র-বেদনা ও ঘর্ষাভাব লক্ষণে ইউপেটোরিয়ম পারফোলিয়েটম, বিব্রিসিয়া বা বমনাদি আমার্শনিক উপদ্রবে ইপিকাক বা ব্যাপ্টিসিয়া, ক্রিমি-লক্ষণে সিনা বা স্ত্রাণ্টোনিম, উদবাস্ত্র-সংক্রমে মার্ক-সল, পডোফিলম প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানে ঘর্ষ্য হইয়া জ্বর ত্যাগ হইবামাত্র সাধারণতঃ ১।৩ গ্রেণ মাত্রায় কুইনাইন ২৩ ঘণ্টান্তর ব্যবহৃত হয়। পুনর্বার জ্বর আসিলে অবকানীন যথোপযুক্ত ঔষধ এবং বিবাম সময়ে কুইনাইন ব্যবহৃত করা যায়। অত্যন্ত অবসন্নতা থাকিলে কুইনাইনের পরিবর্তে আর্সেনিক ব্যবহার করা যাইতে পারে।

স্বল্পবিরাম জ্বরে ব্যবহৃত ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

[১] জেলসিমিয়ম।—প্রথম সপ্তাহে, উপসর্গ শূন্য স্বল্প-বিরাম জ্বরে সাধারণতঃ জেলসিমিয়মই ব্যবহৃত হয় উগ্র জ্বর, অতিশয় গাত্র-তাপ; তীব্র শিরঃপীড়া; ঘাড়, পৃষ্ঠ, ও অঙ্গে বেদনা, চক্ষু নাড়িলে চক্ষে বেদনা; পিপাসা; স্বপ্ন ও আরক্ত মূত্র এই ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ। জেলসিমিয়ম সেবনে প্রারম্ভঃ ৪।৫ দিনসেই জ্বরের ভোগকাল পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। শিত্তদিগেব স্বল্পবিরাম জ্বরে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

[২] ব্রাইওনিয়া।—জ্বর কয়েকদিন থাকিলে জেলসিমিয়মের পরে ব্রাইওনিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। ব্রাইওনিয়াও জেলসিমিয়মের জ্বাব জ্বরের প্রথম সপ্তাহেই প্রযোজিত হইয়া থাকে। সমুখ কপালে শিঃপীড়া; একবারে অধিক পবিমাণ জলপানের অন্তিম বিশিষ্ট পিপাসা; কপিশবর্ণ জিহ্বা; বস্মশূন্য উত্তাপ; পেশীস্পর্শ-দেব ও বেদনা এবং নাড়িলে চড়িলে উহা অতিশয় বক্ষঃস্থলে স্ত্রী-বেদন বেদনা, এবং কোষ্ঠাবদ্ধ ব্রাইওনিয়া

প্রয়োগ-লক্ষণ । [৩] বেলভেনো !—নাস্তিক লক্ষণের প্রাণ্যে অর্থাৎ লক্ষণ কপালে অবশ্য শিরঃপীড়া, মস্তিষ্কের রক্তবহা নাড়ীগুলির অতিশয় পূর্ণতা ও দৃশ্যদৃশ্য, এবং অস্থিরতা ও প্রলাপ লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী ।

[৪] ইপিকাক ।—আমাসিক উপদাহিতা সচক্রে স্বপ্নবিবাহ জ্বর আরম্ভ হইলে, এবং নিবন্ধিত, পিত্ত-বমন, উদবোদ্ধদেহে ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইপিকাক ব্যবহৃত হয় । [৫] মার্ক-সল ।—অতিশয় থাকিলে মার্ক-সল ফলপ্রদ । মলিন কপিশবর্ণ, বা আমাশয়িত মল লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হয় । ঘর্ম্মস্রাবও জ্বরের অন্তঃপন্থা এবং বেদনা এই ঔষধের অপক লক্ষণ ।

[৬] ইউপেটোরিয়াম ।—পিত্তপ্রধান স্বপ্ন বিবাহ জ্বরে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । অস্থির অভ্যন্তরে ও পেশীতে বেদনা ইহা বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ ।

[৭] পডোফিলম ।—আমাসিক, অজ্ঞ, ও যন্ত্রণার লক্ষণের প্রাণ্যে ; অতিশয় শিরঃপীড়া ও পিপাসা, অথবা শিরোবেদনার পরিবর্তে উদরাময় থাকিলে পডোফিলম প্রয়োগ করা যাইতে পারে । [৮] নক্সভমিকা ।—জ্বরের প্রথমাবস্থায় বোগীয় ক্ষণবাহিতা ও একাকী থাকিতে ইচ্ছা ; এবং জিহ্বা প্রান্তে উজ্জল লোহিত বর্ণ থাকিলে নক্সভমিকা উপকারী । আশ্রয় আবেগোন্মুখ অবস্থায় বোগী শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য না হইয়া উঠিলে, তাহার ক্ষুধাহীনতা, দুশ্লভতা, এবং দ্রব্য শীত ও উত্তাপ লক্ষণায় অল্প অল্প সপর্যায় অব থাকিলেও এই ঔষধ ফলপ্রদ । [৯] কুইনাইন ।—স্বপ্ন-বিবাহজ্বরে স্পষ্ট বিবাহ উপস্থিত হইলে জ্বরের বিচ্ছেদকালে কুইনাইন ব্যবহৃত হয় । বিরাম কালে নাড়ীর তরলতা ও স্রবৎ স্রবতা, অবকালে উহার পূর্ণতা ; কণ-নাদ, মস্তক লঘু অস্থিরতা,—এই গুলি কুইনাইনের প্রয়োগ-লক্ষণ । [১০] ব্যাপ্টিসিয়া ।—মনোভাবের বিশৃঙ্খলতা, প্রচাপিত বৎ অতীত শিরোবেদনা, শিরোবর্ণন, আবক্ত, ধূমল ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল ; কপিশ বা মলিন পীতবর্ণ কেন্দ্র ও লোহিতবর্ণ প্রান্তে বিশিষ্ট জিহ্বা, বাবংবান অল্প অল্প, পাতলা, মলিন মল নিঃসরণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শ্রান্তি ও ঘূর্ণবৎ অস্থিরতা ইহার লক্ষণ । এইসকল লক্ষণে দ্রুত স্বপ্নবিবাহ জ্বরের প্রারম্ভে ব্যাপ্টিসিয়া প্রয়োগ করিলে অনেক সময় প্রথম সূচনাবধি এতদ্ভাবে জ্বর প্রতিরুদ্ধ হয় । অপর, জ্বরের প্রথম সপ্তাহের পক্ষে অতিশয় দ্রাব্যীয় অস্থিরতা, মস্তক বেদ

থও থও হইয়া শয্যায় বিক্ষিপ্ত বহিয়াছে এপ্রকার অনুভব ও সেই সকল থও একত্রিত করিবার নিমিত্ত সন্দেশ পার্শ্ব-পরিবর্তন; জিজ্ঞাসিত কথার উত্তর দিতে দিতে নিদ্রিত হইয়া পড়া; শিরোগোরব, তজ্জাদোষ; জিহ্বার শুষ্কতা, দন্তে দণ্ড-শর্কবা; শ্বাসে জগন্ধ, নাড়ীর পূর্ণতা ও ধীরতা; কৃষ্ণবর্ণ জগন্ধময় মল, এবং লোহিতবর্ণ মুত্র প্রভৃতি গভীর বিকাশ-লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধ বলপ্রদ। [১১] সিল্কোনা।—আবোগ্যোম্মথ অব-স্থায় শীঘ্র আবোগ্য না জন্মিলে, অথবা বোগ্যে চক্ললতা, প্লীহারের রূপপূর্ণতা, ও বৈশিষ্ট্য থাকিলে সিল্কোনা ব্যবস্থেয়।

স্বল্পাবয়বজুবে বিকাশ ভাবিলে এবং সন্নিপাত-লক্ষণ উপস্থিত হইলে প্রায়শঃই টাইফয়েড নামক সন্নিপাত জ্বরের ঔষধগুলি অর্থাৎ (১) বেলে ডোনা, ব্রাইওনিয়া, বসটক্স, কাকউল্যাস, ভবোট্টম, (২) আর্সেনিক, ব্যাপ্টি-সিয়া, কাকো-ডেজি, চাবনা, হাইওস, এপিস, আইরিস প্রভৃতি ঔষধ ব্যব-হৃত হইয়া থাকে। অতএব সেই সকল ঔষধের বিস্তারিত লক্ষণ আব এখানে উল্লিখিত হইলনা। টাইফয়েড জ্ববে ও পুত্রে কেবল শেষ ভাগেই উল্লেখ করা গেল। (টাইফয়েডজ্বর দ্রষ্টব্য)।

প্রতিষেধক, —জেনার্সনিয়ম স্বল্পবিরাম জ্বরের প্রতিষেধক।

পথ্যাপথ্য।—বিষমজ্বরের হ্যাস।

## স্বল্পবিরাম জ্বরের প্রধান প্রধান

### উপসর্গ ।

বায়ুনলি-ভূজ-প্রদাহ (ব্রুকাইটিস) —মুম্বাইয়ের বায়ুনলিহীনল ও তাহার নৈঋতিক বিম্বীয় প্রদাহকে বায়ুনলিভূজ-প্রদাহ বলে। সাধারণতঃ সর্দি লাগিয়া এই প্রদাহের উৎপত্তি হয়। শীত ও বর্ষা ঋতুতে এ দেশীয় দিগের জরে মধ্যে মধ্যে এই উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। উত্তর অঞ্চল ও সমুদ্রকূলবাসীদিগের জরবোগেই ইহা অধিক প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। শিরঃপীড়া,

কুর পিপাসা, ক্ষুধামান্দ্য, লেপাবৃত জিহ্বা, অস্থিৰতা; বক্ষঃস্থলেব সমুখ ভাগে আকৃষ্টতা ও আকৃকন অমৃতব, দ্রুত, আরাসসাধা, ব্যাকুলিত নিশ্বাস প্রশ্বাস ও তৎসহকাৰে কণ্ঠকুঞ্জন অর্থাৎ সাঁই সাঁই বা হাঁস ফাঁস শব্দ; এবং উগ্রকাস এই বোগেব প্রধান লক্ষণ। বায়ুনলীভূজ-প্রদাহের কাস প্রথমে শুষ্ক থাকে, দুই তিন দিন পবে নিশ্বাসবৎ কোণল শ্লেষ্মা উদগত হয়। সেই শ্লেষ্মা কিছু কাল কোন পাত্রে বাঁধিয়া দিলে উহা অগুণাগেব আকার ধারণ কবে। কখন কখন কাসে বক্তেব বেগাও দেখা বায়। অবশেষে গাঢ়, ক্লেবং হবিত মিশ্রিত পাত বণ ও পৃথময নিষ্ঠূবন নির্গত হইতে থাকে। বোগ অসাম্য হইলে অষ্টম দিবসে ত্রাস পড়ে, নতুবা শ্বাসকৃচ্ছ বাদ্ধত, ওঁৎ কৃষ্ণ বর্ণ গণ্ডদেশ পাতুর ও মালন এবং কখন কখন প্রলাপ প্রভৃতি অরিষ্ট লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া বোগীণ প্রাণ বিনষ্ট হয়। বালকদিগের বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ অধিক বিপদ জনক। উহাদেব এই বোগ জন্মিলে প্রায়ই বায়ুবাহীনলেব স্মৃষ্ণ স্মৃষ্ণ উপশাখা গুলি আক্রান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ণবয়স্কাদিগেব বোগে প্রধান প্রধান নলগুলিই প্রদাহিত হয়। প্রদাহ বিকীণ হইয়া যতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলে অধিক ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ততই বায়ুদ্বারা ভাংকপে এক বিণোবিত হইতে পারে না। স্ততরাং শ্বাস বদ্ধ হইয়া সত্বণ বোগীণ মৃত্যু হয়। চিকিৎসা।—একোনাইট (রোগের আরম্ভাবস্থা); ব্রাইওনিয়া (বক্ষঃস্থলে বেদনা, স্বল্প শ্লেষ্মা নিজীবন, বৃহৎ বৃহৎ বায়ুনলীর প্রদাহ), এন্ট-টাট (অতিশয় কণ্ঠকুঞ্জন, শ্বাসকৃচ্ছ, কুসকূসে অধিক শ্লেষ্মাসঞ্চয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুনলীতে প্রদাহের বিস্তৃতি), কালী-বাইক্রম (হৃৎশ্বেদ্য স্তব্ধ বৎ শ্লেষ্মাসঞ্চয়, শ্বাসকৃচ্ছ, কাস, কুবাহীনতা, পীতবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা, কসফবাস, (কাস, রজ্জুবৎ শ্লেষ্মা-নিজীবন, বায়ুনলীভূজ হইতে পুথপ্রাব), লোবেলিয়া, ইপিকাক, আসেনিক, বেলেডোনা, কার্বো-ভেজাঁ, মাকু'নিয়েস, স্পঞ্জিয়া, সগফার। তখন বায়ুনলীভূজ-প্রদাহে বক্ষঃস্থলে মসিননাব উষ্ণ পুটিস প্রদান অত্যন্ত উগকাবজনক। বালকদিগের বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ—একন, যস, ব্রাই, পলস (সবল কাস); ইপিকাক (আক্কেপিক কাস), এন্ট-টাট (শ্লেষ্মা সঞ্চয়), সিনা, শ্রাণ্ট (কমিজনিত উপদাহ)। ডাক্তাব অশার বগেন যে বালকদিগের বায়ুনলীভূজ-প্রদাহে ধোবেলিয়া সন্কোৎকৃষ্ট ঔষধ। বুদ্ধদিগের বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ—

এন্ট-টার্ট, এমন-কার্স ( কষ্টে গ্লেস্সা নিষ্কীর্ণ ) : কোনা, কার্সোভে, ডাঙ্গ, সেনেগা, দস, কা-বাইক্রম, আস'। জ্বের আনুভঙ্গিক বায়ুনলীভূজ-প্রদাহে সাধারণতঃ ব্রাইওনিয়া বা এন্ট-টার্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

**ফুসফুস-প্রদাহ (নিউমোনিয়া) ।**—সাধারণতঃ প্রবল প্রাণী-জ্বের জ্বাশ শীত ও সময়ে সময়ে উত্তাপ সহকায়ে এই বোগ উপস্থিত হয়, অথবা বায়ুনলীভূজ-প্রদাহেব জ্বাশ ইহাব সূচনা হইয়া থাকে । কিন্তু স্বল্প-বায়ুজর, সন্নিপাত জ্বর ও অন্তঃজ্বর এই বায়ু কখন কখন প্রচ্ছন্ন ভাবে উপস্থিত হয় । বালক, বৃদ্ধ ও এদেশীয়দিগেব ফুসফুস প্রদাহও সময়ে সময়ে এই প্রকার অস্পষ্ট ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে । এতদেশীয়েরা অনেক সময় ফুসফুসেব বোগে প্রাণত্যাগ কবে অথচ তাহাব কোন স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশিত হয় না । ফুসফুস-প্রদাহেব প্রথম অবস্থায় শুষ্ক, হ্রস্ব কাস প্রকাশ পায় । তৎপরে পাতলা, ফেশিল ও অতিশয় আঠাবৎ গ্লেস্সা নিঃসারিত হয় । অনন্তর লৌহেব মবিচাব জ্বাশ বর্ণবিশিষ্ট অথবা রক্ত মিশ্রিত গ্লেস্সা নির্গত হইতে থাকে । স্নেহ্যেব এই প্রকার বর্ণ দ্বাবাই বায়ুনলীভূজ প্রদাহ হইতে ফুসফুস প্রদাহেব প্রভেদ করা যায় । এই বোগে সচবাচব অধিক তীব্র বেদনা থাকে না । কিন্তু এতৎ সহকায়ে ফুসফুস-বেষ্টেব প্রদাহ (প্লুরিসি) উৎপন্ন হইলে সূচীবোধ-বৎ প্রবল পাশ্বে-বেদনা বিদ্যমান থাকে । কখন কখন স্তনেব নিম্নদেশে এই বেদনা অনুভূত হয় । কেবল ফুসফুস-প্রদাহে বক্ষঃস্থলে নিয়ত অল্প বেদনা থাকে এবং শ্বাস হ্রস্ব ও ঘন হয় । চক্ষে জল ও নাসানদ্রে অর্জিতা থাকেনা । শ্বাসের গতি ১১৪ হইতে ১৪০ সংখ্যা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় । গাত্রতাপ ১০৪ বা ১০৫ তাপাংশ উখিত হয় । প্রদাহ অল্প আকাবেব হইলে পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসে রোগ হ্রাস পড়ে নতুবা এক পক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় । যদি শরীর-তাপ গড়ে ১০৪ তাপাংশ, নাড়ী-স্পন্দন প্রতি মিনিটে ১২০ বাব এবং শ্বাসের গতি এক মিনিটে ৩৫ বাব অপেক্ষা অধিক না হয় অথবা অন্য কোন সঙ্কট জনক উপসর্গ না জন্মে তবে রোগী অষ্টম বা দশম দিবসে আবেগ্য লাভ কবিত্তে আশস্ত করে । কিন্তু রোগ উৎকট হইয়া উঠিলে চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে শ্বাসেব দ্রুততা ও কৃচ্ছ্রতা, নাড়ী-বেগ ও গাত্রোত্তাপ বর্দ্ধিত হয় । অপিচ, প্রাণ ও তৎপরে সম্পূর্ণ অটোতন্য জন্মে । এই রোগে বক্ষঃ-বাক্স

বয়স দ্বারা স্বক্কাহ্নি ব নিম্ন ভাগে বক্ষঃস্থলে আকর্ষণ করিলে কেশধর্ষণ ধ্বনি ( ক্রেপিটেশন ), এবং বোগের বদ্ধিত অবস্থায় অক্ষুণ্ণ দ্বারা বক্ষঃস্থলে প্রাতি-  
ঘাত করিলে স্বাভাবিক বায়ু-গর্ভ শব্দের পরিবর্তে ঘন গর্ভ ( ডংল ) শব্দ শুনা  
যায় । জ্বন কালীন বালকদিগের ফুসফুস-প্রদাহ প্রায়ই অজ্ঞাতসারে উপস্থিত  
হয় । তিন বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালকদিগের এই বোগ হইলে উহা বা শ্লেষ্মা  
তুলিয়া ফেলিতে পারেনা । মুখ বিকসিত করিয়া ঘন ও আঘাসসাধ্য নিশ্বাস  
তাগ করে । নিশ্বাস তাগকালে নাসাবন্ধু প্রসারিত হয় । বালকদিগের  
ফুসফুস-প্রদাহ প্রায়ই বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ বলিয়া ভ্রম জন্মে । কিন্তু এই দুই  
বোগে প্রধানতঃ প্রভেদ এই যে ফুসফুস-প্রদাহে গাত্র ও মুখ গহ্বর উত্তপ্ত ও  
কক, কাস হ্রস্ব ও ক্ষীণ, নির্গত শ্লেষ্মা ক্ষৌহ কলঙ্কের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট ও কেশিল,  
এবং গাত্র তাপ ১০০—১০৫ তাপাংশ থাকে । বায়ুনলীভূজ-প্রদাহে গাত্র ও মুখ-  
গহ্বর উষ্ণ ও আর্দ্র, কাস উচ্চ ও শব্দ, নির্গত শ্লেষ্মা শুভ্র ও অণ্ডলালবৎ,  
এবং গাত্র তাপ ১০০—১০২ তাপাংশ হয় \* । চিকিৎসা ।—এই বোগে,  
নাড়ী ববেগ, শ্বাসের গতি ও শরীরের তাপ হ্রাস করাই চিকিৎসার উদ্দেশ্য  
অতএব যে সকল ঔষধে এই তিন উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় তাহাই এই ব্যাধির  
প্রকৃত ঔষধ । একল ও ফস পর্যায়ক্রমে ( প্রাবৃত্তাবস্থা ); ব্রাই ও ফস  
পর্যায়ক্রমে ( ফুসফুসেতে পরিব্যাপ্ত ফুসফুস-প্রদাহ ), এট টাট ও ফস পর্যায়  
ক্রমে ( বায়ুনলীভূজ পরিব্যাপ্ত ফুসফুস-প্রদাহ ) । চেল-ম্যাজ (যকৃতের উপসর্গ);  
কালী-কার্ব ( উভয় ফুসফুসের প্রদাহ ); আর্ন বা এসিড-নাইট ( বৃদ্ধ বা তরল  
রোগী ), আইসোড, রোম, এসিড-অকজেলিক ( গণ্ডমালাগ্রস্ত বোগী ),  
সলফ ( কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অনতিপ্রবল ), 'রস, আর্স, ব্যাপ্ট, ভিবেট-ভিব  
( সান্নিপাতিক লক্ষণ ); কাস-ভে, আর্স বা লাক ( ছগন্ধি নিশ্বাস, ফুস-  
ফুসের বিগলিত অবস্থা ), ক্যাষ্ট ( বক্ষঃস্থলে রক্তসঞ্চয় ); ভিরেট-ভিব  
( মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশের মজ্জার উপদাহ ), আর্ন ( উপঘাত বা অতি পরিশ্রম

---

\* ফুসফুসেতে প্রদাহে সূচীবেধ বা কর্তনবৎ পার্শ্ববেদনা ও শুষ্ক হ্রস্ব  
কাস থাকে কিন্তু শ্লেষ্মা উঠে না । অপিচ, নিউমোনিয়ায় ন্যায় ইহাতে  
নিশ্বাস প্রাণসের সংখ্যা বৃদ্ধি নাড়ীর সংখ্যা বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে না ।

জনিত ) ; লাইকো ( গভীর-মূল বেদনা, বা ফুসফুস প্রদাহের পরবর্তী বায়ুনলী-  
ভূজের উপদাহ ) , বেগ-বধ ( যকের নিম্নে ক্ষুদ্র কতবৎ অল্পতব ) । শীতল  
জলে বস্ত্রপণ্ড সিক্ত কবিতা উত্তমরূপে চিপিয়া লইয়া তদ্বারা বক্ষঃস্থলেব  
পীড়িত পার্শ্ব পাঁচ মিনিট ক্ষত্ব এক একবার পটী প্রয়োগ করিলে ২৩  
ঘণ্টার মধ্যে বিশেষ উপশম বোধ হব। দীর্ঘ ও পুরু মনিসাব পোল্টিস  
বক্ষঃস্থলে ওপুঠে দিলেও অতিশয় উপকাব নহে । জ্বরের উপসর্গ স্বরূপ ফুসফুস-  
প্রদাহে সাধারণতঃ ব্রাউনিয়া ও কনফাসি বাবদ্যত হয় ।

প্রলাপ ( ডিলিরিয়াম ) ।—অসংলগ্ন ও অতশূচ বাক্যকে প্রলাপ  
বলে । মস্তিষ্কের ক্রিয়া-বিকার বশতঃ প্রলাপ জন্মে । জবে হুই প্রকাব প্রলাপ  
উপস্থিত হয়, যথা—প্রবল প্রলাপ ও মৃদু প্রলাপ । জরের প্রথম অবস্থায়  
প্রলাপ জন্মিলে প্রাগই প্রবল প্রলাপ জন্মে । এই প্রকার প্রলাপে দোশীর  
অতিশয় উত্তেজনা, উত্থান-চেষ্টা, শিবঃপীড়া ও চক্ষের আবদ্ধতা প্রভৃতি বিদ্য-  
মান থাকে । জরের শেষাবস্থায় অর্থাৎ অষ্টাহ পরে আব এক প্রকার প্রলাপ  
জন্মে । উহাকেই মৃদু প্রলাপ বলে । মৃদু প্রলাপে বোগী অবসন্ন ও নিশ্চেষ্ট  
হইয়া পড়িয়া থাকে এবং মৃদুতবে অল্পষ্ট ও অসঙ্গত বাক্য বলা । ইহাতে  
উগ্র শিবঃপীড়া ও চক্ষের আবদ্ধতা প্রভৃতি মস্তিষ্কে রক্তাধিক্যের লক্ষণ  
প্রকাশ পায় না । এই শেষোক্ত অবস্থাকেই টাইফয়েড কণ্ডিশন  
বা স্লিপিণ্ডাবস্থা কহে । মস্তিষ্কের প্রদাহ ও অত্যন্ত মস্তিষ্কবোগ বশতঃ যে  
প্রলাপ উৎপন্ন হয় তাহা অতিশয় উগ্র ও প্রচণ্ড হইয়া থাকে । স্বপ্নবিবামাদি  
কোন কোন জরে সমবে সময়ে অটৈতগ্ন বা তন্দ্রাদোষ ( কোমা ) জন্মে ।  
জরের প্রথম অবস্থায় তন্দ্রাদোষ তত ক্রান্তিকব নহে । কিন্তু প্রলাপের পর  
নিরত তন্দ্রা সঙ্কটজনক । চিকিৎসা ।—মস্তিকে প্রবল রক্তসঞ্চয় অর্থাৎ  
স্নায়ুক্ষেত্রে রক্তাধিক্য প্রযুক্ত মস্তিষ্ক-বিকার, রক্তবর্ণ চক্ষু, কপাল প্রান্তের  
শিরাম্পন্দন, আবদ্ধ মুখমণ্ডল ইত্যাদি লক্ষণে বেলেডোনা ব্যবহৃত্যে । রক্তসঞ্চয়  
ব্যতীত, কেবল স্নায়ু বিধানতন্ত্র সামান্য উপদাহজনিত মৃদু প্রলাপে হাইয়ো-  
সারেয়ান উপযোগী । উন্মাদেব ত্রাণ প্রলাপ, প্রচণ্ডতা ও দংশনচেষ্টার  
ট্রামোনিয়ম কলপ্রদ । স্নায়ুক্ষেত্রে অবসাদন বশতঃ প্রলাপ অপেক্ষা অটৈ-  
তত্বৎ নিদ্রার আবিক্য থাকিলে ওপিবন ব্যবহার্য । \* অবকালীন তন্দ্রাদোষে

সাধারণতঃ ওপিয়ম ও ব্রসটিক্স ব্যবহৃত হয় ; আবশ্যক হইলে বেলেডোনা, হাইয়োসায়ামাস, জেলসিমিয়মাদি ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

কৃমি ( ওয়ার্মস ) ।—শরীর ক্লশ ; উদব শরু ও ক্ষীত , মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ; অকস্মাৎ মুখমণ্ডলের বর্ণপরিবর্তন ; চক্ষুর নিম্নদেশে কৃষ্ণবর্ণ অর্ধ-মণ্ডল ; প্রসারিত কণীনিকা ; নাসিকাতুণ্ডন ; মলদ্বার কণ্ডুযন ; কোষ্ঠরোধ ও ঘন ঘন মল-প্রবৃত্তি, অথবা মলিন, অঠাবৎ দুর্গন্ধি মলস্রাব ও কুহন বিশিষ্ট উদবাময় ; নিয়োদবে বেদনা ; দুর্গন্ধময় নিশ্বাস ; কখন কখন নিদ্রাবস্থায় লালস্রাব ; বমন-প্রবৃত্তি ; অতি-ক্ষুধা বা ক্ষুধাহীনতা , মলদ্বার হইতে আম-স্রাব ; বালিকাদিগেব জননেজ্রিব হইতে স্লেম্মাস্রাব ; কখন কখন মূত্রকৃত্ত্র ; শ্বেতবর্ণ বা দুগ্ধবৎ মূত্র ; শয্যাষ মূত্রতাগ ; নিদ্রাকালীন অস্থিরতা , চমকিত হইয়া উঠা, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ বা কথা বলা, শুক ও হ্রস্ব বা আক্ষেপিক কাস ; দীর্ঘ-নিশ্বাস ; হিকা ; আক্ষেপ ; বা প্রলাপ ;—এইগুলি কৃমির প্রধান প্রধান লক্ষণ ।  
 ছুলাস্ত্র ও ক্ষুদ্রাস্ত্র উভয় অস্ত্রেই কৃমি থাকে । ছুলাস্ত্রে সূত্র-কৃমি ও ক্ষুদ্রাস্ত্রে মহিলতার্য ঞ্চায় কৃমি বাস করে । বমন বা মলের সহিত কৃমি নির্গত হইলেই উদরে কৃমি আছে বলিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয় চিকিৎসা ।—জবে কৃমি উপসর্গ থাকিলে সাধাবগতঃ দিনা ও স্ত্রাণ্টিনিন্ ব্যবহৃত হইরা থাকে । মহি-লতার আকাব কৃমিও পক্ষেই দিনা ও স্ত্রাণ্টিনিন্ বিশেষ উপযোগী ; সূত্রকৃমি রোগেও এই দুই ঔষধি উপকারী । কিন্তু ডাঃ হিউজ টিউক্রিয় ১৮ ক্রম অধিক ফলপ্রদ মনে করেন । পূর্ণবয়স্কদিগেব সূত্রকৃমিতেই এই শেষোক্ত ঔষধ বিশেষ উপকারজনক । সূত্রকৃমিতে সূইট অয়েল বা লার্ভের পিচকারীও ফল-প্রদ । কৃমিজনিত অতিসার বা রক্তাতিসারে মায়কিউরিয়স ; স্নায়বীয় উপদাহ, বা আক্ষেপে বেলেডোনা ; এবং স্নায়বীয় অবসন্নতায় ইয়েশিয়া ব্যবহৃত হয় ।

অন্যান্য উপসর্গ ।—অতিসার ।—আস, ইপিক, মার্ক, কার্কো, ভিবাট, ব্যাপ্ট । রক্তাতিসার ।—মার্ক, ইপিক, কলোস, ব্যাপ্ট, আর্স । পাণ্ডু ।—ফস, মার্ক, ক্রোটেলস ।



# শিশুদিগের স্বাস্থ্যবিরাম জ্বর \* -রিমিটেণ্ট ফিবার অভ ইন্ফ্যান্টস্‌।

শিশু ৭ বালকদিগের অনেক সময় স্বাস্থ্যবিরাম জ্বর হইয়া থাকে। ইচ্ছাদেব জ্বর সর্বদা কেবল পুষ্টিবাস্প হইতে উৎপন্ন হয় না। পুষ্টিবাস্প, দন্তোদগম জনিত উপদাহ, ক্রিমি, মলুপযুক্ত আহাৰ, অস্ত্রে মলসংকর, দীর্ঘকালব্যাপী উদরাময় ফুসফুসের পীড়া, আমাশয়ের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য, এই সকল শিশুদিগের স্বাস্থ্যবিরাম জ্বরের প্রধান কারণ। মূল স্বাস্থ্যবিরাম জ্বরে যে সকল প্রধান প্রধান লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতেও প্রায় সেই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু শিশুদিগের জ্বরে মধ্যান্ত্র প্রত্যয়ে ও প্রকোপ অবস্থা সন্ধ্যাব প্রাকালে বা রাত্রির প্রথমার্ধে প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে প্রলাপ ও অচেতনতা প্রবণতা এব, আক্ষেপেব ( কন্‌ভলশন ) সম্ভাবনা থাকে।

টিকিৎসা।—জ্বরের স্বাস্থ্যবিরাম প্রকৃতি নিকপিত হইবামাত্র এই জ্বরে জিলিসিমিনম্ ব্যবস্থেয়; কিন্তু আমাশয়িক লক্ষণ থাকিলে পলসেটিলা ও এণ্টিমোনিয়ম্ ফ্রুডম্ প্রয়োজ্য। শিরোলক্ষণেব প্রাবল্য হাইয়োসায়িমাস্ ব্যবহার করা কর্তব্য। কখন কখন ক্রিমি উপসর্গ বর্ণতঃ এই জ্বর দীর্ঘকাল থাকে এরূপ অবস্থায় দিনা ব্যবস্থেয়। শিশুদিগের জ্বরে ক্যামোমিলা ১২ অনেক সময় সবিশেষ ফলপ্রদ। সময়ে সময়ে এই স্বাস্থ্যবিরাম জ্বর, সন্নিপাত জ্বরে পরিণত হয়। একপ হইলে প্রথম অবস্থায় ব্যাপ্তিনিষা; উদরাময় ও অবসন্নতা দি লক্ষণে আসেনিক; পুষ্টিগল ক্ষতে মিউবিয়োটিক্ এসিড; প্রবল উন্মাদ, বমন, শিরঃপীড়া ও তন্দ্রাদি লক্ষণে ডিবেটুম-ভিরিডি; তিত্তাস্বাদ, পিত্তপ্রকোপ, কাস ও কোপনতা দি লক্ষণে ব্রাইবোনিয়া; অতিঘর্ষে মারকু রিয়স্, দুর্গন্ধময় মলমূত্রাদি নিঃসরণে কার্বো-ভেজিটেবিলিস; উদরাময়ের হুচনা পলসেটিলা; ফুসফুসের উপসর্গে ফসফরাস ও ব্রাইওনিয়া; স্নায়বীয়

\* অধুনা শৈশবান্তর স্বাস্থ্যবিরাম জ্বরে Enteric fever ( এণ্টারিক ফিবার ) বা সন্নিপাত জ্বর বলে।

দুর্কলতার কেন্দ্র, মলকাব, চায়না বা ফসকবিক এসিড ব্যবহৃত হয় । আক্ষেপে ।  
—বেল ( পূর্ণবস্ত্র বোগী ), এসিড-হাইড্রোসায়েনিক ( ক্ষীণবস্ত্র বোগী ),  
ইয়েশিয়া ( পৃষ্ঠবংশজ ও কৃমিজ আক্ষেপ ), সিনা ( কৃমিজ আক্ষেপ ) ।

পথ্যাপথ্য ।—মাংস, এরাট, দুগ্ধ ইত্যাদি লঘুপাক তবলদ্রব্য পথ্য  
দেওয়া উচিত :

## অবিরামজ্বর-দি কণ্ঠনিউড ফিবাস ।

### [১] সামান্য জ্বর—সিম্পল ফিবার ।

এই জ্বর সর্বাঙ্গের মূঢ় । ইচ্ছা ১২ হইতে ৩৬ ঘটিকাব মধ্যেই  
বিরাম পায় । এই নিমিত্ত ইচ্ছাকে একাদিনখারী জ্বর বা একি মারাল  
ফিবার বলে । •

লক্ষণ ।—অপরাজে বা সফ্যাকালে অল্প অল্প অবাক্রমণ, প্রথমতঃ  
শীত, অনন্তর উত্তাপ ও হৃৎকব কক্ষতা ; দৃঢ় পূর্ণ, দ্রুত নাড়ী ; লেপাস্বত ও  
শুক জিহ্বা ; পিপাসা ; দ্রুত শ্বাস, লোহিত বর্ণ ও অল্প মুত্র । অপচি,  
সচবাচল কটিবেদনা, অঙ্গ-গ্রহ, শিবঃপীড়া, অশ্রুৎ ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য ও কুণামান্য  
ইহাব প্রধান লক্ষণ ।

সময়ে সময়ে অন্যান্য গুরুতর বোৎসব পূর্বকপ স্বরূপ ও এই জ্বরের লক্ষণ  
প্রকাশিত হইয়া থাকে অতএব প্রথমেই ইহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে ভাবী  
রোগেরও অনেকাংশে শমনতা কমে ।

কারণ ।—ঘর্ষাববোধ, হিন বা আদ্রতা ভোগ, সহসা ঋতু-পরিবর্তন,  
আর্দ্রবস্ত্র পরিধান ; অপূষ্টিকব বা অপূর্ণ্যাপ্ত আহাব গ্রহণ ; আভ্যন্তরিক বা  
বাহ্যিক উপঘাত প্রাপ্তি ; এবং শ্রান্তি সামান্য জ্বরের কাবণ । কখন কখন  
অন্যান্য জ্বরের প্রকাব-ভেদ স্বরূপেও এই জব উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।—কেবল একোনাইট সেবন করাইলেই সামান্য জ্বর  
আরোগ্য হইয়া থাকে । ২৩ ঘণ্টা অন্তর এক একমাত্রা উষ্ম সেবন কবান

কর্তব্য। নিত্যস্থ অবশ্যক হইলে, এক বা অর্ধ ঘণ্টা অন্তরও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। উষ্ণ ও শুষ্ক স্থান; একবার শীত একবার দাহ; বেগবতীনাড়ী, কোষ্ঠবদ্ধ, হাঁচি, ঘানি; অস্থিরতা প্রভৃতি একোনাইটের লক্ষণ। একোনাইট সেবনান্তে ঘর্ম নিঃসৃত হইলে আর উহা প্রয়োগ করা উচিত নহে। প্রবল শিঃপীড়া থাকিলে একোনাইট সহকারে পর্যায়ক্রমে বেলেডোনা দেওয়া বিহিত। সহসা শীত, কম্প এবং তৎসহকারে অবসন্নতা ও সর্পিগ্ধীন ঘানি লক্ষণে জ্বরের, আক্রমণেব প্রারম্ভাবস্থায় সহ্য হই বিদ্যু মাত্রায় কর্পূরের উগ্র অরিষ্ট চিনি সহ-যোগে ১৫ বা ২০ মিনিট অন্তর সেবন করাইলে কেবল কর্পূর দ্বাবাই এই অব-আবোগ্য হইতে পারে। একোনাইটেব বিশেষ লক্ষণ স্বরূপ অতিশয় অস্থি-রতা না থাকিলে এবং শীত, গৃষ্ঠে ও অঙ্গে বেদনা, শিবোবেদনা ও শিবোগোবধ, সঞ্চালনে অঙ্গিগোলকে বেদনা, পূর্ণনাড়ী সহ অব, এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে জেলসেমিনম ১৮ গ্রন ব্যবস্থেয়। এই ঔষধেও অনেক সময় এক-দিবসেব মধ্যেই গাত্রবেদনাব বিনতি জন্মিয়া ও ঘর্ম নিঃসৃত হইয়া জ্বরের বিরাম পড়ে। জ্বরেব প্রাণগা লাঘব হইবাব পব রোগী শীঘ্র আবোগ্য লাভ না করিলে, অথচ তাহার হ্রস্বতা, আলস্য, ক্ষুধামান্দ্য, পিপাসা, মুখে তিক্তা-বাদ, কোষ্ঠবদ্ধ, ও আরক্ত মুত্রাদি লক্ষণ থাকিলে ট্রাইওনিয়া তৃতীয়ক্রম ২৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা ব্যবস্থা করা যায়। কখন কখন এন্টি-ফুড, সিকোনা, নক্সতমিকা প্রভৃতি ঔষধও লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য।—জ্বরের প্রবল অবস্থায় কোন পথ্য দেওয়া কর্তব্য নহে। কেবল রোগীব ইচ্ছানুসারে শীতল জল পান করিতে দেওয়া উচিত। শীতল জল পান করিতে দিলে ঘর্ম হইয়া শীঘ্র জ্বরের বিরাম হয়। জ্বরের বিরতির পর খই, যবের মণ্ড, মাণ্ড, আলাকট, তুলাব কাথ, সুজীর কটী ইত্যাদি পথ্য দিবে। বেদানা, কিস্‌মস্, পানাকল প্রভৃতি ফলও দেওয়া যাইতে পারে। পুনরায় জ্বব আসিয়াব আশঙ্কা দূব হইলে পুরাতন তুলাব অন্ন, মসুর বা মুগের দাউলের ঝোল, সুদ্র মৎস্তের ঝোল পথ্য দিবে। কোন প্রকার শুষ্কতব আহার ব্যবস্থা করিবে না। সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে স্নান করিতে দিবে।

## [ ২ ] সামান্য সন্তত জ্বর—সিম্পল কণ্ঠিনিউড ফিবার ।

এই জ্বর এক হইতে তিন দিন অথবা ততোধিক কাল বিদ্যমান থাকে ।  
যখন ১২ বা ২৪ ঘটিকার মধ্যে অরলক্ষণ সমস্ত উপশমিত হয়, তখন ইহাকে  
সামান্য জ্বর বা একিমারাল ফিবার বলা যায় । কিন্তু ফুসফুসপ্রদাহ, তক্ষণ  
আমবাত, টাইফস্ জ্বর প্রভৃতির পূর্বরূপ স্বরূপ এই জ্বর হইলে ইহা উৎকট  
আকার ধারণ করে ।

কারণ ।—ঋতু-পরিবর্তন, অধিকক্ষণ রোদ্রভোগ ; আর্দ্রবস্ত্র ধারণ  
বা আর্দ্র গৃহে বাস ; অপরিপুষ্ট বা অতিরিক্ত আহার গ্রহণ ; মাদক সেবন ;  
উপঘাত প্রাপ্তি, মানসিক বা শারীরিক শ্রান্তি অথবা উত্তেজনা সামান্য সন্তত  
জ্বরের উদ্ভাপক কারণ । টাইফস্ বা টাইফয়েড্ আদি জ্বরের বিশেষ বিধের  
ক্রিয়া, স্থানিক বা সর্বাঙ্গীন ক্রিয়া-বিকাশ ; অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার ও স্তৈর্য্যসঞ্চা-  
রাদি বশতও এই জ্বর উৎপন্ন হইতে পারে । কখন কখন কোন স্পষ্ট  
কারণ নিরূপণ করা যায় না । পুতিবাস্প ( ম্যালেরিয়া ) এই জ্বরের  
কাণ্ড নহে ।

লক্ষণ ।—প্রথমতঃ শীতাহতব, পৃষ্ঠ ও শিরোবেদনা, কুখামান্য ও  
ক্লান্তনাড়ী ; অনন্তর গায়ে উত্তাপ ; নাড়ীর বেগ, নাড়ীর স্পন্দন ১০০—১২০  
বার, ওষ্ঠ ও জিহ্বাশেখ, পিপাসা, বম্ব ও আরক্ত বৃত্ত, কোষ্ঠরোধ  
প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় । অধিকাংশ লক্ষণ সাধারণতঃ রাত্রিকালে  
বৃদ্ধি ও প্রত্যবে হ্রাস পায় । তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসান্তে, কচিং বা  
পঞ্চম কিবা ষষ্ঠ দিবসে প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া জ্বরের বিচ্ছেদ হয় । কখন  
কখন ঘর্ম্ম না হইয়া জ্বরের শেষাবস্থায় নাসিকা বা জরায়ু হইতে রক্ত-  
স্রাব, উদরাময় ও ওষ্ঠে অরস্ফোট প্রকাশিত হইয়া জ্বরের বিরাম পড়ে । এই  
জ্বরে দুর্নিবার বমন ও আহার ধারণে অসমর্থতা ইত্যাদি আশাশ্রিত লক্ষণ  
বিদ্যমান থাকিলে ইহাকে আমাশয়িক জ্বর ( গ্যাস্ট্রিক ফিবার ) বলে । পিত্ত

বা শ্লেষ্মা লক্ষণের প্রাবল্য অনুসারে কেহ কেহ ইহাকে পিত্তজ্বর বা শ্লেষ্মাজ্বর (বিলিয়াস অব মিউকাস ফিবার) বলিয়া থাকেন। এই অব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে জিহ্বা শুষ্ক ও কপিশবর্ণ, উদর ক্ষীণ এবং অগ্নিসার উপস্থিত হয় ও সামান্য সন্তত জ্বর সন্নিপাত অব্বে পরিণত হইবার আশঙ্কা জন্মে।

এই জ্বরে শরীর-তাপ কতিপয় ঘটিকাব মধ্যে ১০২, ১০৩ বা ১০৪ অংশ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। এই তাপ এক বা দুই দিনের অধিক থাকে না। ২৪ বা ৩৬ ঘটিকার মধ্যে শরীর-তাপ হ্রাস পড়িলে এবং অন্তান্ত অসুস্থ লক্ষণ উপস্থিত হইলে রোগ আরোণ্যোন্মুখ হইয়া উঠে।

ভারতবর্ষের যে সকল স্থানেব অতিরিক্ত উষ্ণতা সামুদ্রিক বায়ু দ্বারা নিবারিত হয় না সেই সমস্ত স্থানে অর্থাৎ মহীশূর, দণ্ডকারণা ও পঞ্জাবাদি প্রদেশে এই জ্বরের যত প্রাণল্য বোধাই ও বঙ্গদেশে তত নহে।

**চিকিৎসা।**—ব্যাপ্টিসিয়া এই জ্বরের অমোঘ ঔষধি। মূল বা ১ম ক্রমের অরিষ্ট দুই ঘণ্টা অন্তর ১১২ বিন্দু মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। যথাসময়ে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে দীর্ঘ জিহ্বা পবিত্র হইয়া, আহার গ্রহণ ও পরিপাক করণে সামর্থ্য জন্মে এবং সন্তত জ্বর সন্নিপাত জ্বরে পরিণত হইবার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু বোগের প্রবর্দ্ধিত অবস্থায় সন্নিপাত লক্ষণ প্রকাশান্তে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে আর্সেনিকই বিশেষ উপযোগী ঔষধ। এই জ্ববে অপর কতকগুলি ঔষধেরও ব্যবস্থা আছে। সেগুলি যদিও ইহার অমোঘ ঔষধ নহে তথাপি উহাদের প্রয়োগ-লক্ষণের প্রাবল্য অনুসারে ব্যাপ্টিসিয়া সহকারে পর্যায়ক্রমে অথবা স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহাব করা যাইতে পারে, যথা ;—পর্যায়ক্রমে শীতোদ্ভাপ, উত্তপ্ত ও রুদ্ধ বক, হাঁচি, অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণে একে'নাইট ; প্রবল শিরঃপীড়া, কপালপ্রান্তের শিবাম্পন্দ, মুখমণ্ডলের আবন্ধতা, নেত্রের প্রচণ্ডতা, অনিদ্রা, রাত্রিকালে প্রলাপ ইত্যাদি লক্ষণে বেলেডোনা ; শিরোগোরবিশিষ্ট শিরঃপীড়া (মস্তক সঞ্চালনে এই শিরঃপীড়া বৃদ্ধি পায় এবং বোধ হয় যেন মস্তক বিদীর্ণ হইবে), কাস, শ্বাসকষ্ট, অগ্নিশূন্য চাপাশুভব, পীতবর্ণ লেপাবৃত জিহ্বা, বমনেচ্ছা, কোষ্ঠবোধ, কপিশ বা পীতবর্ণ মূত্র, গাত্রবেদনা, কোপনতাদি লক্ষণে ট্রাইওনিয়া প্রয়োজিত হয়। এতব্যতীত ওপিয়াম, ক্যামোগোমিলা, নক্সভর্মিকা, পলমেটীলা,

মারকুরিয়স, ইপিকাপ, জেলসিমিয়ম, এণ্টিমোনিয়ম ক্রুডম, এণ্টিমোনিয়ম টার্টেরিকম, চায়না, কুইনাইন প্রভৃতি ও লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ওষধ প্রয়োগ করিয়াও রোগ উপশম প্রাপ্ত না হইলে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে উহা সম্ভবতঃ সন্নিপাত জ্বর (টাইফয়েড ফিবার) বলিয়া স্থির করা উচিত ও তদনুসারে চিকিৎসা করা কর্তব্য ।

পথ্যাপথ্য, —বোগীর গৃহে অধিক আলোক, উত্তাপ, গোলমাল ও লোক থাকিতে দেওয়া উচিত নহে । রোগীকে অধিক স্বস্তাবরণ দ্বারা ঢাকিয়া রাখাও অকর্তব্য । যাহাতে বোগীব উত্তেজনা জন্মে অথবা নিদ্রার বাধা হয় তাহা নিবারণ করা আবশ্যক । অব্যব প্রারম্ভাবস্থায় উষ্ণজলে পাদ-স্বেদ (ফুট-বাথ) বিশেষ ফলপ্রদ । এতদ্বারা রক্তসঞ্চালনের সামঞ্জস্য জন্মে ও বোগ শীঘ্র আরোগ্য হয় । অল্পপরিমাণে বারংবার শীতল জলপান ব্যবস্থের । শীতল জলপানে পাদস্বেদের উপকারিতা বর্দ্ধিত হয় । এই জ্বরের প্রবল অবস্থায় শীতল জল ও লঘুপাক পাতলা পেয় দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোন পথ্য ব্যবস্থের নহে । অগ্নি উদ্দীপ্ত হইলে যবের মণ্ড, ধৈয়ের মণ্ড, আরারুট বা সাগুর মণ্ড, অন্নমণ্ড ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে সহ্য পাইলে অন্নাদি অতরল পথ্য দেওয়া যাইতে পারে ।

—:—

### [৩] সন্নিপাত জ্বর — টাইফয়েড ফিবার ।

টাইফস জ্বরের সহিত সাদৃশ্য থাকাতে ইহার নাম টাইফয়েড জ্বর । টাইফয়েড জ্বরে সচরাচর অল্প আক্রান্ত হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে এণ্টারিক ফিভার বা আন্ত্রিক জ্বরও বলে । দূষিত পয়ঃপ্রণালী ইহার উৎপত্তির অন্ততর কারণ বিধায় ইহার সামান্য নাম ডেঞ্জ-ফিবার । ইহা মুক্তানুবন্ধী নহে অর্থাৎ তাগ হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হয় না । এদেশীয় কবিরাজেরা সচরাচর ইহাকে সন্নিপাত জ্বর বা বাত শ্লেষ্ম-বিকার বলিয়া থাকেন । টাইফয়েড জ্বর কিয়ৎপরিমাণে ব্যাপক ও স্পর্শ-সংক্রামক । জ্বরের তৃতীয় সপ্তাহেই ইহা অধিকতর স্পর্শ-সংক্রামক হইয়া উঠে । পরিণতবয়স্ক অপেক্ষা যুবকগণই

এতদ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে । সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, ও নবেম্বর মাসে ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় ।

কারণ ।—এই জ্বর মলিনতা বা দূষিত বায়ু হইতে উৎপন্ন হয় । বিগলিত জাস্তব পদার্থ, পরঃপ্রণালী (নবদামা) অথবা মলিন জলাশয়াদি হইতে উৎপন্ন একপ্রকার বিষাক্ত বাষ্প দ্বারা বা পানীয়জল দূষিত হইয়া এই বোগ জন্মে । সুপ্রসিদ্ধ ক্লেবস্ বলেন যে ব্যাকটিরিয়া নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র জীবগু হইতে টাইফয়েড জ্বর উৎপন্ন হয় । জনাকীর্ণ ও বিশুদ্ধ বায়ু-বিবর্জিত স্থলেই ইহা বিশেষ প্রাদুর্ভূত হয় । এই জ্বরগ্রস্ত রোগীর মল-মূত্রে দূষিত জলাশয়ের জল ব্যবহার অথবা উক্ত জল মিশ্রিত দুগ্ধপান বারাও এই বোগ জন্মে ।

ডাঃ হার্লি বলেন যে (১) পবিত্রীকৃত জাস্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ অনাবৃষ্টি কালে সঞ্চিত ও বিগলিত হইলে উহা হইতে একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ সমুদ্ভূত হয় । এই বিষ প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিব জলে দ্রবীভূত ও প্রক্ষালিত না হইলে বায়ুতে উৎখিত বা জলে বিকীর্ণ হয় এবং জলবায়ু সহযোগে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া টাইফয়েড জ্বর উৎপন্ন কবে । (২) আহাৰ্য বা পানীয় দ্রব্য দূষিত হইয়াও এই বোগ জন্মিয়া থাকে । (৩) অল্প কঠকপল্লি তরুণ বোণের ভোগ-কালে সর্কান্ট্রীন প্রাদাহিক অবস্থা বশতও এই জ্বরের লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে । বয়ঃক্রম, গুহু, তাপ, ও বায়বীয় পরিবর্তনাদি ইহার পূর্ববর্তী কারণ ।

লক্ষণ ।—টাইফয়েড জ্বর সাধাবণতঃ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয় । ইহার পূর্বরূপ অবস্থা ছয় হইতে চৌদ্দ দিবস অবস্থিতি করে । কখন কখন এই রোগ অতি সূত্রবৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে । রোগ বিকাশ পাইবার সময় রোগী অলসতা, ও একপ্রকার ম্লানি অনুভব করে, এবং সহজেই প্রাস্ত হইয়া পড়ে । তাহার ক্ষুধান্য, শরীরাত্যস্তরে বেদনা, এবং জিহ্বায় একপ্রকার জৈব ও শুভ্র লেপ বিদ্যমান থাকে । কয়েক দিবসের মধ্যে শীতানুভব, শিরো-বেদনা, কিয়ৎপরিমাণে আলোকাসহতা, জিহ্বার লেপের প্রগাঢ়তা ও উহার অপ্রত্যগের আরক্ততা, অতিশয় দুর্বলতানুভব, নাড়ীর ক্ষীণতা, উদরের অল্প অল্প স্পর্শ-দেয় এবং ক্রমশঃ অধিক অনিদ্রা লক্ষণ উপস্থিত হয় । রাত্রিতে গাত্রের উত্তাপ, অস্থিবেদনা, ও অতিশয় পিপাসা, এবং অল্প অল্প বিবস্মিতা জন্মে ।

সাধারণতঃ কিয়ৎপরিমাণে অতিসার থাকে । বোগ যতই বর্ধিত হইতে থাকে এই সমস্ত লক্ষণ ততই তীব্রতর হইয়া উঠে এবং অন্তান্ত অতিরিক্ত লক্ষণও আবির্ভূত হয় । মুখমণ্ডলের অবসাদ ও পাণ্ডুরতা ; গণ্ডস্থলের আৱ-  
 ক্ষতা ; নেত্রের নিমগ্নতা ; মূত্রে স্বল্পতা, ও সময়ে সময়ে অবরুদ্ধতা ; নাড়ীর  
 সমধিক ক্ষুদ্রতা ; গাত্র-তাপেব বিবৃদ্ধি ; শ্বাসের জ্বলক ; ওষ্ঠের শুষ্কতা ও  
 কপিশতা ; জিহবার নীবসতা, বিদীর্ণতা ও কপিশবর্ণ ; দন্তে দন্ত-শর্করার  
 সঞ্চয় ; উদরে, বিশেষতঃ দক্ষিণ শ্রোণি-গহ্বরে স্পর্শ-দেয় প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ  
 পায় । এক্ষণ বোগী আব শিরোবেদনার কথা বলেন । সে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন  
 হইয়া পড়ে । মুখ-শোষ সত্ত্বেও বিশেষ কিছু পান বা আহাব করিতে চায়না ;  
 কোন বিষয়েব অভিযোগ করেনা ; কোন প্রশ্ন কবিলে ধীরে ধীরে উত্তর  
 দেয় ; “কেমন আছ,” জিজ্ঞাসা করিলে “ভাল আছি” বলে, ইজ্জিরের,  
 বিশেষতঃ ঐতিশক্তিব ক্ষীণতা জন্মে । স্পর্শ-জ্ঞান স্তব্ধ হয় । সময়ে সময়ে  
 কনীনিকা প্রসারিত দেখা যায় । অধিকাংশ বোগীবই প্রলাপ উপস্থিত হয় ।  
 সাধারণতঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহেই প্রলাপ প্রকাশিত হইয়া থাকে ।  
 প্রলাপ মৃদু বা তীব্র উভয় প্রকারই হইতে পারে । কিন্তু প্রায়ই উহাতে  
 প্রচণ্ডতা লক্ষিত হয় না, তবে সময়ে সময়ে উচ্চ চিৎকার ও গৃহ হইতে বাহির  
 হইয়া যাইবার চেষ্টা বর্তমান দেখা যায় । কখনও বা রোগীর অজ্ঞত করনা  
 উপস্থিত হয় ও তাহা প্রতিনিয়তই বিদ্যমান থাকে । সচরাচর অসংলগ্ন মৃদু  
 প্রলাপ, স্থান-পরিবর্তন-প্রবৃত্তি, ও অবাস্তব আভ্যন্তরীণ নিকট হইতে পলা-  
 য়ন-চেষ্টাই সমধিক প্রকাশ পায় । প্রলাপেব সহিত শয্যা-বস্ত্র খুঁটন বা শূন্তে  
 অবাস্তব পদার্থ বাস্তব বলিয়া ধাবণ লক্ষণও থাকে ।

অধিকাংশ রোগীব পেশীর স্পন্দন, বিশেষতঃ হস্তের পেশীর স্পন্দন পরি-  
 লক্ষিত হয় । ইংরেজীতে ইহাকে “সবসলটস টেণ্ডিনম” কহে । রোগ উৎকট  
 হইয়া উঠিলে ওদন্ত মোহে পরিণত হয়, ও কখন কখন উহার সহিত শ্বাসের  
 ঘড় ঘড় শব্দ বর্তমান থাকে ।

এই জ্বরের, সহিত প্রায়ই উদরাময় থাকে এবং পেরিমাটির বর্ণ বা দাই-  
 লের ঝোলের ভ্রায় বিরেচন হয় । কোন কোন রোগীর আবার অতিসার না  
 জন্মিয়া কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে । রোগ উৎকট হইয়া উঠিলে অনিচ্ছায় বলপ্রাপ্ত হয়,



অথবা মূবৃক্ক জন্মে এবং বিন্দু বিন্দু করিয়া মূত্র পাত্ত হইয়। কাহাব কাহারি, অল্প হইতে বৃক্কস্রাব হইয়া থাকে। কোন কোন চিকিৎসক এই বৃক্কস্রাব সঙ্কটমূচক মনে কবেন, কেহ কেহ বা ইহা তত বিপদজনক বলেন না।

উদরাগ্নান ও অস্ত্র-কৃজন টাইফয়েড জ্বরের অপর অস্ত্র-লক্ষণ। আগ্নান, অস্ত্র-কৃজন, দক্ষিণ শ্রোণীদেশে স্পন্দ-ধ্বম, এবং হরিতালের বর্ণেব স্তায় পীতবর্ণ আভিসার, এই চারিটাই এই রোগের বিনির্ণয় লক্ষণ। ইহাতে উদরের ক্ষীততা সচরাচর তত অধিক থাকে না এবং অস্ত্রে বাস্প সঞ্চিত হইয়াই অস্ত্র-কৃজন জন্মে।

দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ সপ্তম হইতে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে গাত্রে টাইফয়েড জ্বরের প্রাকৃতিসিদ্ধ পীড়কা উৎপন্ন হয়। এই পীড়কা অপচ্যমান, ক্ষুদ্র, ঈষৎ উন্নত, ও অপ্রগাঢ় পাটিলবর্ণ। অক্ষুণ্ণাঘারা চাপিলে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিলুপ্ত হয় এবং দুই তিন দিনের মধ্যে নিশিয়া যায়। অনন্তর আবার নূতন পীড়কা প্রকাশিত হয়। এদেশীয়দিগেব স্ত্রীমবর্ণ শরীরে এই সকল পীড়কা মশক দংশনের স্থায় দেখায়। পীড়কা সর্বদা বিদ্যমান থাকেনা, কখন কখন কেবল উহার দুই একটা চিহ্নমাত্র দৃষ্ট হয়। সচরাচর জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদই উৎপন্ন হয় এবং ঘাড়ে, উদরে ও বক্ষঃস্থলে উহা প্রকাশ পায়। উদ্ভেদ গুলিতে এক প্রকার তরল পদার্থ বা মস্ত সঞ্চিত থাকে। দীর্ঘকাল ব্যাপী রোগে গাত্রে কালিমা বা কালশিরা জন্মে। সহজসাধ্য রোগে, বিশেষতঃ বালকদিগের অরে পীড়কা উৎপন্ন হইবাব পরে জ্বরের হ্রাস পড়িতে থাকে। কতকগুলি রোগীর অন্ত্যস্ত ঘর্ষস্রাব হয়। ক্রমাগত ঘর্ষস্রাব স্রবক্ষণ নহে।

এই রোগে মধ্যে মধ্যে সাবহিত হইয়া রোগীর ফুসফুস পরীক্ষা করা উচিত। কারণ, টাইফয়েড জ্বরে যে কোন সময়ে রোগীর ফুসফুস-প্রদাহ উপস্থিত হইতে পারে। শরৎকালের জ্বরেই এই উপসর্গ অধিক জন্মে, কিন্তু রোগী ঔদাস্তবশতঃ সে সম্বন্ধে কিছু প্রকাশ করে না। ইহাতে কাসের প্রায়ই উৎপত্তি থাকেনা, কেবল মধ্যে মধ্যে ‘খক খক’ শব্দ শুনা যায়। আকর্ষণ করিলে ফুসফুসের উপসর্গ বিদিত হওয়া যায়। টাইফয়েড জ্বরে কখন কখন কর্ণ-মূল প্রদাহিত ও পবিপক হয়। এই রোগে কর্ণ-মূল-প্রদাহ স্রবক্ষণ নহে। এই উপসর্গ উপস্থিত হইলে রোগী আবোগ্য হইলেও শীঘ্র আরোগ্য লাভ

করিতে পারে না। টাইফয়েড জ্বরে অল্প কতকগুলি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। কখন কখন আত্মবলিক উপরামর বর্জিত ও দুর্বলকর হইয়া সন্নিপাত জ্বর সঙ্গটজনক হইয়া উঠে। কখনও বা অল্প হইতে অধিক পরিমাণে বসন্তপাত হয়। দ্বাবিংশতি হইতে পঞ্চবিংশতি দিবসের মধ্যে অল্পে ছিদ্র জন্মিতে পারে। এই শেষোক্ত উপসর্গ উৎপন্ন হইলে হিমাক্ষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অত্যন্ত আধান, দুর্নিবার হিকা, ও বমনাদি লক্ষণও দৃষ্ট হয় এবং রোগী প্রায়ই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। টাইফয়েড জ্ববে অল্প-প্রদাহ, গ্ৰীহা বা যক্ষ্মে বিবর্জনাদি উপসর্গও সম্ভব-পব। কখন কখন বমনাদি লক্ষণাপন্ন তীব্র আশাশয়িক উপদাহও প্রকাশিত হইয়া থাকে।

টাইফয়েডজ্বরে তাপমানদ্বারা প্রতিনিয়ত বোগীর গাত্র-তাপ পরীক্ষা করা উচিত। যদি প্রত্যুষে গাত্র-তাপ ১০৫ ডিগ্রীর অধিক হয়, অথবা কোন সময়ে ১০৭ ডিগ্রীর উপরে উঠে, তবে প্রায়ই এই বোগ আরোগ্য হয়না। প্রথম সপ্তাহে গাত্র-তাপ ১০৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উন্নিত হয়; দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াহ্নে একই প্রকার অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে ১০৫ ডিগ্রীর একটু উর্দ্ধে ও প্রাতঃকালে ১০৫ ডিগ্রীর একটু নিম্নে থাকে; তৃতীয় সপ্তাহে প্রাতঃকালের গাত্রতাপ কিঞ্চিৎ নূন হয়; চতুর্থ সপ্তাহে ক্রমশঃ হ্রাস পড়িতে থাকে। সাধারণতঃ এই অব্ধে গাত্র-তাপ ১০৫ ডিগ্রীর অধিক বৃদ্ধি পায়না। ১০৫ ডিগ্রী অপেক্ষা বৃদ্ধি বিপজ্জনক। এবং আকস্মিক বা অনিয়মিত বৃদ্ধি অভ্যন্তরিক যন্ত্রে উপসর্গ জ্ঞাপক। সম্ভবতঃ ফুসফুসে রক্ত-সঞ্চয় হইলেই এইরূপ ঘটে। গাত্র-তাপ অধিক হ্রাস প্রাপ্ত হইলে অল্প হইতে রক্তস্রাবের সম্ভাবনা। অল্প হইতে রক্তস্রাব হইবার পূর্বে কখন কখন সহসা গাত্র-তাপের লাঘব ও নাড়ীর বেগের পরিবর্তন জন্মে। ক্রমাগত গাত্র-তাপের হ্রাস ও অত্যন্ত লক্ষণের উপশমে আরোগ্যোগ্যুততা বুঝা যায়; কিন্তু সহসা গাত্র তাপের হ্রাস ও অত্যন্ত লক্ষণের অল্পশম কুলক্ষণ। বোগ অল্পকট আকারের হইলে প্রায় দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষেই উপশমিত হইতে থাকে, অর্থাৎ জ্বরের বিরামকাল স্পষ্ট, উদবাসর হ্রাসপ্রাপ্ত, জিহ্বা পরিষ্কৃত ও অঙ্গ-বেদনা দূরীকৃত হয়; গাত্র-তাপ হ্রাস পড়ে এবং নিদ্রা ও ক্ষুধা জন্মে। উৎকট আকারে হইলে দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্য-ভাগে প্রাণাপাদি গুরুতর লক্ষণ সকল

উপস্থিত হয়; এবং মৃত্যু-সম্ভাবনা হইলে সম্পূর্ণরূপে রোগীর সংজ্ঞা নাশ প্রাপ্ত, ও গাত্রতাপ বিবর্তিত হয়। এই রোগের ভোগকাল গড়ে প্রায় ২৮ দিন। সাধারণতঃ প্রথম বোল দিবসের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হয়। এক পক্ষ জীবিত থাকিলে তাহার আরোগ্যের সমধিক সম্ভাবনা।

বিনির্ণয়।—স্বতন্ত্র স্বল্পবিবাহ অর, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, এন্টি-ব্রঙ্কাইটিস, ও মিনিমাইটিস বোগের সহিত টাইফয়েড অরর বিনির্ণয়ে ভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু গাত্র-তাপের পরিমাণ দ্বারা অন্ত্যস্ত ব্যাধি হইতে টাইফয়েড অরের প্রভেদ করা যায়। সাধাবণতঃ এই অরে গাত্রতাপবৃদ্ধির ক্রম এইরূপ—প্রথম দিবস প্রাতঃকালে ৯৮.৫, সন্ধ্যাকালে ১০০.৫; দ্বিতীয় দিবস প্রাতঃকালে ৯৯.৫, সন্ধ্যাকালে ১০১.৫, তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে ১০০.৫, সন্ধ্যাকালে ১০২.৫, চতুর্থ দিবস প্রাতঃকালে ১০১.৫, সন্ধ্যাকালে ১০৪, চতুর্থ হইতে সপ্তম দিবস পর্য্যন্ত সন্ধ্যাকালের গাত্র-তাপ ১০৩ হইতে ১০৫ তাপাংশ, এবং প্রাতঃকালে উহা অপেক্ষা প্রায় এক তাপাংশ নূন থাকে।

স্তাবতবর্ষে যেসকল টাইফয়েড অর দৃষ্ট হয় স্বল্প-বিবাহ অরের লক্ষণের সহিত তাহার অনেকটা সাদৃশ্য থাকে, এদেশে সন্নিপাত অরে ও দ্বৈবং বিবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। অপিচ, বমন, বিরচন, মস্তিষ্ক-পীড়ার উপসর্গ উভয় অরেই বিদ্যমান থাকিতে পারে। সন্নিপাত অরের প্রকৃতিসিদ্ধ পীড়কা এতদেশে প্রায়ই প্রকাশ পায় না। সুতরাং সন্নিপাত ও স্বল্প-বিবাহ অরের প্রভেদ নিরূপণ করিতে হইলে তাপমান যত্নবারা গাত্রতাপ পরিমাণ করার নিত্য আবশ্যক পড়ে। সন্নিপাত অবস্থায় স্বল্প-বিবাহ অরে প্রথম হইতে চতুর্থ দিবস পর্য্যন্ত গাত্রতাপ বৃদ্ধির কোন নৈকীবিত নিয়ম দৃষ্ট হয় না; এবং সকল স্থলেই প্রাতঃকালের তাপ অপেক্ষা সন্ধ্যাকালের তাপ বৃদ্ধি পায় না। অধিকন্তু, স্বল্প-বিবাহ অরের স্বল্পবিবাহ বা মধ্যবস্থা টাইফয়েড অর অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট থাকে। নিউমোনিয়ার পূর্বরূপ অবস্থার লক্ষণ; এবং টাইফয়েড অবস্থার অরর আক্রমণের পরে নিউমোনিয়া উপসর্গের উপস্থিতি দ্বারা টাইফয়েড অর ও নিউমোনিয়ার প্রভেদ করা যায়। কিন্তু দক্ষিণ প্রোংগম্বরে (ইলিয়াক ফোলা) বেদনা ও স্পন্দ-শেষ, পীত, হরিতালের বর্ণের ক্ষার বিরচন; এবং প্যাটল বর্ণের (গোলাপী রঙের) পীড়কা; এই কয়টাই

টাইফয়েড জ্বরের প্রধান বিনিশ্চয় লক্ষণ । এই সকল বর্তমান থাকিলে অঙ্গের প্রদাহ বিদ্যমান আছে বলিবা স্থিৰ কবা যাইতে পারে ।

**প্রস্তান ।**—কোন কোন ক্ষত্রে টাইফয়েড জ্বরে অধিক সংখ্যক, কোন কোন ক্ষত্রে অল্প সংখ্যক বোগী মরে । আবার, কোন বৎসর বহুলোকের, কোন বৎসর বা অল্প লোকের মৃত্যু হয় । কোথাও বা টাইফয়েড জ্বর বিহুটিকাৰ ছাদ ব্যাপক আকাৰে উপস্থিত হইবা বিস্তৃত লোকের প্রাণ নষ্ট কবে । এই বোগে শতকরা গড়ে ৮ হইতে ১৫ জনের মৃত্যু হইয়া থাকে । বোগের তীব্রতাসাবেই ভাবী ফল নিকৃপিত হয় । প্রথমাবস্থায় প্রবল প্রলাপ চরুক্ষণ । তজ্জাদোষ, আক্ষেপ, সুস্পষ্ট কণ্ডরোংক্ষেপ, শবাবদ্র খুঁটন, প্রতিনিয়ত প্রবল প্রলাপ, কর্ণ-মূল-প্রদাহ, অঙ্গ হইতে প্রভূত রক্তস্রাব, ও অতিশয় অবসন্নতা, টাইফয়েড জ্বরে এই গুলি অন্তত লক্ষণ । মোহ বা প্রবল প্রলাপ অতিশয় গুরুতব লক্ষণ এবং বোগের ভাবীফলের অবধারিত অন্তততাজ্ঞাপক । অতিশয় অবসন্নতা, ক্ষীণ ও অতি দ্রুতনাড়ীও তজ্জপ অমঙ্গলসূচক । গাত্র-তাপের ১০৬ ডিগ্রীর উপরে উত্তীর্ণ, অথবা স্বাভাবিক পরিমাণাপেক্ষা নীচ নীচ অধঃপতন উভয়ই বিপদজনক । গর্ভাবস্থায় এই রোগ জন্মিলে প্রায়ই এতদ্বাৰা গর্ভপাত হয় এবং তজ্জনিত প্রভূত রক্তস্রাব নিবন্ধন রোগিনীৰ মৃত্যু হইয়া থাকে । মোহ, প্রলাপ, অতিশয় অবসন্নতা, বা গর্ভাবস্থা না থাকিলে বোগীর আরোগ্যলাভেব আশা কবা যাইতে পাবে । আবোগ্যাঙ্গুধ অবস্থায়ও অন্ত-ভেদ হইবার সম্ভাবনা আছে ।

**সম্প্রাপ্তিগত শরীর-বিকার ।**—টাইফয়েড জ্বরের বিষে জড়িতাঙ্গ বা ইলিয়মেব বিকৃতি দৃষ্ট হয় । কখন কখন মস্তিষ্কের বক্রসঞ্চয়, আমাশয়ের কোমলতা ও ক্ষত, প্রাচী ও যকৃতের বিরুদ্ধি প্রভৃতিও পবিলক্ষিত হইয়া থাকে । কিন্তু সচরাচর পেয়ারাখ্য গ্রন্থি, নিঃসঙ্গ (সলিটারি) গ্রন্থি, ও মধ্যস্থ গ্রন্থিরই বিকৃতি জন্মে । এই রোগে সহব মৃত্যু হইলে জড়িতাঙ্গেব শৈল্পিক কিল্লীৰ ক্ষীততা এবং পেয়ারাখ্য গ্রন্থি ও নিঃসঙ্গ গ্রন্থির প্রদাহ লক্ষিত হয় । বিলম্বে মৃত্যু হইলে গ্রন্থিগুলিতে ক্ষত ও কখন কখন অঙ্গে রক্ত দেখা যায় । মধ্যস্থ গ্রন্থি ক্ষীত হয় ও কখন কখন পচিয়া অন্ত-বেষ্ট-গহবরে নিপতিত হয় । জড়িতাঙ্গ ও অঙ্গাঙ্গের মধ্যস্থ কপাটের সমোপবর্তী গ্রন্থিগুলিহ

সমধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে । অল্প-বেধ জন্মিলে সাধারণতঃ অকাত্তের জ্বর হকির ন্যায় চলে । অধিকাত্তের শেষে দুই তিন ইঞ্চি অতিশয় ক্ষীত দৃষ্ট হয় । কাত্তান কাত্তান অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত-একটি গভীর ও বহুব ক্ষতে পরিণত হয় এবং উহা ক্ষীত ও আবদ্ধ প্রায়শঃ ঝিল্লীদ্বারা পরিবেষ্টিত দেখিতে পাওয়া যায় । কখন কখন অক্ষায় ও ফুলালের গ্রাহিতেও প্রদাহ ও ক্ষত জন্মে ।

সকল বোগীদই প্রাণ অন্নবিশ্রাম বস্ত্র-সকল জন্মে, উহা সাধারণতঃ বিবর্জিত হয়, কখন কখন উহান স্বাভাবিক আকান অপেক্ষা দুই তিন গুণ বৃদ্ধি পায় ; বর্ণ মলিন হয়, এবং প্রাণাতিশয় নরম হইয়া পড়ে, এত নরম হয় যে সহজেই উহা ভাঙ্গিয়া কেদা ঘটিতে পারে । অধিকাংশ বোগীদই ফুসফুসের প্রদাহ ও দৃঢ়তার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় । ডাঃ লুইস বলেন যে, অস্ত্রান্ত্র প্রোগ অপেক্ষা টাইফয়েডে অনেক ফুসফুসই অনেক সময় আক্রান্ত হইয়া থাকে ।

**সম্প্রাপ্তি ।**—রক্তে এক প্রকার দূষিত পদার্থের সম্প্রবেশই সাধারণতঃ টাইফয়েড জ্বরের উদ্যোগ কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে । কিন্তু এই বিষাক্ত পদার্থের স্বভাবে কিরূপে টাইফয়েড জ্বরে বিবিধ শারীরিক পরিবর্তন বিশেষতঃ অস্ত্রের বিধান-বিকান সমুৎপন্ন হয় তাহাই পর্যালোচনা করা কর্তব্য । সম্ভবতঃ বক্তৃতের বক্তবহা নাড়ীতে রক্তসঞ্চয় অথবা উহার নিঃস্রব-নিঃসারিণী নাড়ীতে বিবেক প্রভাব বশতঃ বক্তৃতের ক্রিয়ার অল্পাধিক বৈলক্ষণ্য ও স্তম্ভতা জন্মে । বক্তৃতের শৈবিক স্তম্ভ-সঞ্চালন কোন দূষিত পদার্থ প্রবিষ্ট হইলে বক্তৃতের স্বাভাবিকী ক্রিয়ায় উহা লিপষ্ট হইয়া থাকে । কিন্তু প্রবিষ্ট বিবেক প্রভাবে যদি বক্তৃতের এই বিব-নিঃসারিণী শক্তির ন্যূনতা জন্মে এবং পিত্তের স্তম্ভাস্ত্র উপস্থিত হয় অর্থাৎ উহার গাঢ়তা, গুরুত্ব, ও আবদ্ধ নষ্ট হইয়া পিত্ত জলবৎ, লবণাকার, বা অল্প হইয়া উঠে তাহাহইলে ভুক্তদ্রব্যের আনবস (কাইন) অসম্যাক্ গুণবৎ পিত্তের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া অল্প-পথে উপদাহ উৎপন্ন করে ও বাষ্প জন্মায় এবং তজ্জন্ত অল্প ক্ষীত ও উপদাহিত এবং পেরাবাণ্য গ্রহি ও অসমবেতগ্রহি ক্ষতগ্রস্ত হইয়া পড়ে । এই সকল গ্রহি অতিশয় নাড়ীময় ও হৃদয়ের কোবনয় বিনান অধিকতর ক্ষুদ্রায়

বলিয়া অল্পের অজ্ঞান গ্রন্থি অপেক্ষা ইহারাই অধিকতর আক্রান্ত হইয়া থাকে । জড়িতাত্ত্বের ( ইলিয়ন ) নিম্নভাগে গ্রন্থিগুলিই সমধিক পীড়িত হয় । তাহার কারণ এই যে জড়িতাত্ত্বের এই স্থানেই অধিক সংখ্যক গ্রন্থি অবস্থিত আছে এবং এই স্থানেই জড়িতাত্ত্ব অক্ষাত্ত্বের সহিত সংযুক্ত হওয়াতে সংযোগস্থলে অস্ত্রের আংশব্দর নলবারেব দ্বাণাবরক-পেশীর আকার ধারণ করিয়াছে । সুতরাং উহার তন্তুগুলিও নির্মাণ-গুণে ঐ সংযোগস্থলের অপেক্ষা দিকে শৈথিল্যবশতঃ পতি জন্মিতে না পারাতে সংযোগস্থলের নিকটবর্তী অস্থানেই রক্তসঞ্চয়ের সমধিক সম্ভাবনা জন্মে ।

চিকিৎসা ।—ব্যাণ্টিসিয়া, ব্রাইওনিয়া, বসটক্স, ফসফরাস, ফসফিক এসিড, হাইওসায়েনাস, বেলেডোনা, কার্বো-ভেজি, মার্ক-সল, মিউব-এসিড, আর্সেনিকম, ও সিল্কোনা টাইবয়েড অপেক্ষা প্রধান ঔষধ । সচরাচর এই বোগে ব্যাণ্টিসিয়া, ব্রাইওনিয়া, বসটক্স, ফসফরাস, ও হাইওসায়েনাসই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাঃ ডিকিন্সন বলেন যে টাইকয়েড জ্বরে লক্ষণালসারে কেবল ব্রাইওনিয়া ও বসটক্স প্রযোগেই তিনভাগের দুইভাগ রোগী আরোগ্য লাভ করে, অবশিষ্টাংশের অজ্ঞান ঔষধের প্রয়োজন পড়ে ।

(১) পূর্বরূপ অবস্থায় ।—ব্যাণ্ট, ব্রাই জেলস, বস ; (২) প্রাথমিক অবস্থায় ।—বেল, ব্যাপ্ট, ব্রাই, ক্যাস, চায়না, জেলস, ডিজি, ডক, হাইওস, ইপিকাক, আইরিস, লাইকো, মার্ক, নক্স-ভম, পলস, বস, ভিবাট-এব, ভিরাট-ভির ; (৩) দ্বিতীয় অবস্থায় ।—পলস, মার্ক, ব্রাই, ব্যাপ্ট, রস, এপিস, এসিড-ফস, ক্যাস, ক্যাক-কার্ক, ককু, হাইওস, সলফ, ভিবাট-এব ; (৪) তৃতীয় অবস্থায় ।—ব্যাণ্ট, ব্রাই, বস, এসিড-ফস, বেল, ওপি, ক্যাক-কার্ক, নক্স-ভম, ভিরাট-এব, চায়না, আস', এসিড-মিউর, এসিড-নাইট ; (৫) আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায় ।—চায়না, নক্স-ভম, পলস, ভিরাট-এব, ককু, এলটোন ; (৬) উপসর্গে ।—[ ক ] নামিকা হইতে রক্তস্রাবে, —একন, মার্ক, ফস, পলস, রস, সলফ । [ খ ] অল্প হইতে রক্তস্রাবে, —টেরিবিহ, হেসে, এসিড নাইট, এসিড ফস, আস', কার্বো-ভেজি, ইপিক, ফস । [ গ ] অল্প-বেক্ট-প্রদাহে ; —আস', বেল, কার্বো ভেজি, ইপিক, মার্ক, ওপি । [ ঘ ] কর্ণ-মূল-প্রদাহে ; —একন, বেল, ক্যাক কার্ক ।

[ঙ] তালুমূল-প্রদাহে ;—একন, বেল, ব্রাই। [চ] স্ফোটকে ;—আর্স, বেল, লাইকো, সিলি, সলফ। [ছ] বধিরতায় ;—আর্গ, কস, এসি-কস, ভিরাট, চায়না, কুইনাইন। লক্ষণানুসারে এই সকল ঔষধ উপযোগী হইয়া থাকে।

পরিণাম অবস্থায় এই বোগে কাস, অগ্নিমান্দ্য, শিরঃপীড়াদি বিবিধ উপ-সর্গ উপস্থিত হয়। মাস্তিষ্ক-লক্ষণে ;—বেল, হাইওল, জিকম, ওপিয়ম, রসটক্স ; বক্ষোলক্ষণে ;—কস, ব্রাই, আউওড, ইপি, সলফ ; অগ্নি-মান্দ্য ;—নক্স-ডম, কার্বো-ভেজি, ইয়ে, মার্ক ; অতিক্রোধায়,—চায়না ; নিম্নাঙ্গের শোথে,—আর্স, সিক, লাইকো, সলফ ; শয্যাক্রান্তে,—মূছ ক্যাণেথুলা দ্রব ; দুর্বলতায়,—বলবিধানার্থ কয়েকমাত্রা সলফার, চায়না ; এই সকল ঔষধ ব্যবস্থেয় হয়।

প্রধান প্রধান ঔষধের বিশেষ লক্ষণ ।

(১) ব্যাপ্টিসিয়া\* ।—টাইফয়েড অব সন্দেহ হইবামাত্র রোগের পূর্বরূপ অবস্থায় ব্যাপ্টিসিয়া ১৮, এক বিন্দুমাত্রায় ২০ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিলে জ্বরের প্রকোপ অনেকটা হ্রাস পড়িতে পারে। নাড়ীর কোমলতা, পূর্ণতা, ও দ্রুততা ; শিরঃপীড়া ও প্রলাপ প্রবণতা ; আবোগ্যে নৈরাশ্র ; বাসে হর্ষক ; সর্কাসে-বেদনা, ও শয়নে বেদনানুভব ব্যাপ্টিসিয়ার প্রয়োগ-লক্ষণ। (২) ব্রাইও-নিয়া ।—ব্রাওনিয়া টাইফয়েড জ্বরের প্রথম মণ্ডাহেব সমস্ত লক্ষণের উপযোগী বলিয়া পূর্বরূপ অবস্থায় অর্থাৎ রোগের প্রারম্ভে দুর্বলতা, অলসতা, ক্রোধ-হীনতা, জিহ্বায় শুভ্রবর্ণ লেপ, অঙ্গ-ক্রান্তি, পেশীতে সঞ্চারমানবেদনা, ও বর্ষ-শূত্র জ্বালাকর উত্তাপ লক্ষণে এই ঔষধ বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসি-তেছে। অতিসার পরিশূত্র বোগীদিগের পক্ষেই ইহা বিশেষ উপযোগী। লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে রোগের প্রবর্তিত অবস্থায়ও ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। (৩) রসটক্স ।—উদরাময় লক্ষণাপন্ন টাইফয়েড জ্বরে রসটক্স বিশেষ উপযোগী। বারংবার গৈরিকবর্ণের তরল মলশ্রাব, অন্নমূত্র, অঙ্গকৃদ্ধন, গাত্রে রসটক্স স্তাপক আমবাতিক বেদনা, ওদন্ত প্রভৃতি ইহার প্রয়োগ-

লক্ষণ । রসষ্টক প্রয়োগে উদরায়র নিবারিত না হইলে আর্সেনিক ব্যবহের ।

(৪) আর্সেনিক ।—কৃষ্ণবর্ণ, ভূর্ণক্কিময় মল ও রোগের প্রারম্ভাবস্থায় শয্যা-কৃত, এবং বারংবার মূত্র বেগ ও অল্প অল্প আলাকর মূত্রত্যাগ আর্সেনিকের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ । (৫) মার্কসল ।—হরিভাভ আমমর মল লক্ষণে মার্কসল ফলপ্রদ ।

(৬) কসফরিক এসিড ।—মূত্র প্রকৃতির টাইফয়েড জ্বরে অতিশয় ঔদাসিন্য, ও বেদনামূলক উদরায়র লক্ষণে কসফরিক এসিড উপযোগী । অস্ত্র হইতে মলিন বর্ণ, গাঢ় রক্ত্রস্রাবেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ । (৭) কসফরাস ।—টাইফয়েড জ্বরের সহিত ব্রুকাইটস বা নিউমোনিয়া সংশ্লিষ্ট থাকিলে কসফরাস ব্যবহের । ব্রাইওনিয়াও উপযোগী । আরোগ্যোদ্ভব অবস্থায়ও অস্ত্রের কৃত শুক না হওয়াতে অতিসার রহিবাগেলে কসফরাস উপকারী । (৮) হাইড্রো-সায়েরাস ।—উচ্চ রবে কথা বলা, অবিবত হান্ত, গান ও চিৎকার করা লক্ষণাপন্ন প্রাণে হাইড্রোসায়েরাস ফলপ্রদ । (৯) ট্রুমোনিয়ম ।—অবাস্তব কল্পনা, দিগ্‌দেহ, বা বিখণ্ডিত দেহ প্রভৃতি কল্পনা বিশিষ্ট প্রাণে ট্রুমোনিয়ম উপযোগী । (১০) বেলেডোনা ।—মস্তিষ্কের রক্ত-সঞ্চর বা মান্তিক স্কিমীর প্রদাহ সংশ্লিষ্ট টাইফয়েড জ্বরে তীব্র শিরঃশীতা, চক্ষের আরক্ততা, প্রচণ্ড প্রাণ, মস্তকেব উত্তাপ, পূর্ণ নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণে বেলেডোনা ব্যবহার্য্য । (১১) ওপিয়ম ।—তজ্রা-দোষ, অথবা পর্য্যায়ক্রমে মুহুপ্রাণ ও তজ্রা-দোষ ও খাসে ষড় ষড় শব্দ থাকিলে ওপিয়ম উপযোগী । তজ্রা-দোষের আধিক্য জন্মিয়া মস্তিষ্কের স্তব্ধতার সম্ভাবনায়ও ওপিয়ম বিশেষ ফলপ্রদ । ঔষ্ধ-রমে উপকার না দর্শিলে ল্যাকেসিস ব্যবহের হইতে পারে । (১২) আর্গিকা ।—তজ্রা-দোষ সহকারে অজ্ঞাতদ্বারে মল-মূত্র নিঃসরণ লক্ষণে আর্গিকা ব্যবহ্য করা বাইতে পারে । (১৩) কার্বো-ভেজি ।—প্রায় তজ্রা-দোষের স্তম্ভ, উদাসীনতা, বৎপরেণুনাতি অবসন্নতা, ও প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ-পরিশূভতা হস্ত-পদাদি দেহ-শাখার শীতলতা, ও উহাতে আঠা আঠা বর্ধ ; মলিনবর্ণ, ভূর্ণক্কিময় মল ; এবং ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণে টাইফয়েড জ্বরে কার্বো-ভেজিটেবিলিস পরম উপকারী । (১৪) এসিড-মিউর ।—জীবনী-শক্তির অতিশয় নিস্তেজতা ; অত্যন্ত অবসন্নতা, পেশীর শক্তি হীনতা, এবং উজ্জ্বল শয্যার পশ্চাত্তাগে সরিয়া বাওয়া, অনিচ্ছায় মল-মূত্রাদি নিঃসরণ ;



ସଂକ୍ଷେପେତ୍ତ: ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷଣେ ମିଡିଭିସିଟିକ ଏସିଡ ଉପଯୋଗୀ ।  
(୧୨)ମିକ୍ସୋନା ।—ଏହା ଯୋଗେ ନହେ,କିନ୍ତୁ ଆମେଲୋଗାୟୁନ ଅବତାସ ଶିଘ୍ର ରୋଗୀର  
ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର୍ବୀକୃତ ନା ହୁଏନେ, କୁମାରମାନ୍ଦା, ଓ ଆମ୍ବମାନ୍ଦା ଥାକିଲେ ଏବଂ ନଗେବ  
ସହିତ ଅଜ୍ଞାତ ଭୁକ୍ତ ଡ୍ରାଫ୍ ନିମିତ୍ତ ହୁଏନେ ନିଃକ୍ଷୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏନା ଥାକେ ।

ଆମାପାପାୟ ।—ବୋଗୀକେ ଉତ୍ତମ ବାୟୁମୋଦିତ ଗୃହେ ବାନ୍ଧିତେ ହୁଏନେ ।  
ରୋଗୀର ନିକଟ କୋନ ପ୍ରକାସ ଶବ୍ଦ ହୁଏତେ ଦିବେ ନା । ଉହାବ ଚକ୍ରୁତେ ସେନ  
ସ୍ବୟାମୋକ, ନା ପଡ଼େ । ଏବଂ ଶ୍ରୀତି କେମନ ବା କଟିନ ହୁଏନେ ନା । ରୋଗୀର  
ଗାତ୍ର ଓ ଗାତ୍ରବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତା ପାଦଛନ୍ନ ବାଧା ଉଚିତ । ପୁଣି ଓ ଉକ୍ତଦେଶେ ଶଯ୍ୟା-କ୍ଷତ  
ନା ଜଳେ ଶ୍ରୀନିଧିତ୍ତ ଶ୍ରେୟଶ୍ଚ ଗ୍ରାମେବ ଗାତ୍ର ବା ଗଳ ନିନ୍ଦା ଗାଧିବେ ଏବଂ ସର୍ବନା  
ପରିହାର ଓ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ କରବେ । ପ୍ରତିଦିନ ଜୈବହସ୍ତ ଜଳେ ସୁବାସିତ କାର୍ବଣିକ  
ଏସିଡ ମିଶାହିବା ଗାତ୍ର-ମାଞ୍ଜନୀ ଗୋଗୀର ଗାତ୍ର ପରିହାର କରନ୍ତା ଦିବେ  
ଏବଂ ଶ୍ରେୟଶ୍ଚ ଗ୍ରାମାବାସନା ଗୋଗୀର ମୁଖ ବୋବାହିବେ । ବୋଗେର ଶ୍ରୀରକ୍ତେ  
ଶୀତଳ ଜଳ, ଆବଶ୍ୟକେଶୀ ଗର୍ଦେବ ଜଳ, ସର୍ବେନ ପାତନା ମଞ୍ଜୁ, ଗେମନେଡ ବା ମୋଡ଼ା  
ଓଷାଟାର ପ୍ରଭୃତି ପାନୀର ଗ୍ରାମ ଅନ୍ଧା କରୁ ପଥା ଦିବେ ନା । ଶ୍ରେୟଶ୍ଚ ଶ୍ରୀଗୁଜ୍ଜି  
ହୁଏଲେ ଏକଟୁ ଶେବୁବ ବସ ଓ ଜଳ ଗ୍ରାମା ବୋଗୀର ଶୁକ୍ଳ ଗ୍ରାମା କରନ୍ତା ପ୍ରଥମ  
ପ୍ରଥମ ଗ୍ରହ, ଗାମ୍ବେବ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭୃତି ପୁଷ୍ଟିକର ତରଳ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ପୂର୍ବ ବାବହା  
କରବେ । ଗ୍ରହମାସ ଅତୀତ ହୁଏଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଗୀର ଅନ୍ତେବ କ୍ଷତ ଶୁକ୍ଳ ହୁଏନା  
ଶ୍ରୀବେବ ତାପାଂଶ ୯୮ ହୁଏଲେ ଶ୍ରୀଗାତ୍ର ଅତରଳ ଡ୍ରାଫ୍ ଆଦି ପଥା ଦିବେ । ଶ୍ରୀର  
ପୁର୍କେ ଅଗ୍ରାଦି ପଥା ଦିଲେ ଶ୍ରେୟଶ୍ଚ ବିପଦ ଘଟିବାବ ସମ୍ଭାବନା । ଏହି ରୋଗେ ପ୍ରଥମ  
ସମ୍ଭାବେବ ପର ହୁଏତେ ବୋଗୀକେ ଏକ ଆଉଟଲ ମାତ୍ରାର ଜଳ ମିଶ୍ରତ ସୁବା ଦେଓଗା  
ବାହିତେ ପାବେ । ଶ୍ରୀର ବ୍ୟବହାବେର ପବେ ଯଦି ଗ୍ରାମା ଅବିକୃତର ଆର୍ଦ୍ର, ନାଢ଼ି  
ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଗ୍ରହମାସ ଏବଂ ଗାତ୍ର ଶ୍ରୀଗ୍ରହ ଗ୍ରହ ତରଳ, ତରଳା । ଉପକାରାଦିନିତେ  
ମନେ କରବେ ହୁଏନେ । ଯଦି ଶ୍ରୀର ବିପଦୀତ କୋନ କ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାବ, ତରଳ  
ଶ୍ରୀର ସେବନ ବହିତ କରବେ । ଅବ-ସୁକ୍ତ ବାନ୍ଧିବ ଗ୍ରାମା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  
କୋନପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ ଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନହେ । ଉଦରୋପାର  
ଜଳପତୀ ଦିଲେ ଶ୍ରୀଗାତ୍ର ଅନ୍ତେବ ଉପବାସେ ବିଶେଷ ଉପକାର ଦର୍ଶେ ।

## মোহ জ্বর —টাইফস ফিবার।

টাইফস জ্বর চতুর্দশ হইতে একবিংশ দিবস ব্যাপী একপ্রকার স্পর্শ-সংক্রামক উৎকট অবস্থান জন্ম। সাধারণতঃ ইহা ব্যাপক আকারে প্রকাশ পায় এবং তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ দিবসেই নবো এই জবে গাত্রে একপ্রকার বিশেষ দীড়কা উৎপন্ন হয়। সচরাচর ইহাকে ব্রেণ-ফাবা বা মাস্তিক-জ্বর বলে। মোহ-জ্বর নামে ইহা বাঙ্গালার অজ্ঞবাদিত হইয়াছে। টাইফয়েড জ্বরের ত্রায় টাইফস জ্বর ক্রমে ক্রমে আবির্ভূত হয় না, কিন্তু সহসা আক্রমণ করে। পূর্বে ভাবতর্ষে টাইফস জ্বর অপরিজ্ঞাত ছিল, অধুনা এদেশেও এই জ্বর কখন কখন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কারণ।—টাইফস জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের শরীর হইতে উদ্ভূত এক প্রকার বিশেষ বিবেক সংক্রমণ বশতঃ এই জ্বর উৎপন্ন হয়। যে গৃহ বিস্তৃত বায়ু-সেবিত নহে তাহাতে বহুসংখ্যক লোক বাস করিলেও টাইফস জ্বরেৎ-পাদক।বহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতিবিক্রপ পরিশ্রম বা উৎকর্ষ বশতঃ শারীরিক ও মানসিক শক্তি-খর্বসমতা জন্মিলে শরীরে এই বোগ সংক্রমণের সমবিক উপযোগিতা উৎপন্ন হয়। কলতঃ মলিনতা ও অপব্যাপ্ত আহার জনিত শরীর-বিকার টাইফস জ্বরের আক্রমণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এজন্ত বড় বড় নগরের যেসকল স্থলে জল-প্রণালী বা বিস্তৃত বায়ু-সঞ্চালনের সুবন্দোবস্ত নাই তথাকার দণ্ডিত লোকেবাহ টাইফস জ্বরে আবহ আক্রান্ত হয়। দ্বার্তক, ও যুদ্ধাদির সময়ে বা তৎপরেও এই জ্বর ব্যাপক আকারে প্রোচ্ছভূত হইয়া থাকে। জনাকীর্ণতা টাইফস জ্বরেৎপাত্তব অত্যন্ত কারণ। কি সংকীর্ণ কুটীর, কি সুপ্রসস্ত অট্টালিকা, কি সৈন্যশিবির, কি আরোহী পুন অর্ণব-পোত যেখানে আতশয় জনাকীর্ণতা জন্মে সেইখানেই বায়ু-দূষিত হইয়া টাইফস জ্বর উৎপন্ন হয়। শীত-প্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ দেশেই ইহার বিশেষ প্রোচ্ছভাব দেখা যায়। শীতকালেই ইহা সমবিক তাঁর আকারে প্রকাশ পায়। কেননা শীত ঋতুতে শীত-প্রধান দেশের দরিদ্রলোকদিগকে উপযুক্ত আহার ও আচ্ছাদনাভাবে বড়ই কষ্ট পাইতে হয় এবং বহু সংখ্যক লোককে একত্র

এক গৃহে বাস করিতে হয় । নিম্ন ও অর্জস্থান অপেক্ষা উচ্চ ও পরিষ্কৃত স্থানে এই রোগের প্রাদুর্ভাব কম । টাইফস অব্যবস্থাপূর্ণ-সংক্রামক । এক ব্যক্তি হইতে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত বিষয় ইহাৰ বিশেষ উদ্দীপক কারণ । পূর্বোক্ত পূর্ববর্তী কারণ বিদ্যমান থাকিলে রক্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে সহজেই এই রোগ আক্রমণ কবে । পূর্ববর্তী কারণ বর্তমান না থাকিলে সংস্পর্শ-দোষে বিলম্বে রোগ প্রকাশ পায়, এই জন্তই বোগীর পবিচারক ও চিকিৎসক টাইফস অব্যবস্থাপূর্ণ হইতে প্রায়ই সূক্তলাভ করিতে পাবেন না । যাহারা অব্যবস্থাপূর্ণ বোগীর নিকটে থাকেন ও তাহাকে স্পর্শ করেন তাহাদিগের শরীরেই এই বিষ বিশিষ্টরূপে সংক্রামিত হয় । মধ্য মধ্য রোগীকে দেখিতে গেলে টাইফস অব্যবস্থাপূর্ণ বিষ কদাচং সংক্রামিত হইয়া থাকে । বোগীর শয্যা ও গাত্রবস্ত্রাদি সংস্পর্শেও এই অব্যবস্থাপূর্ণ হইয়া থাকে । মক্ষিকাদি সংযোগেও ইহা সংক্রামিত হয়, কিন্তু বসস্তাদি দ্বারা তত সহজ সংক্রামিত হয় না । আকাশস্থ বায়ুতে বিকীরণ হইয়া পড়িলে টাইফস অব্যবস্থাপূর্ণ বিষ বিনষ্ট হয় ।

বিধান-বিকার ।—টাইফস অব্যবস্থাপূর্ণ বড় অধিক শারীরিক বিধানের পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না । কিন্তু বক্তের বিকার সততই দেখা যায় । পেশী, শৈল্পিক ঝিল্লী, বৃক্ক, ফুসফুস, ও মস্তিষ্কেও আকাবগত বৈলক্ষণ্য জন্মে । রক্ত বিশিষ্টরূপে তবলতব হয়, এবং হয় একেবারেই সংযত হয় না, নয় হৃৎপিণ্ড ও রক্তবহা নাড়ীতে জমিয়া বড় বড় কোমল খণ্ডরূপে বিদ্যমান থাকে, ও সেই সকল খণ্ড সহজ বিগলিত হয় । পেশীগুলি, বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের পেশী কোমল ও শিথিল হয়, তৃতীয় সপ্তাহে বা তৎপরে মৃত্যু হইলে হৃৎপিণ্ডের মেদাপকর্ষও জন্মে, আমাশয় ও অন্ত্রেব শৈল্পিক ঝিল্লীর প্রদাহ ও রক্ত-সঞ্চয় উৎপন্ন হয়, কখন কখন অন্ত্রে কোমল লাসিকাও ক্ষরিত দেখা যায় । কচিং বা সমবেত ও অসমবেত গ্রন্থিগুলি বিবর্তিত হয় । কিন্তু টাইফয়েড অব্যবস্থাপূর্ণ প্রায় এই বোগে অন্ত্রে ক্ষত জন্মে না । গ্রন্থিগুলির মধ্যে যকৃৎ, প্লীহা ও লাল-গ্রন্থিই সচরাচর আক্রান্ত হইয়া থাকে । এই সকল গ্রন্থি বিবর্তিত ও কোমল হয় । কখনও বা লাল-গ্রন্থি গ্রন্থি পাকে ও গচিয়া পড়ে । মস্তিষ্কের গহ্বরে কিঞ্চিৎ রক্তাবিক্য এবং মস্তিষ্কের বিধান-তন্তুতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ বক্তপূর্ণতা দৃষ্ট হয় ।

**লক্ষণ**।—টাইফস জ্বরের পূর্বলক্ষণ অবস্থা এক হইতে দশ দিবস থাকে। অন্তর জ্বর প্রকাশ পায়। শিরঃপীড়া, ক্ষুধামান্দ্য, অন্ন অন্ন শীত, পৃষ্ঠে বোঁকনা, ঐশান্ত, ও হৃদয়গতাত্মক টাইফস জ্বরের প্রথম লক্ষণ। এই সকল পূর্বলক্ষণ দুই তিন দিবস থাকে। তৎপরে কম্প, বিবর্জিত শিরোবেদনা, ঐশান্ত ও উত্তপ্ত ত্বক্, পিপাসা, দৃষ্টির শুষ্কতা ও প্রভাশূন্যতা, নাড়ীর কোমলতা ও দ্রুততা, জিহ্বার রসহীনতা, শ্বসিত, অবসাদ, পেশীর বেদনা, এবং কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। কোন কোন রোগীর কোষ্ঠবদ্ধের পরিবর্তে অতিসার জন্মে। রোগীর আকৃতি-গত বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সে অবসর অবস্থার চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকে। তাহার মুখমণ্ডল শ্রান্ত ও নিশ্রান্ত, চক্ষু ভারাক্রান্ত, এবং গণ্ডস্থল ধূসরিত। আবহাওয়া রঞ্জিত দেখায়। জ্বর আকারের অবস্থানে জ্বরের প্রবর্তিত অবস্থায় রোগী অধিক নিম্নলিখিত নৈকৈ পূরন করিয়া থাকে, অবসন্নতা বশতঃ কথা বলিতে, জিহ্বা বাহির করিতে অথবা পাশ ফিবিতে পারে না। মুখরস-শূন্য ও পবিণ্ডক, ওষ্ঠ ও দন্ত দৃষ্টশরীরাকৃত, ত্বক্ উত্তপ্ত ও শুষ্ক এবং জিহ্বা ও হস্ত নিকম্পিত হয়।

**নাড়ী**।—নাড়ীর বেগের দ্রুততা জন্মে। জ্বরের তীব্রতানুসারে ৯০ হইতে ১৪০ বা ১৫০ বাব নাড়ী স্পন্দিত হয়। উৎকট জ্বরে চরমসীমা প্রাপ্তি পর্যন্ত নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অন্তর রোগ আরোগ্য হইবার হইলে ক্রমে ক্রমে বেগ হ্রাস পড়ে। সহসা নাড়ীর বেগের হ্রাস সঙ্কটস্থচক। ক্রমে ক্রমে বেগের হ্রাস পড়িতে পড়িতে সহসা বৃদ্ধি কোন প্রকার উপসর্গের আবির্ভাব জ্ঞাপক। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালের নাড়ীতে কোন বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয় না। তবে নাড়ীর প্রকৃতি সর্বদা একরূপ থাকে না। কখনও অস্থূলীর স্পর্শে নাড়ী সবেল ও পূর্ণ, কখনও বা সামান্য প্রচাপনে বিকৃত; আবার অল্প সময়ে বা ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ অস্থূল হইয়া যায়। কিন্তু সচরাচরই নাড়ীর সপর্শ্যায় ও বৈষম্য-দোষ বিদ্যমান থাকে।

**পীত্বাতিশয়**।—রোগের প্রাবল্ধ্যেই গাত্র-তাপ বিবর্তিত হইতে থাকে এবং ১০০° হইতে ১০৭° ডিগ্রী পর্যন্ত উন্নত হয়। তৃতীয় দিবস পর্যন্ত তাপ বৃদ্ধি পায় এবং সচরাচর ১০৫° হইতে ১০৭° ডিগ্রী পর্যন্ত বর্ধিত হয়। চতুর্থ দিবস পর্যন্ত সাত্র-তাপ, বৃদ্ধির চরমসীমায় উপনীত হয় ও তৎপরে

অল্প হ্রাস পড়ে। রোগ অধিক উৎকট হইলে প্রথম সপ্তাহের শেষে জ্বরের এক প্রকার স্বল্পবিরাম জন্মে। দ্বিতীয় সপ্তাহে গাত্রতাপ পুনরায় বৃদ্ধিতে থাকে; কিন্তু প্রায়ই প্রথম সপ্তাহের জ্বর তত বৃদ্ধি পায় না। দ্বিতীয় সপ্তাহ পরিসমাপ্তির প্রাকালে, দ্বাদশ ও চতুর্দশ দিবসের মধ্যে আবার জ্বরের স্বল্পবিরাম লক্ষিত হয়। এই স্বল্পবিরাম কি বৃহৎ, কি উৎকট, কি সাংঘাতিক সকল প্রকার অনেই দেখা যায়। রোগ আবোগ্য হইবার সম্ভাবনা জন্মিলে দ্বাদশ ও চতুর্দশ দিবসের মধ্যে গাত্রতাপ কম পড়িতে থাকে। তাপের এই হ্রাসতা বড়ই শীঘ্র শীঘ্র জন্মে, এমন কি কখন কখন চক্ষির দৃষ্টির তিন চারি ডিগ্রী কমিয়া যায়। রোগীর প্রাণ-নাশের সম্ভাবনার সম্বর গাত্র-তাপ বৃদ্ধি পায় এবং মৃত্যুর অলক্ষণ পূর্বে উহা এত বিবর্জিত হয় যে রোগ-কালে আর কখনই এতদূর বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় না। এই জ্বরে প্রাতঃকালের ও সন্ধ্যাকালের গাত্র-তাপে টাইকয়েড জ্বরের জ্বর অধিক প্রভেদ ঘুটে হয় না।

পীড়কা।—চতুর্থ হইতে সপ্তম দিবসের মধ্যে গাত্র টাইকস জ্বরের প্রকৃত-মিহ্ন উদ্ভেদ প্রকাশ পায়। বর্ণানুসারে এই সকল উদ্ভেদকে তুঁত উদ্ভেদ (মালবারি রাশ) কহে। টাইকস জ্বরের পীড়কাগুলি বিষমাকার, ধূসর অথবা স্তম্ভক তুঁতফলের বর্ণের জ্বর বর্ণবিশিষ্ট। চাপ দিলে উহার বিলীন হয় এবং স্পর্শ করিলে চর্মের উপর একটু উন্নত অহুভূত হইয়া থাকে। পীড়কা অল্প বা অধিক, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হয়। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ মিলিত হইয়াই বড় বড় উদ্ভেদ জন্মে। রোগের আক্রমণের উগ্রতানুসারেই পীড়কার বর্ণের গাঢ়তা ও সংখ্যার বহুলতা উৎপন্ন হয়। প্রথমে এই সকল পীড়কা নগিবদ্ধ; কক্ষ-প্রান্তে ও উদবোধে দেশে প্রকাশিত হয়, অনন্তর বক্ষস্থলে ও শরীর-শাখায় জন্মে। প্রথম প্রথম পীড়কাগুলি প্রচাপনে বিলীন হয়। কিন্তু দুই এক দিবসের মধ্যেই উহারাই ইটক চূর্ণের জ্বর বর্ণ ধারণ করে, তখন আর প্রচাপনে বিলীন হয় না এবং রোগের শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। কোন কোন রোগীর পীড়কা শিটিকীতেও (ডাঁশের কামড়ের জ্বর উদ্ভেদ) পলিণত হয়।

ফুসফুস।—এই জ্বরে ফুসফুস ও বায়ুনলীভূত আক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, সাবহিত হটরা উহার প্রথম অতিব্যক্তি পর্য্যবেক্ষণ করা

উচিত। কান, খাস, ও নিশ্বাসনাথি না থাকিলেও প্রতিদিন রোগীর বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করা কর্তব্য। অনেক রোগীরই দ্বিতীয় সপ্তাহে ফুসফুসের ভূমি দেশে বেশ বর্ধণ ধরনি, ও এক বা দুই ফুসফুসেরই ধন গর্ভ শব্দ, এবং তৎপরে মৈত্রিক ধরনি শুনা যায়। ফুসফুসের এইরূপ অবস্থা কান বা নিশ্বাসনাথি ব্যতীতও থাকিতে পারে। নিশ্বাসনাথি নির্গত হইলে উহার ফুসফুস-প্রদাহ বা বায়ু-নলীভুক্ত-প্রদাহেব নিশ্বাসনের সহিত সাধারণ দেখা যায়। ফুসফুস বা বায়ু-নলীর উপসর্গ জরের পবিত্বজন সময়ে হাস পড়ে কিন্তু ফুসফুসেব নিরেটতা (কনসলিডেশন) জন্মিলে আরোগ্যোন্মুখ অবস্থার পরেও উহা কিছুদিন থাকিয়া যায়। ফুসফুসেব উপসর্গ বশতঃ মৃত্যু হইলে মৃত্যুর পূর্বে ঝক্ ঝামবর্ণ, খাস প্রতিহত, ও নাড়ী ক্ষীণ হয়; এবং খাস রুদ্ধ হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়।

ব্রায়বীয় লক্ষণ।—টাইফস জরের ব্রায়বীয় লক্ষণ অতিশয় পরিহার। যোধ হয় যে এই জ্বরের বিবেক সমধিক প্রভাব ব্রায়ুমণ্ডলেই দর্শে। প্রাণ্ডি, অস্থিরতা, ও নিদ্রাহীনতা ব্রায়বীয় উপজ্বরের প্রথম লক্ষণ। তৎপরে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ও মনোভাবের বিশৃঙ্খলা জন্মে। চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে অধিকাংশ রোগীরই প্রলাপ উপস্থিত হয়। এই প্রলাপ অতীব কষ্টকর। প্রথমে রোগী নানাপ্রকার অসঙ্গত, বিশৃঙ্খল কথা বলে, লোক ও স্থান চিনিতে পারেনা, এবং তাহার কালেরও জ্ঞান থাকেনা। এই অবস্থা হইতে প্রথম প্রথম তাহার চৈতন্য জন্মান যায়। অনন্তর তাহার দৃষ্টি বিভ্রম ও প্রতি-বিভ্রম জন্মে, সে নানাপ্রকার যন্ত্রণাপ্রদ দৃশ্য দেখিতে ও কষ্টপ্রদ শব্দ শুনিতে থাকে। সে মনে কবে যে কেহ যেন প্রতিহিংসাবশতঃ তাহার অন্তঃসরণ কবিতোছে এবং সে তাহার নিকট হইতে পলাইতে বুধা চেষ্টা কবিতোছে, কখনও বা তাহার অসুভব হয় যে সে প্রকৃতকাবে কারাগৃহে আবদ্ধ হইয়াছে, কখন বা সে অনুমান করে যে কেহ যেন তাহাকে অতিশয় যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। সে একই কথা অনবরত বলে, এবং একই প্রকার অসংলগ্ন চিন্তাই নিয়ত চিন্তা কবে। সময়ে সময়ে এই প্রলাপ সন্দেহের আকার ধারণ করে। সে মনে করে যে তাহার পরিসেবকগণ তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিতে চাচ্চা করে। এই জন্ত সে ঔষধ পথ্য সেবন করিতে অসম্মত হয়। কয়েক দিনস পলে প্রথম প্রলাপ মৃদু প্রলাপে পরি-

ণত হয়। তখন বোগী হিরডাবে চিং হইয়া কুইয়া কাপন্যনিই-বিড়-বিড় করিয়া তাহার মনের কথা বলিতে থাকে। জ্বরতর রোগে প্রলাপ স্থিরিতে পরিণত হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে জিহবার কম্প ও কণ্ঠের স্পন্দন জন্মে। রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠিলে সম্যক জ্ঞানশূন্যতা বিশিষ্ট তন্ত্রাদোষ, অথবা জাগ্রত তন্ত্রা (কোমতিজিল) উপস্থিত হয়; এই প্রকার জাগ্রত তন্ত্রাদোষে বোগী হিব চক্ষে, এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে কিন্তু চারিদিকের কিছুই সে দেখিতে পায় না। কখন কখন অগ্ন্যবের জ্বার আক্ষেপ উপস্থিত হয়। এই আক্ষেপ মৃত্যুব লক্ষণ। বোগীর প্রায়ই শ্রুতি-বিকার এবং বধিরতা জন্মে। প্রলাপ প্রবল ও অনেকদিন ব্যাপী হইলে বোগী আরোগ্য লাভ করিলেও কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহাব বুদ্ধির বৈকল্য থাকিয়া যায়।

ভোগ-কাল।—উৎকট উপসর্গ উপস্থিত না হইলে টাইফস জ্বর প্রায়ই ষোল দিনের অধিক থাকে না। এই বোগে সাধারণতঃ দুই এক দিবসের মধ্যে সমস্ত লক্ষণ গুলি উপশমিত হইয়া আরোগ্যোন্মুখতার হুচনা হয়। বোগীর মৃত্যু হইলে তৃতীয় হইতে একবিংশ দিবসের মধ্যেই মুক্ত হয়। যে সকল রোগীর প্রাণনাশ হয় সচরাচর তাহাদের রোগ বার, চৌদ্দ দিন থাকে।

উপসর্গ।—এই বোগের ভোগকালে অতিসার, লাল-গ্রন্থির ক্ষীভতা ও পরিপকতা, বিসর্প; পাইমিয়া, আক্ষেপ, ও পদাঙ্গুলীর কোথ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

বিনির্গম।—টাইফস জ্বর বিনিশ্চয় কালে হাম, ফুসফুস-প্রদাহ, ও টাইফয়েড জ্বর বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হইতে পারে। ১। হান ও টাইফস জ্বরের উদ্ভেদ একই সময়ে বহির্গত হয়, এবং উভয়ের কতকটা সাদৃশ্যও আছে। কিন্তু টাইফস জ্বরের উদ্ভেদ হামের উদ্ভেদের জ্বার অর্ধ চন্দ্রাকার নহে, সুষা-রণতঃ উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার, এবং অত উন্নত নয়। হামের পূর্বে সর্দি থাকে, টাইফস জ্বরের পূর্বে সর্দি থাকেনা। হামের ভোগকাল টাইফস জ্বর অপেক্ষা অল্পদিন স্থায়ী। ২। টাইফয়েড নিউমোনিয়া বা সারিপাতিক ফুসফুস প্রদাহ ও টাইফস জ্বরের উপসর্গ স্বরূপ নিউমোনিয়ার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বোগীর ইতিবৃত্ত পরিজ্ঞাত হইলেই উভয়ের প্রভেদ নিরূপণ করিতে পারা যায়।

প্রাথমিক রোগে প্রথম হইতেই জ্বর রোগের লক্ষণ উপস্থিত হয়। অসিচ, রোগীর গায়ে এক তৃত্ত ফলের বর্ণের জ্বর বর্ণ বিশিষ্ট শীতলা বিদ্যমান থাকে না। (১) টাইফস ও টাইফয়েড জ্বরে প্রভেদ এই—টাইফস জ্বর। (১) টাইফস জ্বরের আক্রমণ-কাল অল্পকালস্থায়ী। (২) সাধারণতঃ ইহাতে কোষ্ঠ-বদ্ধ থাকে। (৩) অল্প হটতে প্রায়ই রক্তস্রাব হয়। (৪) উদ্ভেদ এক তৃত্ত ফলের বর্ণের জ্বর জ্বর বর্ণ বর্ণ হয়, উহা অক্রমণের চতুর্থ হটেতে সপ্তম দিবসের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং বিলীন হয় না। (৫) নাড়ী ও গাত্র তাপে তৃত্ত দ্বিতীয় পর্য্যন্ত ক্রমাগত বদ্ধিত হয়, তৎপর নবম দিবস পর্য্যন্ত পোর সমভাবে থাকে, অন্তর কমিতে থাকে। (৬) ভাল অবস্থার লোকের প্রায়ই টাইফস জ্বর হয় না। (৭) ইহার ভোগকাল ১৪ দিন। (৮) এই জ্বর সকল বয়সেই হইয়া থাকে। (৯) টাইফস জ্বরের প্রবর্তিত অবস্থার রোগীর গাত্র হইতে গলিত পলালের গন্ধেব জ্বর একপ্রকার দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

টাইফয়েড জ্বর।—(১) টাইফয়েড জ্বরেব আক্রমণ কাল প্রচুর ও দীর্ঘ স্থায়ী। (২) সাধারণতঃ ইহার সহিত অতিসার থাকে। (৩) সচরাচর অল্প হইতে রক্তস্রাব হয়। (৪) উদ্ভেদের বর্ণ পাটল (গোলাপী), উহা অক্রমণের সপ্তম হইতে চতুর্দশ দিবসের মধ্যে প্রকাশ পায়, এবং একবার প্রকাশিত ও একবার বিলীন হয়। (৫) নাড়ী ও গাত্র তাপের সমতা থাকে না; সাধারণতঃ দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত উভয়ের বৃদ্ধি থাকে; টাইফস জ্বর অপেক্ষা টাইফয়েড জ্বরে প্রাতে ও সায়াত্রে নাড়ী ও গাত্র তাপের অধিকতর বিভিন্নতা থাকে। (৬) ৫ দিবসলোক অপেক্ষা ভাল অবস্থার লোকেরই এই জ্বর অধিক হয়। (৭) টাইফয়েড জ্বরের ভোগকাল প্রায় ২১ দিবস। (৮) টাইফয়েড জ্বর প্রায়ই রালকদিগকে বা চল্লিশ বৎসরের অধিকবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করেনা। (৯) টাইফয়েড জ্বরে বোগীর গায়ে বিশেষ কোন দুর্গন্ধ থাকে না।

প্রস্তাব।—এই রোগের ভাবীফল যুরকদিগের পক্ষে অপ্রোক্ষাক্ষক হয়কুল, কিন্তু রুগদিগের পক্ষে বিপদজনক। টাইফস জ্বরে বাল্যকালে হইতে বার্ষিক পর্য্যন্ত বয়সের বৃদ্ধি অস্থায়ী হইয়া সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে হয়। বয়সের ন্যূন বয়স্ক রোগীদিগের মধ্যে শতকরা ৫; বয়স ৩ কুড়ি বৎসর



বসন্তের মধ্যে শতকরা ৮-৯; কুড়ি ও ত্রিশ বৎসরের মধ্যে শতকরা ১৫.৬; ত্রিশ ও চল্লিশ বৎসরের মধ্যে শতকরা ২১.৫; চল্লিশ ও পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৪২; পঞ্চাশ বৎসরে উর্দ্ধে শতকরা ৬৬.৬ জনের মৃত্যু হয়। ক্রীপকাল কার্যশীল লোক অপেক্ষা মূলকাল অল্প প্রকৃতির লোকদিগকে মৃত্যুর অধিক সম্ভাবনা। অতিরিক্ত সুরাপারীদিগের আবোগোষ সম্ভাবনা অল্প। অতিরিক্ত পবিত্রমে শ্রান্ত ও মানসিক বা শারীরিক অবসাদে অবসর ব্যক্তিগণ টাইফস অবাক্রান্ত হইলে সবল ও মতেজ লোক অপেক্ষা সহজে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। ১০৭° বা ১০৮° তাপাংশ গাত্রতাপ; প্রথম সপ্তাহে অবিরত গাত্রতাপের বৃদ্ধি; তৃতীয় সপ্তাহের প্রারম্ভে সহসা গাত্রতাপের অতি-শয় আধিক্য; হৃদয়, ক্রান্ত, ১৫০ বা ততোধিক স্পন্দন বিশিষ্ট নাড়ী; বিষম-গতি নাড়ী; পীড়কাল অধিক প্রাচুর্য ও প্রচাপনে তাহার অপরিবর্তনীয়তা; মূত্র বর্ণ ঘূর্ণাকৃতি; হৃদয়া প্রবল প্রলাপ; অবিরত অনিদ্রা; তন্দ্রা-দোষ; আগ্রতন্দ্রা; শব্দা খুঁটন; অত্যন্ত অবসন্নতা; আক্ষেপ; হৃদয়া অতিসার; মূন-মূন প্রদাহ, বায়ু-নলীভুক্ত শদাহাদি উৎকট উপসর্গ টাইফস জ্বরে অন্তত লক্ষণ।

সম্প্রাপ্তি।—ডাঃ বুচনান বলেন যে এক প্রকার বিমিশ্র (অরগ্যানিক) বিবাক্ত পদার্থ হইতে টাইফস জ্ব উৎপন্ন হয়। এই বিবাক্ত পদার্থ বিসমানিত হইয়া আবার নূতন বিষ উদ্ভব করে। এতদ্বারা শরীরের অণুলাল বিশিষ্ট তরল পদার্থের ও বিধান-তত্ত্ব রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এবং সেই পরিবর্তন বশতই রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়। যদিও এই রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্যক্রূপে জানা যায় নাই; কিন্তু রোগীর রক্ত ও মূত্রের বৈলক্ষণ্য দৃষ্টে শরীরের অণুলালিক পদার্থে ও বিধান-তত্ত্বে যে এই প্রকার রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। টাইফস জ্বরের বিষ-দোষ বিবন্ধন প্রথমে রক্তের অন্তর্দাহ ও ক্রহী-কর্কহ শক্তির ব্যতিক্রম হয় এবং পরিপাক-পথ ও রক্তের মধ্যে শরীর রক্তার্থে প্রতিদিন স্বভাবতঃ পরস্পর যে তরল পদার্থের বিনিময় হইয়া থাকে তাহার ব্যাঘাত জন্মে। তিনি অনুমান করেন যে এমোনিয়া বা এমোনিয়া সংস্থি কোন মিশ্র পদার্থ টাইফস জ্বরের প্রকৃত বিষ। ডাঃ রিচার্ডসন বলেন যে টাইফস জ্বরগ্রস্ত একজন রোগীকে তিনি জীবিত অবস্থায় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া

ছিলেন এবং তাহাতে অতিরিক্ত এসোনিয়ার বিদ্যমানতার ইম্পট লক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। রোগীর খাসে অল্পলিপিত কাচ ক্রোমাইড অক্স এসোনিয়ার দানার সমাচ্ছন্ন; আরক্ত লিটমস কাগজ পুনরায় নীলবর্ণ; এবং শোণিত, স্নায়ু শোণিত এসোনিয়ার অল্প প্রবণ মিশ্রিত করিলে যেরূপ রক্তাণু সকল বিকৃত, সংবত, ও কিরণপরিমাণে প্রবীভূত হয় ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল।

চিকিৎসা।—ব্যাণ্টিসিয়া, ব্রাইওনিয়া, বেলেডোনা, হাইওসায়েরমাস, ওশিরম, মিউরিয়েটিক এসিড, রসটক্স, ফসফরাস, ফসফরিক এসিড, এপিগ ও টেরেবিন্থিনা টাইকস জ্বরের প্রধান ঔষধ।

এই জ্বরের প্রথম সপ্তাহ অতীত হইবার পূর্বে ব্যাণ্টিসিয়া প্রয়োগ করিয়া দেওয়া উচিত। যদি ব্যাণ্টিসিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার না দর্শে অথবা রোগের প্রবর্তিত অবস্থায় চিকিৎসা আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে রোগীর নিম্নলিখিত তিন প্রকার অবস্থার একপ্রকার অবস্থা বিদ্যমান দেখা যায়। (১) প্রথম প্রকারে শিরঃপীড়া প্রধান লক্ষণ থাকে, যদি অষ্টম দিবসেও উষ্ণতা হাস না পড়ে, অবিকৃত প্রলাপ উপস্থিত হয় এবং মস্তকে রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে বেলেডোনা সেবন করাইলে উপকার দর্শে। রক্তিক-লক্ষণ অধিক প্রবল আকারের না হইলে বেলেডোনার পরিবর্তে হাইয়োসায়েরমাস উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু প্রলাপের অত্যন্ত উগ্রতা থাকিলে ট্রোমোনিয়ম ব্যবহার। তজ্জা না অট্টেজ লক্ষণে ওপিয়াম উপযোগী। অতিশয় অস্থিরতা, অসম্পূর্ণ, কৃষ্ণ প্রভৃতি লক্ষণে কেহ কেহ এগেরিনিয়ম ব্যবহার করিতে বলেন। (২) দ্বিতীয় প্রকারের রোগীদিগের দ্বারবীর অবসাদই প্রধান লক্ষণ, এতৎসহকারে অসম্যাক জ্বর বা রক্তের বিকৃত হইবার লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থার ফসফরিক এসিড প্রয়োগ। দ্বারবীর অবসাদের অত্যন্ত আধিক্য থাকিলে ফসফরাস ব্যবহার। ফসফরাস দ্বারা অতিশয় বিপর্যয় অবস্থারও প্রাপ্তকর্তা হইতে পারে। (৩) তৃতীয় অবস্থায় রক্তের বিকৃতি ও অরলক্ষণ প্রথম হইতেই প্রবল থাকে। রোগের উগ্রতাহেতু মিউরিয়েটিক এসিড, রসটক্স, ও আর্সেনিক এই অবস্থার প্রধান ঔষধ।

## প্রধান প্রধান ঔষধের লক্ষণ ।

(১) ব্যাপ্টিসিয়া ।—রোগের আরম্ভে অভ্যন্ত শিরোবেদনা; গায়ে জ্বালাবর তীব্র উত্তাপ; আরক্ত-প্রস্রাব, কপিল লোপাকৃত, পরিণত জিহ্বা; তীব্র অস্পষ্ট কথা; মুখমণ্ডলের লোহিত, ধূসরবর্ণ, নিশ্চল-দৃষ্টি; উদরোচ্চ দেশে শূন্যতা অনুভব, পেশীতে স্পর্শ-বেদ; মনোভাবের বিশৃঙ্খলা; শরীর বিখণ্ডিত অনুভব, ও সেই সকল খণ্ড একত্রিত করিবার জন্য ক্রিয়া চেষ্টা; উদার্ত, বা হুপি, চেষ্টা করিয়া উঠা হইতে রোগীকে আশ্রিত করিতে হয়; অতিশয় দুর্বলতা ও দ্রাব্যীয় অবসন্নতা;—এই সকল লক্ষণে ব্যাপ্টিসিয়া উপযোগী । (২) ব্রাইওনিয়া ।—অতীব, প্রচাপনবৎ শিরোবেদন, নড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি; রাত্রিতে প্রলাপ; বিষয়-কার্য সম্পর্কীয় অসম্বন্ধ কথা; অস্থির নিদ্রা, কঁকো করা; কোষ্ঠবদ্ধ; অথবা বোগেব্ প্রবলিত অবস্থায় শুষ্ক, কপিল জিহ্বা, হৃষ, ক্রত, বা দীর্ঘনিশ্বাসসংযুক্ত শ্বাস; অজ-কম্প, অতিশয় দুর্বলতা; অতিশক্তির ক্ষীণতা; উদবেব ক্ষীণতা; শুষ্ককাস; নিদ্রাবলী; এই সকল লক্ষণে ব্রাইওনিয়া ব্যবহের । (৩) বেলেডোনা ।—টাইকস জ্বরের আরম্ভাবস্থার সময়ে সময়ে, মস্তিষ্কের প্রবল রক্ত-সঞ্চয়; তীব্র শিরোভাড়া, ও প্রচণ্ড প্রলাপ; মুখাকৃতির আরক্ততা; চকুর আরক্ততা ও প্রবল দৃষ্টি, প্রসারিত কনীনিকা; জিহ্বার আরক্ততা, পরিণততা, ও নিক-স্পন্দ; অস্থির নিদ্রা, অপ্রকালহারী নিদ্রা হইতে বার বার প্রবলভাবে চমকিত হইয়া উঠা; এবং লালাগ্রন্থির দৃঢ়তা ও ক্ষীণতা লক্ষণে বেলেডোনা প্রযুক্ত । (৪) রসটক্স ।—উত্তেজোৎপন্ন অবস্থায়ই রসটক্স বিশেষ উপযোগী । উত্তেজ কামড়ের দ্বারা উত্তেজ; ওষাভ ও হুপি, অর্ধবৃত্তিত চক্রে, চুপ করিয়া চিত হইয়া পড়িয়া থাকে; অতিশয় দুর্বলতা ও অবসন্নতা; আতিশয়িক মল, অজকম্প, তল ও অনার্ত গাত্র; কপিল, পরিণত, উত্তপ্ত, অতিশয় আক্রান্তে নিঃসারিত জিহ্বা; অস্পষ্ট মুহু প্রলাপবাক; কণ্ঠ-কুরণ; দুর্বল, ক্রত, বা অনিশ্চিত সবিরাগ নাড়ী; এবং অতি-শক্তিব-ক্ষাণত রসটক্সের প্রয়োগলক্ষণ । (৫) ওপিয়াম ।—রোগের উৎকট অবস্থায় প্রসিদ্ধ উদ্ভা-দেব, আকৃষ্ট কনীনিকা, মলির লোহিত মুখমণ্ডল, দীর্ঘ ও অনিশ্চিত শ্বাস, অনিশ্চিত বা

সপ্যার নাড়ী লক্ষণে ওশিয়ম ব্যবহৃত। অপ্রত তত্ত্ব। (কোমতিজিন) লক্ষণেও এই ঔষধ প্রয়োজ্য। (৬) হাইওসায়েরাস।—প্রাণ ইজির-বিস্মে পরিণত হইলে এবং ভয় বা হতভম্বক করনা থাকিলে, ও রোগী পলায়নের চেষ্টা করিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। (৭) মিউরিয়েটিক-এসিড।—রক্তের বিষহৃষ্টতা নিবন্ধন শরীরের পেশীর শক্তি-লোপ; চর্মের ককতা, পরস্পর্শতা ও শীতলতা; দ্রুত ও ক্ষীণনাড়ী, মুহুপ্রাণ, লালাস্রাব, পলম্বাহ ক্ষত হইতে দুর্গন্ধ নিঃসরণ প্রভৃতি এই ঔষধের লক্ষণ। অপর, পিপাসার শাস্তির জন্য দশ ফোটা মিউরিয়েটিক এসিড চাবি আউজ জলে মিশ্রিত করিয়া উত্তম অল্প পানীর প্রস্তুত পূর্বক দুই ড্রাম মাত্রার ব্যবহা করা যাইতে পারে। (৮) আর্সেনিক।—অন্তঃপ্রবিষ্ট মুখমণ্ডল, নিঃশ্বাস নরন, শুষ্ক ও বিদারিত দ্বিত্ব, দুনিবার পিপাসা, অনৈচ্ছিক অতিসারাদি লক্ষণে আর্সেনিক ব্যবহৃত। (৯) ফসফরাস।—হৃদহৃদের উপসর্গে, হৃদকাস, হৃদহৃদের ভূমিদেহে কেশ-ঘর্ষণবৎ ধ্বনি, হৃদধ্বাস, অঙ্গুলীর আঘাতে ঘন-গর্ভ শব্দ, এবং হৃদহৃদ-বিধানের নিরেটতা লক্ষণে ফসফরাস প্রয়োগ করা যায়। (১০) ফসফরিক এসিড।—সম্পূর্ণ উদাসীনতা; জীবনী-শক্তির অতিশয় অবলম্বতা; উচ্চ আটোপ ও অন্ত-কূজন; অনিচ্ছায় পাতলা জলবৎ মলস্রাব; অন্ত হইতে রক্তস্রাব; গায়ে কামিমা; দুর্বল, ক্ষুদ্র ও বৈষম্য-দোষ বিশিষ্ট নাড়ী এই ঔষধ প্রয়োগের লক্ষণ। (১১) এপিস।—মূত্রে অধিক পরিমাণে অশু-লাল (এম্বুয়েন) থাকিলে এপিস ব্যবহৃত। (১২) টেরেবিছিনা।—রক্তমূত্রে টেরেবিছিনা উপযোগী। (১৩) সিকোনা।—আরোগ্যোদ্ধার অবস্থার অধিক দুর্বলতা ও অগ্নিমাত্রা থাকিলে, অথবা মলের সহিত অজীর্ণ ভুক্তভব্য নির্গত হইলে চায়না ব্যবহৃত।

উপসর্গ।—টাইফাস জ্বরে হৃদহৃদের উপসর্গে ফসফরাস কলপ্রদ, এতদ্বারা স্বপ্নিণ্ডের মেদাপকর্ষণও নিবারিত হয়। মূত্রেদোষ বশতঃ এই রোগে আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া থাকে, সাধারণতঃ আর্সেনিক এই আক্ষেপে উপযোগী। লালাগ্রহি ও গ্রীবার প্রদাহিত ক্ষীততা আর একটা গুরুতর উপসর্গ, বিনআইয়োডাইড অথবা মাকুরি ১ম ক্রমের বিচূর্ণ সেবনে উহা নিবারিত হয়।

পথ্যাপথ্য ।—এই অবগ্রস্ত রোগীর বিশেষরূপে পরিচর্যা করা আবশ্যিক । রোগীর বাসগৃহ পরিচ্ছন্ন, প্রশস্ত ও উত্তমরূপে বায়ুসেবিত হওয়া উচিত । পবিধেয় ও শয্যাবস্ত্র ঘন ঘন পরিবর্তন করিয়া দেওয়া কর্তব্য । রক্তসঞ্চয় ও শয্যাকৃত নিবারণার্থ বারংবার রোগীর অবস্থান পরিবর্তন করিয়া দেওয়া অতীব প্রয়োজনীয় । রোগের প্রথম অবস্থার হ্রক যখন ক্লক ও উত্তপ্ত থাকে, তখন ওয়েট প্যাক্ ( আর্দ্রবস্ত্রাবরণ ) দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে । আহার ও পেষ অল্প অল্প পরিমাণে বারংবার নির্দ্ধারিত সময়ে দেওয়া বিহিত । কলমিশ্রিত হুন্স, চা, মাংসেব কাথ প্রভৃতি পুষ্টিকর পথ্য প্রথম হইতেই অল্প অল্প করিয়া দেওয়া কর্তব্য । নিত্যস্থ অবসন্নতা বা রক্তসঞ্চালনের ক্ষীণতা প্রকাশ পাইলে কোন মৃদুবীর্য স্রবা বা ত্রাজী ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । রোগী আহার গ্রহণে অসমর্থ হইলে বস্তি প্রয়োগ দ্বারা পথ্য প্রদান করা আবশ্যিক । কলরবপূর্ণ স্থানে রোগীর কণে ভূলা দিয়া রাখা বা উহাকে স্থানান্তরিত করা ভাল । প্রতিদিন অন্ততঃ এক এক বার ঈষৎক জলে গামছা ভিজাইয়া রোগীর সর্কশরীর মোছাইয়া দেওয়া উচিত । বিশেষ সাবধানে রোগীকে পর্যবেক্ষণ করা কর্তব্য যেন সে অজ্ঞানাবস্থার স্থানান্তরিত হইতে চেষ্টা না করিতে পারে । সংক্রমণ নিবারণার্থ কণ ব্যক্তির বস্ত্রাদি ক্লোরাইড্ অব্লাইম্ মিশ্রিত জলে ধৌত করিবে এবং উহার গাত্র মার্জনার্থে যে জল ব্যবহার করিবে তাহার ৫ ছটাক পরিমাণ জলে ৫ বিলু বিপ্লক কার্কালিক এসিড মিশাইয়া লইবে ।

স্বাধারা রোগীর শুশ্রূষা করিবেন তাহারা যেন রোগীর নাসিকা হইতে নির্গত বায়ু অথবা শয্যাবস্ত্র পরিবর্তন সময়ে উহা হইতে নির্গত বাষ্প গ্রহণ না করেন । টাইফস্ জ্বর আক্রমণের আশঙ্কা জন্মিলে উহার প্রতিষেধক ঔষধ হাইয়েনোগেনোস্ ও ব্যাপটিসিয়া ব্যবহার, বিপ্লক বায়ু সেবন এবং পুষ্টিকর আহার গ্রহণ করা উচিত ।

## (৬) অভিশ্রাস জ্বর—আর্ডেন্ট অর সঃন-ফিবার।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রচুর স্বর্ষ্যোত্তাপে যে প্রচণ্ড সত্ত্ব জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাকেই অভিশ্রাস জ্বর বলে। কেহ কেহ ইহাকে এক প্রকার অর্জুণাত (সঃন-ট্রোক) বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই জ্বর সহসা শীতানুভব সহকারে উপস্থিত হয়। ইহাতে সাতিশর শিবঃপীড়া, শিরোগুণন, অত্যন্ত গাত্রোত্তাপ, পিপাসা, শব্দদেশের শিবাম্পন্দ, অস্থিভতা, বমনেচ্ছা ও পিত্ত বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং নাড়ী দ্রুতগামী ও সবল, জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ হয়। প্রায় ৬০ ঘটিকাব পরে, হয় রোগ উপশম পাইতে থাকে নর অট্টেতন্ত উপস্থিত হইয়া বোগীব মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা।—নাড়ীর অত্যন্ত অবসন্নতা ও মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবতাদি লক্ষণে ক্যাম্পফর ছই বিস্মু মাত্রায় ১৫ মিনিট অন্তর, শবীর ঘর্ম্মাক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এক একবার দিবে। মস্তকে অত্যন্ত বেদনা ও অকস্মাৎ চৈতন্তলোপ লক্ষণে গ্লানয়েন ব্যবহা করিবে। মুখমণ্ডলের আবদ্ধতা ও প্রলাপাদি মস্তকে রক্ত-সঞ্চয়ের লক্ষণে বেলেডোনা উপযোগী। আক্ষেপাদি জন্মিলে হাইয়োসায়েরমাস ব্যবহেয়। ডাঃ হিউজ বলেন যে এই বোগে গ্লানয়েন অমোষ। কেবল মস্তকে রক্ত-সঞ্চয় হইলেই তিনি বেলেডোনা ব্যবহার করিতে ব্যবহা দেন।

## (৭) স্মৃতিক জ্বর—পিউয়ারপারাল ফিবার।

প্রসবান্তে এই জ্বর উৎপন্ন হয়। জবাযুক্তিত অমরাব (ফুলের) ছিন্নাংশ প্রভৃতি গলিত পদার্থ দ্বারা রক্ত দূষিত হইয়া ইহা প্রকাশ পায়। স্মৃতিকাজ্বর সন্নিপাত জ্বরের প্রণীভূক্ত। প্রসবের পর যদি কস্ম, গাত্রোত্তাপ ও ঘর্ম্ম-বস্থা যথানিয়মে উপস্থিত হইয়া ঘর্ম্মশ্রাবের পর বোগিনী স্বচ্ছন্দতা অমুভব করে এবং তাহার স্তন স্ফীত হয় ও প্রসবান্তিক শ্রাব বিমুক্ত ভাবে নিঃসৃত হইতে থাকে তাহা হইলে কোন আশঙ্ক্য কারণ থাকে না, প্রসবান্তিক জ্বর

সম্ভবতঃ পরবর্ণিত লক্ষণের পরিণত হয়। কিন্তু যদি ঘর্ষ নিঃসরণের পরেও জ্বর উপশমিত না হয়, অপিচ, স্তন কোমল ও ক্ষুদ্র হয়, প্রসবাত্তিক আশ্রাব নিঃসরণ হ্রাস পড়ে অথবা একেবারেই রুদ্ধ হইয়া যায় এবং নাড়ীর স্পন্দন প্রতিমিনিটে ১০০ বাব হইতে থাকে তবে হৃতিকাজর হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা জন্মিতে পারে। এতৎসহকাবে শারীরিক শক্তির অবসন্নতা, শ্বাসকষ্ট ও স্তম্ভরোধ থাকিলে নিশ্চয়ই হৃতিকাজর বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। নিম্নোদরে বেদনা ও স্পর্শদ্রব, মলিন জিহ্বা ও তুর্গন্ধি নিশ্বাস প্রশ্বাস, মলিন মুখমণ্ডল এবং উদরানয় এই জরের সুস্পষ্ট লক্ষণ। হৃতিকাজর স্পর্শ-সংক্রামক। ধাত্রী দ্বারা এক প্রসূতি হইতে অল্প প্রসূতিতে সংক্রামিত হইতে পারে।

চিকিৎসা।—এই জরে প্রথমেই একোনাইট ব্যবহৃত হয়; মস্তিষ্ক-লক্ষণ না থাকিলে কেবল এই ঔষধেই জ্বর আরোগ্য হয়। স্তনের ক্ষীণতা ও যাতনা এবং বক্ষঃস্থলে বেদনাদি লক্ষণ থাকিলে ব্রাইয়োনিয়া; মস্তকে রক্তসঞ্চয় বশতঃ শিশুপীড়া, অত্যন্ত অস্থি-বতা, মানসিক যন্ত্রণা, অন্ধিতারের পরিবর্তনাদি প্রলাপেব পূর্ক লক্ষণে বেলেডোনা ও উহার সহিত মধ্যে মধ্যে পর্যায়ক্রমে একোনাইট ব্যবহার্য। জ্বর-লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইলে একোনাইটের পরিবর্তে, ব্যাপ্টিসিয়া ও অল্প-লক্ষণ থাকিলে বেলেডোনার পরিবর্তে রসটক্স ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। রোগেব প্রবর্তিত অবস্থায় মারকুরিয়স, হাইড্রোসায়েনাস, ট্র্যামোনিয়ন, ওপিয়ম, ভেরেট্রুম-ভিরিডি, ফসফরিক এসিড, আর্সেনিক, ব্রাইয়োনিয়া, রসটক্স, মল্লভমিকা, ল্যাকেসিন, কলোসিস্থ আদি ঔষধ লক্ষণানুসারে আবশ্যকীয় হইতে পারে।

পথ্যাপথ্য।—রোগীকে বারংবার শীতল জলপান করিতে দিবে। যবেব মণ্ড ও দুগ্ধাদি পুষ্টিকর লঘুপথ্য ব্যবস্থা করিবে। উষ্ণ জল পান করিলে বমন উপশমিত হইতে পারে। ঈষদ্ভক্ষ জলে গামছা ভিজাইয়া মধ্যে মধ্যে গা মোছাইয়া দেওয়া উচিত। নিম্নোদরে ক্ষীণতা ও বেদনা থাকিলে, ত্বসির উষ্ণ পোন্টিশ প্রয়োগ করা কর্তব্য।

## [৮] দুহু জ্বর—মিষ্ক-ফিবার।

সন্ধান প্রাপ্ত হইবার পরে দুহুজ্বর হইতে আরম্ভ হইলে এই জ্বর উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ প্রসবের ২৪ ঘটিকা পরে দুহু প্রবাহিত হয়, কিন্তু কোন কোন প্রসূতির বিশেষতঃ প্রসবান্তে শীত লাগিলে দুহু নিঃসরণে বিলম্ব হইয়া কম্প, গাত্রোত্তাপ, ক্রতনাড়ী, স্তনবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সময়ে সময়ে এই প্রকাবের জ্বরে গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্বেদ উৎপন্ন হয় এবং উহাতে কণ্টক-ভেদন যাতনা ও কণ্ডুয়ন থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম হয়।

• চিকিৎসা।—জ্বরের প্রথম অবস্থায় শীত ও কম্প লক্ষণে চায়না বা ভিরেট্রম-ভিরিডি ব্যবহেয়। কিন্তু শীত ও কম্প না থাকিয়া গাত্রের রুদ্ধতা, উত্তাপ; পিপাসা এবং অস্থিরতা থাকিলে একোনাইট উপযোগী। ঘর্ম নিঃসরণ হইতে আরম্ভ হইলে ও দুর্বলতা থাকিলে ফসফরিক এসিড ব্যবস্থা কর্তব্য।•

পথ্যাপথ্য।—অন্নমণ্ড, আবাক্রট, সাগু বা ববের মণ্ড প্রভৃতি ঈষদুষ্ণ তরল পথ্য ব্যবহেয়। মানসিক উত্তেজনা পরিত্যজ্য।

## [৯] পৌনঃপুনিক জ্বর—রিল্যাপ্সিং ফিবার।

এই জ্বরকে দুর্ভিক্ষ জ্বরও বলে। পূর্বে ভারতবর্ষে এই জ্বর ছিল না, কিন্তু একগু মূগ্ধে মধ্যে ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ব্যাপক আকারেই ইহা আক্রমণ করে এবং পূর্বলক্ষণ ব্যতীত সহসা উপস্থিত হয়।

লক্ষণ।—পৌনঃপুনিক জ্বরের প্রারম্ভে শীত, শিরঃপীড়া, পৃষ্ঠে ও অঙ্গে বেদনা এবং অবসন্নতা লক্ষণ প্রকাশ পায়। হুই তিন ঘটিকা এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিয়া সহসা গাত্র উত্তপ্ত ও রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং শিরোবেদনা ও গাত্রবেদনা বৃদ্ধি পায় এবং পিপাসা অন্বে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে ঘর্ম হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে রোগের লক্ষণ সকল উপশান্ত হয় না। এই জ্বরে চর্মে কোন প্রকার পীড়কা উৎপন্ন হয় না,



কিন্তু সহসা বা ক্রমে ক্রমে পাণ্ডু প্রকাশ পায়। ইহাতে গাত্রতাপ ১০৪ হইতে ১০৮ অংশ এবং নাড়ীর স্পন্দন প্রতিমিনিটে ১১০ হইতে ১২০ বার হয়। প্রথমতঃ জিহ্বা আর্দ্র ও গীতবর্ণ নেপায়িত থাকে, পরে শুষ্ক ও মধ্যস্থলে কণিশবর্ণ হয়। এই জ্বরে সাধারণতঃ কোষ্ঠরুদ্ধ থাকে। শ্রীহা ও যকৃৎ প্রদেশে বেদনা, স্পর্শ-দ্বেষ ও বিবর্দ্ধন এবং মস্তক ও গাত্রে তীব্র বেদনা অমুভূত হয়। কিন্তু কদাচিত্তে প্রলাপ প্রকাশ পায়। সচবাচর বিবমিষা ও বমন লক্ষণ থাকে, এবং হরিষণ পিত্ত বমন হয়। উৎকট বোগে কৃষ্ণবর্ণ রক্ত ও বমন হয়।

প্রথম হইতে সপ্তম দিবসেব মধ্যে সহসা সমুদায় লক্ষণ বিলোপ পায় এবং অতিশয় ঘর্ম হয়। সময়ে সময়েবা উদরাময় জ্বরে এবং নাসিকা ও অন্ত্রাদি হইতে রক্তস্রাব হয়। অতঃপব কয়েক দিন পর্যান্ত জ্বর লক্ষণ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত থাকে, জিহ্বা পবিত্রত ও ক্ষুধা প্রত্যাগত হয় এবং বোগী আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করে। এ সময় নাড়ী স্বাভাবিক অপেক্ষা মন্দবেগ বিশিষ্ট দৃষ্ট হয়। অনন্তর ৬/৭ দিন পবে অর্থাৎ চতুর্দশ দিবসে অকস্মাৎ সমুদায় লক্ষণ পুনরায় প্রকাশ পায়। এই দ্বিতীয় আক্রমণ ও হইতে ৫ দিন বিদ্যমান থাকে, আবার ইঠাৎ জ্বর ছাড়িয়া যায়। কখন কখন তিন চারি বার এই প্রকার পুনঃ পুনঃ জ্বরের আক্রমণ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই এই জ্বকে পৌনঃপুনিক জ্বর বলে। রোগ উপশমিত না হইলে অনিবার্য বমন, চূর্ম্ম্য পিপাসা, অতিক্রান্তনাড়ী, পাণ্ডু ও প্রলাপ উপস্থিত হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়। এই জ্বরের পরিণামে ফুসফুস-প্রদাহ, বায়ুনলী-ভুজপ্রদাহ, রক্তস্রাব, অত্যন্ত গাত্রবেদনা, চক্ষুপ্রদাহ, মুত্র-শিথোর বাধি, গর্ভস্রাব, গলাবেদনা প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে। গর্তিগী-দ্বিগ্নেয় এই জ্বর হইলে প্রায়ই গর্ভপাত ও গর্ভস্থসন্তানের প্রাণ বিনষ্ট হয়।

অনুবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্টি করিলে পৌনঃপুনিক জ্বরগ্রস্ত বোগীর রক্তে ও লালার এক প্রকার জীবিত কীটাত্ম দেখা যায়। এই সকল কীটাত্ম হস্ত হস্ত সূত্রের স্তায়। ইহাদিগকে স্পিরিলা বলে। জ্বরের প্রবর্তিত অবস্থায়ই কেবল রোগীর রক্তে উহারা প্রত্যক্ষ হয়।

কারণ।—অনাহার ও অন্নাহারই এই রোগ উৎপন্ন হইবার প্রধান কারণ। কিন্তু অজ্ঞাত জ্বরের স্তায় জনতা, বিশুদ্ধ বায়ুসেবনবিহীনতা এবং অজ্ঞাত অস্বাস্থ্যকর কারণ বশতঃ এই জ্বরও বর্দ্ধিত হয়। একবার উৎপন্ন

হইলে অনাহার-পীড়িত ব্যক্তি ভিন্ন অল্প লোকদিগকেও আক্রমণ করিয়া থাকে । সুতরাং ইহা স্পর্শ-সংক্রামক । বিষ গ্রহণের পাঁচ হইতে নয়দিবসের মধ্যে ইহা প্রকাশ পায় ।

**বিনির্গয় ।**—প্রথমাবস্থায় পৌনঃপুনিক জ্বর অত্যন্ত জ্বর বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পাবে । কিন্তু সহসা রোগের আক্রমণ, সত্ত্বর জ্বরের বৃদ্ধি, তৃতীয় বা চতুর্থদিবসে প্রচুর ঘর্ম, পেশীর ও সন্ধিস্থলের বেদনা, এবং কয়েকদিন বিরামের পরে পুনরায় পূর্বলক্ষণাপন্ন জ্বরের আবির্ভাব, এইগুলি ইহার বিশেষ বিনিশ্চয় লক্ষণ । সামান্য সন্তত জ্বরের সহিত ইহার প্রভেদ এইবে সামান্য সন্তত জ্বরে গাত্র-তাপের এত আতিশয্য ও নাড়ীর স্পন্দনের এত আধিক্য, এবং পেশীর এপ্রকার তীব্র বেদনা থাকেনা । স্বল্পবিরাম জ্বরের স্থায় পৌনঃপুনিক জ্বরে স্বল্পবিরাম লক্ষিত হয়না । টাইফস ও টাইফয়েড জ্বরের স্থায় ইহাতে রোগীর গাত্রে পোড়কা উৎপন্ন হয়না ও মানসিক বৈলক্ষণ্য জন্মেনা ।

**প্রস্তান ।**—এইরোগে শতকরা দুই চারি জনের মৃত্যু হইয়া থাকে । সাধারণতঃ নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, ডিসেন্টারি প্রভৃতি উপসর্গ বশতই মৃত্যু হয় । কাহার কাহারও মূত্রের ইউরিনা নামক উপাদান সম্যক্রূপে নিঃসৃত নাহওয়াতে আক্ষেপ উপস্থিত হইয়া ও তন্দ্রা-দোষ জন্মিয়া প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে । আকস্মিক মূচ্ছা জন্মিয়াও কখন কখন মৃত্যু হয় ।

**চিকিৎসা ।**—পৌনঃপুনিক জ্বরে ব্রাইয়োনিয়া ১২, রসটক্স ১২, ও ব্যাপ্টিসিয়া ১ বিশেষ ফলপ্রদ । সঞ্চালনে গাত্রবেদনা বৃদ্ধি পাইলে ব্রাইয়োনিয়া এবং সঞ্চালনে বেদনা হ্রাস পড়িলে রসটক্স একমাত্রা প্রতিদিন প্রাতে ব্যবস্থেয় । পাকাশয়িক লক্ষণ থাকিলে ব্যাপ্টিসিয়া ব্যবহার্য্য । ব্রাইয়োনিয়া বা রসটক্স প্রযোগে বেদনা উপশমিত না হইলে ইউপেটোরিয়ম-পারফোলিয়েটম ব্যবস্থা করা কর্তব্য । পুনরাক্রমণ নিবারণার্থ হাইপোসলফাইট-অব-সোডা দিনে তিনবার ব্যবস্থেয় । ডাঃ কিড্ আয়ারল্যাণ্ডে এই রোগগ্রস্ত অনেকগুলি রোগী চিকিৎসা করিয়াছিলেন । তিনি বিবিম্বা, বমন, উদরে স্পর্শবেদ, মলিন ও ব্যাকুলিত মুখমণ্ডল, মস্তকে উত্তাপ ও দগ্ধপ, গাত্রে আমবাতেব স্থায় বেদনা ও ঘর্ম লক্ষণে ব্রাইওনিয়া প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ডাঃ গুল্ড লিবারপুল নগরে

জলবৎ উদরাময় ও বমন এবং শোথ লক্ষণে রোগের আক্রমণ সময়ে আর্সেনিক ও বিরামকালে নক্স-ভমিক্যা ব্যবহার করিয়া অনেক রোগী আরোগ্য করিয়াছিলেন। ডাঃ ডাইস্ ব্রাউন, এবারডীন্ নগরে ব্যাপ্টিসিয়া ১ ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত জেলসিমিনম চায়না ও পডোফিলম্ সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় হইতে পারে। ডাঃ ডিকিন্সন প্রথমাবস্থায় প্রবল জ্বর ও গাত্র-বেদনা লক্ষণে জেল-সিমিনম; গাত্র-বেদনার সান্ত্বনয় তীব্রতায় জেলসিমিনম ও ব্রাইওনিয়া পর্যায়ক্রমে; বিরাম কালে কেবল ব্রাইওনিয়া; পুনরাক্রমণে পুনরায় জেল-সিমিনম; সন্নিপাত লক্ষণে, অর্থাৎ কপিশবর্ণ পবিত্রক জিহ্বা, দন্তে দন্ত-শর্করা, অতিদ্রাব, ও উদরাগ্রানে রসটক্স; পাণ্ডু লক্ষণে মারকিউরিয়স; কফি-বর্ণের পদার্থ বমনে আর্সেনিকম; বিবমিষা ও ভুক্তজ্বা বমনে ইপিকাক; বোগাস্তিক দৌর্জল্যে সিকোনা ব্যবহার করিতে বিধি দেন। রোগান্তে দৌর্জল্য নিবারণার্থ ফসফরাস ও ফসফরিক এসিডও ব্যবহৃত। নিউমোনিয়া, ব্রকাইটিস, অপথালমিয়া প্রভৃতি উপসর্গে ফসফরাস, ব্রাইওনিয়া, একোনাইট প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার্য। ক্যান্সার ও নক্সভমিক্যা এ রোগের প্রতিষেধক।

পথ্যাপথ্য।—এ রোগে পুষ্টিকর লঘুপথ্য দেওয়া কর্তব্য। অত্যন্ত পরিশ্রমতা ও ঔষদজ্ঞ জলে দ্বান নিতান্ত আবশ্যকীয়। সংক্রমণ প্রতিষেধার্থে তৎপ্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করা উচিত।

## [১০] পীতজ্বর—ইয়ালো ফিবার।

পীতজ্বর আমাশয়ের উপরে বেদনা, তীব্র শিরঃপীড়া, প্রলাপ, কৃষ্ণবর্ণ বমন ও কৃষ্ণবর্ণ মলশ্রাব এবং পাণ্ডু লক্ষণাপন্ন একপ্রকার বিশেষ অবিরাম জ্বর। ইহাতে চক্ষু ও চর্ম পীতবর্ণ হয় বলিয়া ইহাকে পীতজ্বর বলে। ইহার তিন অবস্থা। প্রথম বা উপদাহিত অবস্থা, দ্বিতীয় বা প্রদাহিত অবস্থা, তৃতীয় বা পতনারস্থা। পীতজ্বর সংক্রামক। একপ্রকার বিশেষ বিষ ইহার উৎপত্তির কারণ। সমুদ্র তটপালে শিরঃপীড়া, জিহ্বার সরের জ্বাশ ভ্রম আকৃতি, চক্ষুর

সজলতা ও আনন্ডতা, বোগেব প্ৰপমাবস্থায়ই মূৰে অশ্রুনাশেব বিদ্যমানতা, স্বকের পীতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ বমন, এবং সংক্রামকতা এই জ্বলি পীতজ্বরের বিনির্গম লক্ষণ । এই সকল লক্ষণ দৃষ্টে অস্বাভাৱ রোগ হইতে, বিশেষতঃ স্বল্প বিবাম জ্বর হইতে পীতজ্বরের পাতদ হইবা থাকে । এই জ্বর এদেশে উৎপন্ন হয় না । ওয়েষ্ট ইণ্ডিস দ্বীপে, এবং আফ্রিকা ও আমেরিকার কোন কোন স্থানে জন্মে । অন্তএব ইহাব বিস্তারিত বিবরণ ও চিকিৎসা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে উল্লিখিত হইল না ।

চিকিৎসা ।—(১) প্রথম অবস্থা ।—কাম্ফর (পীত ও কল্ল), একল ও বেল পর্যায়ক্রমে (তীব্র জ্বর ও মস্তকে বেদনা), জেলস ও ব্রাই পর্যায়ক্রমে (চতুর্থ ঘণ্টার মধ্যে জ্বর হ্রাস প্রাপ্ত না হইলে); সিমিদি (পৃষ্ঠ, অঙ্গ ও মস্তকে আমবাতবৎ বেদনা), ইপিণাক (বমন-প্রবৃত্তি বা বমন), এণ্ট-টাট (ইপিণাক সেবনে বিশেষ উপকার না দশিলে); চায়না (রক্তস্রাবের পর অবসন্নতা) । (২) দ্বিতীয় অবস্থা ।—আর্স ও মার্ক পর্যায়ক্রমে, কফি (রাত্রিকৈ অস্থিরতা); চায়না । (৩) তৃতীয় অবস্থা ।—আর্স ও কোটেলস পর্যায়ক্রমে । তৃতীয় অবস্থার বিশেষ বিশেষ লক্ষণেব ঔষধ ।—বমন ।—ক্রিয়েজোট, বা আর্জনাইট । মূত্রকূটু বা মূঃস্তুভ ।—কাহ্ন (বক্রবর্ণ বা রক্তময় মূত্র) । ক্যান-শাট (গাঢ়, ষোলামূত্র, অথবা শ্লেষ্মা কৰ্জুক মূত্ররোধ); এসিৎ সল্ফ (রক্ত মূত্র); বেল, এসিৎ, ডিজি। উদরাময়—মার্ক (রক্তময় মল); ভিরেট-এব (ক্ষুদ্রাঙ্গে আক্কেপিক বেদনা), পডোফ (কৃষ্ণবর্ণ তবল মল), কার্বো-ভেজি (বমন, মল ও নিখাসে চৰ্জুক), এসিড কস । জরায়ু হইতে রক্তস্রাব বা গর্ভস্রাব ।—আবি (উজ্জল লোহিতবর্ণ বস্ত্র, গর্ভেব প্রথম ২।৩ মাসে); সিকেল (কৃষ্ণবর্ণ রক্ত, গর্ভের প্রাবল্লিত অবস্থায়), হেমো (ধীরে ধীরে রক্ত স্রবণ) । ইয়ে (অত্যন্ত অবসাদ) । কাইয়োল (মূত্ৰশাল্য); ইয়োমো (প্রচণ্ড উত্তপ্ততা) ।

আরোগ্যে মুখ অবস্থা ।—চায়না । প্রতিষেধক ।—একল, সিমিদি, ক্যাপিট, অঙ্গারচূর্ণ; উষ্ণ স্নান ।

# স্ফোট জ্বর—দি ইরাপ্টিব ফিবার্‌স।

(১) মসূরিকা—বসন্ত—স্নান পত্র।

বসন্ত, আশ্রাবপূর্ণ পীড়কাবিশিষ্ট এক প্রকার সংক্রামক অবিরাম জ্বর। এই রোগে একবার হইলে প্রায় আবার পুনরাবহ হয় না। কচিৎ এক ব্যক্তির দুইবারও হয়। এই সংক্রামক রোগে পীড়কা সকল পূর্ণক্ পূর্ণক্ থাকিলে বিশ্লিষ্ট বা বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্মিলিত থাকিলে সংশ্লিষ্ট (লেপা) এবং বিশ্লিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট সংমিশ্রিত থাকিলে অর্ধ সংশ্লিষ্ট বসন্ত বলে। বসন্তকালে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে বসন্ত বলে। বসন্তের তবে শীতের স্বরূপতা, উত্তাপের মৃদুতা, বেদনা ও বিষমিয়ার অমুগ্রতা থাকিলে বিশ্লিষ্ট গুটিকা এবং শীতের আতিশয়া ও পুনঃ পুনঃ উপস্থিতি, তাপের প্রখরতা, বেদনার তীব্রতা, স্পষ্ট আমা-  
শ্রাব উপদ্রব, ১০৪ ডিগ্রী বা ততোধিক গাত্র-তাপ থাকিলে সংশ্লিষ্ট গুটিকা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। বসন্তের চারিটা অবস্থা। যথা, (১) পূর্বরূপ, (২) প্রাথমিক জ্বর, (৩) পীড়কা, (৪) দ্বিতীয়বার জ্বর। বিষমিয়ার পূর্ব হইতে রোগের প্রকাশ পর্য্যন্ত প্রথমাবস্থা; রোগের প্রকাশ হইতে পীড়কায় উৎপত্তি পর্য্যন্ত দ্বিতীয় অবস্থা; উদ্ভেদোৎপন্ন অবস্থা তৃতীয় অবস্থা; ও দ্বিতীয়-বার জ্বর, বা চিপিটিকা পাতাদি চতুর্থ অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়।

লক্ষণ।—বসন্ত বিষ শরীরে সংক্রামিত হইবার প্রায় দ্বাদশ দিবস পরে জ্বর উৎপন্ন হয় এবং শীত, উত্তাপ, শিরঃপীড়া, গাঢ় লেপাবৃত ত্বক্ জিহ্বা, আরক্তমুখমণ্ডল, সর্বাঙ্গে ঘূর্ণবৎ বেদনা, পৃষ্ঠ ও কটিদেশে অতিশয় তীব্র বেদনা, আশ্রাব্য-গহবরে স্পর্শদেয় ও সময়ে সময়ে বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পৃষ্ঠবেদনা ও বমন উগ্র আকারের হইলে রোগের আক্রমণও উগ্র হইয়া থাকে। উৎকট রোগে মূত্র-বোধ ও উরুস্তম্ভও অন্তঃ, এবং সাধারণতঃ পীড়কা প্রকাশিত হইলে উহা নিবৃত্ত হয়। জ্বর হইবার পর তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে আরক্ত চিহ্ন অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন পীড়কা সকল প্রকাশিত হয়; এই সকল উদ্ভেদক আকার মসূরের ভাণ্ড বলিয়া এই রোগকে আম্যুর্বেদে, মসূরিকা বলে। প্রথমতঃ কপালে ও মণিবন্ধের সম্মুখে পীড়কা দৃষ্ট হয়। অনন্তর উহা ক্রমে ক্রমে সর্বাঙ্গবর্তী হইয়া পড়ে। স্বরবদ্য, কণ্ঠনালী ও

বায়ুনলীভূজের আবরণ-বিলীতে পীড়কা উৎপন্ন হয় বলিয়া বসন্ত রোগে লালাস্রাব, গলাবেদনা, কাস, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পীড়কা সম্পূর্ণরূপে উৎপন্ন হইলে পূর্বাৎপন্ন হইবার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বিশ্লিষ্ট বসন্তে রোগের লক্ষণের অনেকটা বিবাম দৃষ্ট হয়। নাড়ীর বেগ, গাত্রের তাপ, এবং বেদনা বিলক্ষণ কমিয়া যায়। সংশ্লিষ্ট বসন্তে সর্কাসীন লক্ষণের কতকটা হ্রাস পড়ে বটে কিন্তু বিশ্লিষ্ট বসন্তের ত্রাণ স্থাপ্য বিবাম পবিলক্ষিত হয় না। বসন্তের পীড়কা গুলি প্রথমে ফোটকেব ত্রাণ রূপে হইতে থাকে এবং মধ্যভাগে অবনত হইয়া পড়ে ও উহা চারিদিকে প্রদাহিত মণ্ডল জন্মে। এই অবনতি বা নাভী ত্রাণ আকৃতি বসন্ত-পীড়কার পবিচয়-লক্ষণ। পীড়কাগুলি পাঁচদিন পর্য্যন্ত আয়তনে বর্দ্ধিত হয়। অনন্তর উহাদের অভ্যন্তরস্থ স্বচ্ছ রস পীতবর্ণ পুষে পরিণত হয়। তখন আব মধ্যস্থল অবনতি থাকে না। পীড়কা ক্ষীত ও অর্দ্ধমণ্ডলাকাব হইয়া উঠে। পীড়কা পুষ উৎপন্ন হইবার সময় অক্লিপট, মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ক্ষীত হয় এবং মুখমণ্ডলের বিকৃতি জন্মে। সংশ্লিষ্ট বসন্তে যোগীর মুখমণ্ডল বিসর্পেণ ত্রাণ ক্ষীত হইয়া চক্ষু রুদ্ধ করিয়া ফেলে। রোগ অতিশয় তীব্র হইলে হস্তপদাদি, হস্ত-নিম্ন-গ্রন্থি ও কর্ণ-মূল-গ্রন্থি ক্ষীত হয়। কখন কখন প্রলাপও জন্মে। শব্দাবহ-খুঁটন, কণ্ঠরাস্পন্দন, স্থিতি প্রভৃতি অস্বাভাবিক সঙ্গিত-লক্ষণও প্রকাশ পায়। এই সময় বসন্তের রোগী গাত্র হইতে একপ্রকার বিশেষ দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে। এই বিশেষ দুর্গন্ধও বসন্তের একটি বিনির্ণয় লক্ষণ। পীড়কা উৎপত্তির পর অষ্টম দিবসে পীড়কা সকল পবিপক হয় ও উহা হইতে আস্রাব নির্গত হইতে থাকে। অনন্তর চিপিটিকা উৎপন্ন হয় এবং ওক হইয়া ৪ : ৫ দিনে সেই গুলি পড়িয়া যায়। তৎপরে শরীরে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন থাকে, যন্ত বা অষ্টম সপ্তাহে তাহা বিলীন হয় অথবা ছবপনেগ অঙ্কে চিরদিন শবী কলঙ্কিত থাকিয়া যায়।

এই রোগে নবম হইতে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে পীড়কা পক হইবার সময় দ্বিতীয়বার জ্বর হয়। অতঃপর বোগে দ্বিতীয়বারে জ্বর তিন চারিদিন থাকে, উৎকট রোগে অধিক দিন থাকে। এই জ্বর অতিশয় বিপন্ন জনক। সংশ্লিষ্ট বসন্তে এই সময় কখন কখন সাংঘাতিক বক্ষঃ-লক্ষণ বা শ্ববদ্য-প্রদাহ উপস্থিত হইয়া থাকে কিম্বা শবীরেণ নানা ভ্রান্তি ফোটক জন্মে বা চক্রে ক্ষত

হইয়া দৃষ্টি নষ্ট হয় । এবং বিসর্প, শ্বাসবোধ, বস্তুর বিগলিত অবস্থা প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । পূর্ববর্ণিত লক্ষণগুলির সহিত সাংঘাতিকতা ও বিগলিততা সংযুক্ত থাকিলে অথবা বসন্তের শুটকাগুলি ক্রমবর্ণ হইয়া উঠিলে উহাকে সাংঘাতিক বা দূষিত বসন্ত বলে ।

**উপসর্গ ।**—এই বোগে বক্ষণ ও কক্ষগ্রন্থির ক্ষীণতা, বিসর্প, ত্রণ-শোথ, পায়নিয়া, গ্যাংগ্রন, ফ্লেব্যান্টিস, নিউমোনিয়া, প্লুভিসি, ব্রঙ্কাইটিস, অতিসার, চক্ষু-প্রদাহ, কণীনিকার ক্ষত, ও কর্ণ-শ্রাব প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে এবং বোগীর জীবন বক্ষা পাইলেও কোন কোন উপসর্গে সে অন্ধ, বধির, বা থগ্ন হইয়া পড়ে । সঙ্কটাপন্ন বোগে রক্ত-শ্রাব ও বক্ত-মূত্রও জন্মে । গর্ভিণীর গর্ভশ্রাব বা অকালপ্রসব হয়, গর্ভস্থ সন্তান সাধারণতঃ মরিয়া যায় এবং গর্ভিণীর জীবন বিপদাপন্ন কবিতা তোলে ।

**ভোগ-কাল ।**—বসন্তের আক্রমণাবস্থা দুই হইতে পাঁচ দিন, গীড়-কার অবস্থা পাঁচ দিন, পূয়োৎপত্তির অবস্থা চারি হইতে পাঁচ দিন; এবং শঙ্ক-পাতের অবস্থা পাঁচ হইতে দশ দিন অনতিদূর নহে । তথাপি এই রোগের ভোগ-কাল ষোল হইতে সাতাইশ দিনসে পরিমিত হইতে পারে ।

**কারণ ।**—বসন্ত অত্যন্ত সংক্রামক রোগ । সংস্পর্শে ও বাতাসে সংক্রামিত হয় । বসন্ত বিষ অত্যন্ত দূষিত বাষ্প অপেক্ষা অধিকতর ক্ষম ঐ স্থায়ী । বোগীর শয্যা ও বস্ত্রাদিতে এই বিষ অনেকদিন অবস্থিতি করে । বেগের গাড়ী বা বাস্তায় যাতায়াতে বোগীক্লান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে বা বাতাসে এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে । মৃতদেহে বসন্তের বিষ দুই এক বৎসর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে । শুটকা পত্রাবহার ও চিপিটিকা-পাতের প্রাবল্য-বহুদূরই ইহা অধিক প্রাবল্য দৃষ্ট হয় । সকল বয়সেই এই বোগ আক্রমণ করে । কিন্তু যুবক অপেক্ষা বালকেই ইহা সমধিক সংক্রামিত হয় । কাহার কাহারও সংস্পর্শেও বসন্ত জন্মে না ।

**বিনির্গম ।**—হাম ও পানী-বসন্তের প্রথমাবস্থার সহিত বসন্তের অনেকটা সাদৃশ্য আছে । অতএব প্রাবল্যবাহ্য বসন্তরোগের বিনির্গমে ভ্রম জন্মিতে পারে । হামে উদ্বেদ উৎপন্ন হইবার পূর্বে প্রতিজ্ঞাসেন লক্ষণ পাবে এবং তৎপদনে গীড়কা প্রকাশিত হয় । হামের গীড়কা অক্কেসাস্যাব

তম এবং উহাত স্পর্শে ত্বকেব নিম্নে মন্থন বা ছিটাগুলি সংলিপ্ত বৎ অমুভূত হয় না। বসন্তে অতিশয় কটিবেদনা থাকে, পীড়কা একদিন আগে প্রকাশ পায়, এবং স্পর্শে চর্মের নিম্নে মন্থনসংলিপ্তবৎ অমুভূত হয়। পানিবস- স্তেব জ্বর মূহু হয়, কটিবেদনা থাকে না, পীড়কা শীঘ্র প্রকাশ পায়, স্পর্শে ত্বকেব নিম্নে মন্থন-সংলিপ্তবৎ অমুভব বিদ্যমান থাকে না, পীড়কা গুলির মধ্যভাগ অবনত হয় না, এবং সকল গুলিতে পুণ্ড জন্মে না।

প্রস্তান।—বসন্ত অতিশয় সাংঘাতিক রোগ। বালক ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ অনিষ্টকর। একবৎসরের ন্যূনবয়স্ক শিশুদিগেব এই বোগে শতকরা প্রায় পঞ্চাশ জনের এবং বৃদ্ধদিগেব পঞ্চাশজনেরও অধিক সংখ্যকেব মৃত্যু হয় বলিয়া উল্লিখিত আছে। বোগীৰ বয়স্ক্রম, বোগের তীব্রতা, গুটি- কাব দ্বিগত বা ত্রিগুণিত প্রকৃতি, এবং উপসর্গেব তাবতন্যাত্মসাবে বসন্ত বোগে ‘সাব্যাবাধা’ নিদ্রিষ্ট হইয়া থাকে। ব্যাপ্ত ও সংলিষ্ট পীড়কা; স্ববয়স্ক ও কণ্ঠ নাগীৰ গুরুতর আক্রমণ, বক্ত্রস্রাব, অতিশয় অবসাদ, অপিরত প্রলাপ, অতিশয়, এবং নিউমোনিয়া, প্লুবিসি, ও ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি ফুসফুসের উপ- সর্গ এই বোগে অদ্ভুত লক্ষণ। গভাবস্থাও বিপদজনক, গতিগীদিগেব বসন্ত হইলে বোগীগীর প্রাণ রক্ষা পাইলেও প্রাঘই গভাবস্থা বা অকাল প্রসব হইয়া থাকে এবং গভত্ব সম্বন্ধেব মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা।—একোনাইট, বেলডোনা, এপিস, ব্যাপ্টিমিড, ব্রাইও- নিয়া, হেমেনেলিস, হাইওসাবেমাস, এণ্টিমোনিয়ম টার্টারিকম, ভ্যাকসিনাইন, ভেবিওগাইনন, থুজা, হিপাবসসফার ও সাইলিশিয়া বসন্তেব প্রধান ঔষধ। একন, ভেল, ভিবেট-ভি (প্রলাপ জব)। এণ্ট-টাট, হাইড্রাস ১৮, থুজা ০, সলফ (ফোটারিয়া)। এণ্ট টাট, মার্ক, এপিস, ল্যাক (পূর্বাবস্থা)। ক্যাম্ফ, সলফ (পীড়কাবিলোপ)। অ্যাস বা ব্যাপ্টি (সান্নিপাতিক লক্ষণ)। সলফ, অ্যাস, ফস (সাংঘাতিক ও সংলিষ্ট পীড়কা)। উপসর্গ,—ফস, এণ্ট-টাট, (ফুসফুস-প্রদাহ); একন, ব্রাই (ফুসফুসে বক্ত্রস্রাব); ব্রাই, কা-বাইক্রম, এণ্ট-টাট (বায়ুনগীভূজ প্রদাহ); রস (পৃষ্ঠ-বেদনা); মার্ক (প্রস্থির ক্ষীততা); এপিস, বেল (শোথ, আবদ্ধ চক্ষু, ক্ষীত গলদেশ); বেল, হাইয়েোস, ষ্ট্রাম, ভিবেট-ভি (প্রলাপ), অ্যাস, ব্যাপ্টি (সহসা অবসাদন ও মূর্ছাশয্যা)।



সলফ, জৈবদ্রব্য জলে বারংবার গাত্র মার্জন (শঙ্কপাত) । পরিণাম,—  
সলফ, নার্ক-করো (চক্ষু-প্রদাহ) ; হিপার, ফস, সলফ (ফোটক) ।

### প্রধান প্রধান ঔষধের প্রয়োগ-লক্ষণ ।

(১) একোনাইট ।—বোগের প্রথম অবস্থায়, গুটিকা উৎপন্ন হইবার পূর্বে কম্প, উত্তাপ, স্বকের কক্ষতা, দ্রুতনাড়ী, অস্থিরতা, পিপাসা, 'মস্তক-বেদনা, বমনেচ্ছা, বমন, পৃষ্ঠ ও কটি বেদনা প্রভৃতি এরলক্ষণের প্রাৰ্ভল্য একোনাইট ব্যবস্থের । (২) বেলেডোনা ।—বসন্তের প্রথম-বস্থা যক্ষ্মশূল জ্বালাকর উত্তাপ, শিরঃপীড়া, অনিদ্রা, প্রলাপ বা আক্ষেপ লক্ষণে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয় । বালকদিগের বোগেই ইহা বিশেষ উপযোগী । অপব, প্রবল মান্তিক লক্ষণ, প্রলাপ, আলোকে বিব্রত প্রভৃতি লক্ষণে কয়েক মাত্রা বেলেডোনা সেবন করিলে বসন্ত বসিয়া বাইবার আশঙ্কা নিবারিত হয় । (৩) এণ্ট-টার্ট ।—এণ্ট টার্ট বসন্তরোগের অমোঘ ঔষধি । বোগের প্রকৃতি নিরূপিত হইবামাত্রই ইহা ব্যবহার করা উচিত । পীড়কা উৎপন্ন হইলে এই ঔষধি প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ববর্তী জরেও বিবিধা, বমন ও আক্ষেপ থাকিলে ইহা ব্যবহৃত হয় । ফলতঃ এই বোগের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল এণ্ট-টার্ট, কিম্বা তৎসহকাৰে পর্যায়ক্রমে অন্য কোন ঔষধি ব্যবস্থা কবা যাইতে পারে । বোগ জ্বসাধা হইলে অবকালে একোনাইট ও চিপিটিকাপতন (ডেসকোরামেশন) সময়ে পরিণাম ফল নিবারণার্থ সলফার প্রয়োগ কবিলে এণ্ট-টার্ট ভিন্ন প্রায় অন্য কোন ঔষধি ব্যবহার কবা আবশ্যক করে না । ডাঃ ডিক্‌সন ইহাব ওদ চূর্ণ ব্যবহার করেন । (৪) মার্কিউরিয়স ।—লালাস্রাব, গলক্ষত, কর্ণমূলদি গ্রন্থির ক্ষীণতা, দুর্গন্ধি নিশ্বাস ও রক্তময় বা হরিভাত আমময় উদবাসময় লক্ষণে, বিশেষতঃ পুষোৎপাদন সময়ে মার্কিউরিয়স উপযোগী । (৫) এপিস ।—বিসর্পবৎ ক্ষীণতার, গলমধ্যের ক্ষীণতার ও গলা বেদনার এবং মুখমণ্ডল ও অক্ষিপুটাদির অতিশয় ক্ষীণতার এপিস ফলপ্রদ । (৬) কফি ।—অস্থিরতা ও অনিদ্রার দুই তিন মাত্রা কফি ব্যবস্থের । (৭) ব্যাপ্টিসিয়া ।—আকস্মিক অবসন্নতা ও তন্নিবন্ধন মুচ্ছা প্রতিবেদ্য ব্যাপ্টিসিয়া ব্যবহাৰ্য্য । সারিপাত্তিক প্রকৃতির বসন্তে ইহা

ফলপ্রদ । [৮] ক্যাম্ফর ।—বদি পীড়কা সকল সহস্রা বিলীন হইয়া যায় অথবা সাংঘাতিক হইয়া উঠে ও তৎসহকারে শ্বাসকৃচ্ছ, গাত্রের শীতলতা ও মস্তিষ্কেব পক্ষাঘাতেব লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে দুই বিষ্ণু ঋতায় ক্যাম্ফর কিঞ্চিৎ ঐষত্ব জল সহকারে পনব মিনিট অন্তর বারংবার সেবন কবাইবে । গাত্র উত্তপ্ত ও পীড়কা প্রকাশিত হইলে ক্যাম্ফর সেবন বহিত করিবে । এতৎসহ উষ্ণ দ্রব-স্বেদ ( হট-বাথ ) ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার দর্শে । [৯] ওপিয়ম ।—তজ্জা বা অট্টেতজ্জ ও মশক নিশ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষণে ওপিয়ম উপযোগী । [১০] ল্যাকেসিস ।—পীড়কা পক হইবার সময় শরীরে পূৰ্ব শোষিত হইয়া সান্নিপাত-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ল্যাকেসিস অতিশয় উপকারী । [১১] সলফার ।—বসন্তরোগের গতির বৈদম্য জন্মিলে, গুটিকা সকল বিলীন হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, স্বচ্ছ ও পীত বর্ণ পীড়কান পরিবর্তে হবিত, ধূমল বা কৃষ্ণবর্ণ পীড়কা প্রকাশ পাইলে সলফার ব্যবস্থ্যর । সলফার দ্বারা সম্যক উপকার না দর্শিলে কার্বো-ভেজিটেবিলিস, নাইট্রিক এসিড বা আর্মে'নিক ব্যবহৃত হয় । অপিচ, জ্বনিবার কণ্ডুয়ন ও পরিণাম ফল নিবারণার্থে সলফার বিশেষ উপযোগী । [১২] কার্বোভেজিটেবিলিস ।—অতিশয় জ্বগ্নক, গুটিকার কালবর্ণ; অত্যন্ত অবসন্নতা, ক্ষীণ ও দ্রুত নাড়ী কার্বোভেজিটেবিলিসেব প্রয়োগ-লক্ষণ । (১৩) রুসটক্স ।—সংশ্লিষ্ট বা দূষিত বসন্তে পীড়কার কৃষ্ণবর্ণ, বিদারিত পরিণত জিহ্বা, দম্বে দন্ত শর্কবা, মূত্ৰপ্রলাপ ও অতিসাব লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী । (১৪) ফসফরাস ।—বসন্তে নিউমোনিয়া উপসর্গ উপস্থিত হইলে এবং শুষ্ক কাস, দ্রুত শ্বাস, ও ফুসফুসেব বিধান-তন্ত্রের নিরেটতা জন্মিলে ফসফরাস ব্যবস্থ্যয় । (১৫) থুজা ।—পীড়কান পক্ষা-স্তায় ও চিপিটিকা-পাতেব সময় যে জ্বনিবার কণ্ডুয়ন জন্মে থুজা সেবনে তাহা নিবারিত হয় । পীড়কান মামড়ির নীচে যে ক্ষত জন্মে এবং যে ক্ষতচিহ্ন গুলি পরিশেষে বসন্তের অঙ্করূপে বিদ্যমান থাকে, যথাসময়ে থুজা ব্যবহার করিলে সেই ক্ষত গুলিতে সুন্দর ফল দর্শে ও বসন্ত-চিহ্ন অনেকটা নিবারিত হয় । (১৬) ভ্যাক্সিনাইন ও ভ্যারিওলাইনম ।—অনেক চিকিৎসকই এই দুই ঔষধের অতিশয় প্রশংসা করেন । এতদ্বারা রোগের তীব্রতা মন্দীভূত-

ভোগ-কাল হ্রাসপ্রাপ্ত, বিপদজনক লক্ষণগুলি সঙ্ঘর দ্বীকৃত, এবং শীঘ্র  
পুষ্কোৎপন্ন হয়, ও তৎপার অবিলম্বে চিপিটিকা জন্মে। তথাও উল্লিখিত  
আছে যে এই ঔষধে বসন্তের অঙ্কও প্রতিবিদ্ধ হয়। (১৭) হিয়ার।  
—ফে টক বা অণ-শোথ জন্মিবাব আশঙ্কা উপস্থিত হইলে হিয়ার সলফার  
ব্যবহৃত। (১৮) সাইলিশিয়া!—পুষ্কোৎপন্ন হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত  
হয়। কিন্তু গুটিকা পাকিলে পুষ্প পেশীর অভ্যন্তরে মীতা না জমাইতে পারে  
এজন্য শীঘ্র শীঘ্র গালিয়া সাহিব কবিতা ফেলা ভাল। [১৯] কোনারগ।  
—কর্নিকার দ্রুত জন্মিলে কোনারগ আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক প্রয়োজিত  
হইয়া থাকে। এক আউন্স পরিষ্কৃত জলে দশবিন্দু কোনারগের অরিষ্ট মিশ্রিত  
করিয়া তাহার কয়েক বিন্দু প্রতিদিন তিনবার চক্ষে দিতে হয়।

ষাধাবিহিত গো মঙ্গর্যাবানেন পনে পুনর্কাল বসন্ত হইলে প্রায়ই উপবসন্ত  
(ভেবিওলমেড) হয় অর্থাৎ পীড়কা সকল পূর্বপূর্ণ হয় না এবং পুষ্কোৎপাদনের  
আলুয়ঙ্গিক দ্বিতীয়বারের অব প্রকাশ পায় না। এক্ষণ অবস্থায় কেবল প্রথম  
জ্বর ও উহার আলুয়ঙ্গিক লক্ষণ সকলের চিকিৎসাই আবশ্যকীয় হইয়া থাকে।  
এ অবস্থায় একোইটি অপেক্ষা বেলেনডোনা অধিকতর উপযোগী। সময়ে  
সময়ে লক্ষণান্তসাথে জেলুমিনিয়ম, ব্যাপ্টিসিয়া বা ভিরেটুম-  
ভিরিডি ব্যবহার করা প্রয়োজনীয় হইতে পারে। কটিবেদনার আধিক্য  
ভিরেটুম-ভিরিডি প্রয়োগ-লক্ষণের মধ্যে একটা প্রধান লক্ষণ। বসন্তের  
বিশেষ প্রাবল্য থাকিলে টার্টার এমেটিক ব্যবহৃত। পীড়কা উৎপন্ন  
হইলেও কেবলমাত্র এই ঔষধি সেবনেই বোগী আবোগোয়ান্থ ৫ইয়া উঠিতে  
পারে। যাহাদেব টীকা হয় নাই তাহাদেব বসন্ত হইলে প্রথমেই ভ্যাক্সি-  
নাইন্ তৃতীয় ক্রম বা টার্টার-এমেটিক তৃতীয় ক্রম সেবন কবান কর্তব্য।  
ভ্যাক্সিনাইন্ সেবনে গো মঙ্গর্যাবানেন জ্বর উপকাব দর্শে। এমন কি  
কখন কখন তৃতীয় দিবসেই জ্বর ও পীড়কা প্রকাশ পায়। বসন্তের গুটিকা  
পারে উৎপন্ন হইবার পবেও এই ঔষধি প্রয়োগ করিলে এক দিনসের মধ্যে  
গুটিকা সকল না পাকিয়া সঙ্কুচিত ও শুক হইয়া যায়। টার্টার-এমেটিক  
সেবনেও প্রায় তদ্রূপ ফল দর্শে। পুষ্প উৎপন্ন হইবার পূর্বে এই ঔষধি  
প্রয়োগ করিলে প্রায়ই পীড়কা পুষ্প জন্মে না ও বোগের তৃতীয় অবস্থা

উপহিত হইল। ভ্যাকসিনাইন বা টার্টার-এমেটিক ব্যবহার করিবার উপযুক্ত অবস্থা। অতীত হইয়া থাকিলে বা ঐ ঔষধের সেবনে কোন উপকার না দর্শিলে লক্ষণানুসারে মারকিউরিয়াস আদি পূর্কোষিষিত ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়।

**প্রতিষেধক।**—সলফার, সিমিসিফুগা, ভ্যাকসিনাইন, সেরাসিনিয়া এই বোগের প্রতিষেধক ঔষধ। কিন্তু বসন্তের প্রাচুর্য্য সময় গোবীজে টিকা গ্রহণ অথবা সলফারের মূল অরিষ্ট ও বিমল বায়ু সেবন করিলেই এই দাক্ষণ রোগের হস্ত হইতে বিমুক্ত থাকা যায়।

**বসন্ত-চিহ্ন।**—বসন্তের চিহ্ন নিবারণার্থ মৃৎমণ্ডলেব পীড়ক। সকল কার্কলিক এসিডে নিমজ্জিত স্থচাদারা বিদ্ধকরা কর্তব্য। শূকরের বসা বা অলিত অয়েল লেপন কবিলেও বসন্তের অঙ্ক ও কণ্ডুয়ন অনেক পবিমাণে নিবারণিত হইতে পারে। পীড়ক। বিদৌর্ণ হইবার পূর্বে সম পবিমাণ মিসিরিণ ও গোলাপুজল যোগীর গাত্রে লেপন কবিয়া ততপবি একভাগ টার্টার এমেটিক প্রথম ক্রমে চূর্ণ ও আটভাগ ভায়োলেট চূর্ণ আন্তে আন্তে সংলগ্ন করিয়া দিলে বসন্ত-চিহ্ন নিবাবত হয়। যতবার প্রয়োজনীয় হয় ততবার এই প্রকার প্রলেপ দেওয়া যাইতে পারে। বোগীর গাত্রে আলোক পতিত না হয় তন্নিমিত্ত এই প্রলেপ বিশেষ উপযোগী। বালকগণ নিদ্রাকালে শবীরে নথ ঘর্ষণ না কবিতে পারে এ জ্ঞাত উহাদেব হস্ত আবদ্ধ কবিয়া রাখা কর্তব্য। কার্কলিক এসিড চাবিভাগ, অলিত অয়েল চল্লিশভাগ, খটিকাব স্ক্রুচূর্ণ ষাটভাগ একত্র মিশ্রিত কবিয়া বস্ত্র-থও নাখাইলা নাসিকা, গৃথ, ও চক্ষুস্থানে ছিড় করিয়া বাব ঘণ্টা পবে পবে নূতন কবিয়া এক একবার লাগাইয়া রাখিলে এবং হাতে ও বাহুতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খণ্ড প্রয়োগ কবিলে কণ্ডুয়ন উপশমিত, চিপিটকা প্রশান্ত ও অঙ্ক নিবাবিত হয়। পীড়ক। শুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিলে আর এই প্রলেপ প্রযুক্ত্য নহে।

**পথ্যাপথ্য।**—বোগীক শীতল দাখা ও উহাব গাত্রবস্ত্রাদি বাবংবাব পরির্ত্তন করিয়া দেওয়া উচিত। বোগীর গৃহে বিস্তৃত বায়ু সঞ্চারিত ও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকা আবশ্যক। বিস্তৃত বায়ু এ রোগে বিশেষ ফলপ্রসূ। স্তবাসিত কার্কলিক এসিড মিশ্রিত কঁষড়ফ জলে কোমল গাজমার্জ্জনী সিদ্ধ কবিয়া

মধ্যে মধ্যে রোগীর গাত্র মার্জনা করা বিহিত । শয্যা-কৃত্ত নিবারণার্থ বারং-বার রোগীর অবস্থান পরিবর্তন করিয়া দেওয়া প্রয়োজনীয় । পীড়কা বিদীর্ণ হইলে পুষ শোষণার্থ তথায় তণ্ডুল-চূর্ণ বা গোধূম চূর্ণ ছড়াইয়া দেওয়া কর্তব্য । রোগের শেষাবস্থায় পরিচ্ছন্নতা, ঈষৎ জলে গাত্র ধোত ও মধ্যে মধ্যে উষ্ণ জলে স্নান বিশেষ আবশ্যিক । জরের শ্রবল অবস্থায় গ্রাহ্যই আহাৰে প্রবৃত্তি থাকে না, তখন সামান্য জরের পথ্যই ব্যবস্থেয় । জ্বর তিবোহিত হইলে পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক পথ্য দেওয়া বিহিত । এ বোগে চা, যবেব মণ্ড, মাগু, আবারুট, তিন ভাগ দুধ এক ভাগ সোডা-ওয়াটার মিশ্র, মাংসের কাথ, স্বাদ্যাকর সুপক কল প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যাইতে পারে । পানার্থ শীতল জলই প্রশস্ত, সময়ে সময়ে লেমনেড বা সোডা ওয়াটার দেওয়া যায় ।

বসন্ত অতিশয় সংক্রামক বোগ । বোগীর গাত্র হইতে যখন গন্ধ নিঃসৃত হয়, তখনই বসন্ত-বিষ সমধিক তীব্র ও সংক্রমণশীল হইয়া উঠে । ফলতঃ প্রথম জন হইতে চিপটিকাপাত পর্য্যন্ত সকল সময়েই উহা সংক্রামিত হইয়া থাকে । সংক্রমণ প্রতিষেধক ঔষধ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । রোগীর শয্যা ও বস্ত্রাদি হয় দধু করিয়া ফেলা, নয় ২১২ তাপাংশের উত্তপ্ত জলে সিদ্ধ করিয়া লওয়া কর্তব্য । গৃহ উত্তমরূপে পরিষ্কার করা উচিত এবং দ্বারদ্বন্দ্ব করিয়া উহাতে গন্ধকেব ধূম প্রদান ও চূর্ণেব জল প্রক্ষেপ করা কর্তব্য ।

—:○\*○:—

## [২] গো-মসূর্যাধান—গোবীজে টীকা ।

ভ্যাকসিনেশন ।

গো-মসূর্যাধান অর্থাৎ গো-বীজে টীকাদানই বসন্তেব সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষে-ধক উপায় । ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ জেনার ইউরোপে এই প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন । কিন্তু তৎপূর্বে যে এদেশে প্রাচীনকালে গো-মসূর্যাধান প্রচলিত ছিল আয়ুর্কোষেব কোন কোন গ্রন্থে তাহাব প্রমাণ পাওয়া যায় । গো বীজে টীকা গ্রহণ করিলেই যে একেবারে এই ভয়ঙ্কর বোগ হইতে নিমুক্ত থাকা

যায় এমন নহে, তবে সফল টীকা হইলে তৎপরে যে বসন্ত উৎপন্ন হয় সে বসন্তে প্রায়ই প্রাণ বিনষ্ট বা অঙ্গাদি বিকৃত হয় না ।

বসন্ত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত গো-বসন্তের বীজ সমুদায় শরীরে প্রবেশ করাইলে যে অব, পীড়কা ও ক্ষতচিহ্ন বিশিষ্ট এক প্রকার কৃত্রিম রোগ উৎপন্ন হয় তাহাকে গো-মহুরিকা বা উপবসন্ত কহে এবং এই গো-বীজ প্রবেশ করাইবার প্রক্রিয়াকে গো-মহুর্যাধান বা ভ্যাক্সিনেশন বলে ।

এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সদৃশ চিকিৎসার অন্তর্গত । এতদ্বারা বসন্তের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত থাকা যায়, উহা সাংঘাতিকতা নিবারিত হয় এবং বসন্ত রোগ উৎপন্ন হইলেও বিশেষ উৎকট আকারে প্রকাশ পায় না ।

গো-মহুর্যাধানের পবে বাহতে যতই অধিক ক্ষত-চিহ্ন থাকে ততই ভাল । চারিটা ক্ষত চিহ্ন বিদ্যমান থাকিলে পুনর্বার বসন্ত হইলে প্রায়ই লোক মরে না । টীকার চিহ্ন না থাকিলে দ্বিতীয়বার বসন্তের আক্রমণে প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে ।

একণে গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা অনুসারে এতদ্বশে গোবীজে টীকা দান পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে, অতএব এ সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতবা বিষয়গুলি সংক্ষেপে এখানে উল্লিখিত হইল ।

(১) যে বালকেব গণ্ডমালা, কোলিক উপদংশ অথবা অন্ত কোন ধাতু-গত দোষ নাই তাহারই “বীজ” দ্বারা অত্রকে টীকা দেওয়া উচিত । কোন প্রকার পীড়কা বা ত্রণ, গ্রন্থিব ক্ষীণতা ও চক্ষুপ্রদাহ থাকিলে বীজ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ । কারণ, ধাতুহুষ্ট রুগ্ন বালকদিগের বীজে টীকা দিগে সুস্থ বালকদিগের শরীরে ঐ সকল দোষ ও রোগ সঞ্চারিত হইতে পারে । (২) পরিষ্কার ছুরিকা ব্যবহাৰ কবা নিতান্ত কৰ্ত্তব্য । নতুবা উপদংশাদি রক্তদোষ শরীরে প্রবিষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে । (৩) অষ্টম দিবসে বীজ গ্রহণ করা উচিত । উহাতে যেন রক্ত কিম্বা অত্র কোন শাবীরিক নিঃস্রব মিশ্রিত না থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । (৪) বীজ ছই বাহতে অন্ত্র চারি স্থানে সংলগ্ন করা কৰ্ত্তব্য । (৫) বালক যখন সুস্থাবস্থায় থাকে তখনই উহাকে টীকা দেওয়া বিহিত । প্রথম তিন মাসই টীকা দিবার প্রশস্ত সময় । তখন শিশুর কোন তরুণ রোগ বা চৰ্ম্মরোগ না থাকিলে টীকা দেওয়া

যাইতে পারে। দন্তোদগম সময়ে টীকা দেওয়া উচিত নহে। (৬) ঘোবনের প্রারম্ভে স্বভাবতঃ শারীরিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় বলিয়া তখন পুনর্বার টীকা-দেওয়া আবশ্যিক। যদি পূর্বে টীকার ক্ষত-চিহ্ন একেবারেই না থাকে অথবা একটি মাত্র চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে, তবে পুনর্বার টীকা দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

চিকিৎসা।!—গো-মহর্যাদানে প্রায়ই কোন চিকিৎসা আবশ্যক করে না। কিন্তু টীকার ক্ষত স্থান অতিশয় আরক্ত ও ক্ষীত হইলে দুই তিন মাত্রা একোনাইট বা বেলেডোনা ব্যবস্থা করা উচিত। কাহার কাহার ক্ষত-স্থানে পোন্টিশ বা স্কল তণ্ডুল চূর্ণ ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যকীয় হইতে পারে। পীড়কাগুলি সাধিয়া যাইবার সময় কয়েক দিন প্রাতে ও রাত্ৰিতে সলকার সেবন করাটিলে ধাতুগত দোষ বশতঃ চর্ম-রোগ বা চক্ষু-রোগ জন্মিবাব সম্ভাবনা দূরীকৃত হয়। গো-মহর্যাদানের মন্দফলে লক্ষণাভূতাবে খুজা ও সাইলিশিয়াও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অত্যাংকষ্ট বীজদ্বারা টীকা দিলে সময়ের সময়ে উহা হইতে অসুখকর লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। টীকা দিবার পবে একমাত্রা সলকার সেবন করাইলে প্রায়ই টীকার উপসর্গস্বরূপ অল্প কোন বোগ উপস্থিত হয়না। টীকাস্তে বিসর্প, আক্ষেপ বা অতিসার প্রভৃতি জন্মিলে সাইলিসিয়া প্রোগে তাহা আরোগ্য হয়। টীকায় পরবর্তী অতিসাবে, ও টীকায় অব অতিশয় প্রবল হইলে, অথবা গাত্রে বসন্তের জ্বাঘ পুষ্পপূর্ণ পীড়কা জন্মিলে খুজা উপকারী।

## [৩] রসগত মসুরিক।—পানি বসন্ত

### —জল বসন্ত।

#### চিকেনপক্স-ভেরিসেলা।

পানি বসন্ত বসপূর্ণ পীড়কা বিশিষ্ট এক প্রকার যৎসামান্য সংক্রামক জ্বর। বালকদিগেরই অধিকাংশ এই বোগ হইয়া থাকে। প্রকৃত বসন্তের সহিত ইহার আকাংগত সাদৃশ্য আছে সুতরাং প্রারম্ভাবস্থায় ইহাকে

বসন্ত বলিয়া ভ্রম জন্মে। কিন্তু প্রকৃত বসন্তে ও পানবসন্তে প্রভেদ এই, যে পানবসন্তের জ্বর অতি মৃদু ও পীড়কার মধ্যভাগ হ্রাসপ্রাপ্ত। এই সকল পীড়কা দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে এক প্রকার জলবৎ রসে পূর্ণ হয়; কিন্তু প্রকৃত বসন্তের জ্বর উহাতে কখনই পীড়বর্ণ পূর্ণ জন্মে না। ছয় সাত দিবসেই ইহার ভোগ-কাল পর্য্যবসিত হয়। সাধারণতঃ তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে পীড়কাগুলি শুক হব। ইহাতে আরোগ্যান্তে গাঁজে চিরস্থায়ী চিহ্ন থাকে না।

চিকিৎসা।—বসটক্সই এরোগেব প্রধান ঔষধ। যদি নিম্নলিখিত কোন লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তবে কেবল এই একমাত্র ঔষধ সেবনেই নীত্র পানিবসন্ত আযোগ্য হয়। অল্পলক্ষণে একোনাইট, শিরোলক্ষণে বেলেডোনা; পীড়কার অতি কণ্ডুয়নে এপিস, এবং দুই একটি পীড়কার পূর্ব জন্মিলে মারকিউরিয়স ব্যবস্থের। আমাশয়ের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্যের আধিক্যে এন্ট-ফুড ও পলসেটিল ফলপ্রদ।

পথ্যাপথ্য।—এ বোগে দুখ পথ্যই উপযোগী। শীত বা বসন্ত ঋতুর আবহাওয়া সর্দি লাগান উচিত নহে।

## [৪] রোমাত্তী—হাম—মিজলুস।

ইহা এক প্রকার সংক্রামক ফোটজর। হামকে আয়ুর্কোদে রোমাত্তী কহে। হামের দুই অবস্থা বধা, প্রাতিজ্ঞানিক অবস্থা ও ওস্তে-দিক অবস্থা। বাল্যকালেই সাধারণতঃ এই জ্বর আক্রমণ করিয়া থাকে। হামের বিষ সংক্রমণের পনে ১০ হইতে ১৪ দিবসের মধ্যে জ্বর-লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

লক্ষণ। এই রোগের প্রারম্ভে অল্প অল্প জ্বর ও সর্দি, চক্ষু বেদনা ও আঙ্গুলতা, অশ্রুশ্রাব, গলাবেদনা, শিরোবেদনা, বমন, হাঁচি, কাশ, কখন কখন অঙ্গবেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাহারও অতি-সায়ণও থাকে। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হইবার পর তৃতীয় দিবসের শেষে বা চতুর্থ দিবসে পীড়কা উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ কপালে, মুখমণ্ডলে



ও গ্রীবাদেশে, অনন্তর দেহে এবং সর্বশেষে হস্ত পদে পীড়কা প্রকাশ পায়। এই সকল পীড়কা গোলাকার ও রক্তবর্ণ, অল্পলী দ্বারা চাপিলে বসিয়া যায় এবং অল্পলী তুলিয়া লইলেই পুনরায় প্রকাশ পায়। পীড়কাগুলি অসম ও অর্ধচন্দ্রাকার স্তূপে স্তূপে উৎপন্ন হয়। পীড়কা প্রকাশিত হইলে অরুণ অধিকতর তীব্র হইয়া উঠে। নাড়ীর সঘনতা ও দ্রুততা বৃদ্ধি পায়। গাত্র-তাপ ১০০ বা ১০৩ ডিগ্রী হয়। পীড়কা উদ্ভূত হইবার তিন চারি দিন পরে উহার পুনরায় শরীরের সহিত মিশিয়া যায়। বসন্তের জ্বর এ রোগে পীড়কা উৎপন্ন হইলেই জ্বরের বিরাম পড়ে না। কিন্তু পীড়কা বিলীন হইয়া যাইতে আরম্ভ হইলেই জ্বরও ক্রমে ক্রমে হ্রাস পড়িতে থাকে। কখন কখন আর এক প্রকার দূষিত হাম জন্মে। উহাকে কৃষ্ণবর্ণ হাম বলে। ইহার সহিত সন্নিপাত-লক্ষণ থাকে। পীড়কাগুলি সম্যকরূপে প্রকাশিত হয় না, উহাদের বর্ণ কাল থাকে। রোগীর অতিশয় অবসন্নতা, মুহুপ্রলাপ, বা অস্থি; দন্তে দন্ত শর্কবা, জিহবার নীরসতা ও কণ্ঠশতা এবং নাড়ীর দ্রুততা ও ক্ষীণতা জন্মে। এই প্রকার হামে ফুসফুসের রক্ত-সঞ্চয়, স্বাভাবিক ক্রুপ বা নিউমোনিয়া প্রভৃতি উপসর্গ প্রায়ই বিদ্যমান দেখা যায়।

**উপসর্গ।**—হামজ্বরে সময়ে সময়ে বায়ুনলীভূজপ্রদাহ, ফুসফুস-প্রদাহ, কাশ, উদরায়ন প্রভৃতি উপসর্গ থাকে, এই সকল উপসর্গ জন্মিলেই রোগ উৎকট হইয়া উঠে।

**পরিণাম।**—পূরাতন বরষজপ্রদাহ ও বায়ু-নলী-ভূজ-প্রদাহ; কর-কাশ; এবং চক্-প্রদাহ হামের প্রধান পরিণাম।

**বিনির্গম।**—প্রতিজ্ঞার, কাস, ও পীড়কার অর্ধচন্দ্রাকৃতি দ্বারা অস্বাভাবিক রোগ হইতে সহজেই হামের প্রভেদ করা যায়। আরম্ভ জ্বরে প্রতি-জ্ঞার, কাস, ও পীড়কার অর্ধচন্দ্রাকৃতি থাকে না। রোজিওলা বা কুজিহ্বা হামের পীড়কা প্রথমে বক্ষঃস্থলে প্রকাশ পায় এবং উহার সহিত সর্দি ও কাস থাকে না। বসন্তে রোগীর স্বকম্পর্শে সহ্য সংলিপ্তবৎ বোধ হয় ও স্নাত্ত কটিবেদনা থাকে; হামে এ প্রকার অস্বভাব বা কটিকেনা বর্ত-মান থাকে না।

**প্রজ্ঞান।**—এই রোগে অধিকাংশ রোগীই আরোগ্য লাভ করে। তবে হামের সহিত কৈশিকবায়ুশূলীভূজ-প্রদাহ অথবা কুসকুস-প্রদাহ সংস্কৃষ্ট থাকিলে রোগ গুরুতর হইয়া উঠে। কৈশিক বায়ুশূলীভূজ-প্রদাহ-উপসর্গ সংযুক্ত হাম, অথবা কুসকুসের ক্ষয় রোগকালে হামের প্রকাশ সুলক্ষণ নহে। হামের আক্রমণের পরবর্ত্তী প্রাচীন শ্বসন-প্রদাহ বায়ু-শূলী-ভূজ-প্রদাহ, ও চক্ষু-প্রদাহ সহজে আরোগ্য হয় না। যন্ত্রার সম্ভাবনা থাকিলে অনেক সময় হামের পরিণামে উহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

**চিকিৎসা।**—শরীরের উত্তাপ হ্রাস না হওয়া পর্য্যন্ত একোনাইট সেবন করান কর্তব্য। বসন্তের জ্বাৰ এ রোগে পীড়কা উৎপন্ন হইলেই শরীরের উত্তাপ হ্রাস পড়ে না অতএব রোগের ভোগকাল পর্য্যন্ত একো-নাইট ব্যবহার করা যাইতে পারে। অর না থাকিলে কেবল পলসেটিলা সেবনেই এ রোগ উপশমিত হয়। সর্দিজনিত উপসর্গ নিবারণার্থ একো-নাইট সহকারে অন্ত্যন্ত উপযোগী ঔষধ ব্যবস্থা করিলে অধিক উপকার দর্শে। চক্ষু ও নাসিকার উপসর্গে ইউক্লেসিয়া পরম উপকারী। তন্দ্রাদি শিরোলক্ষণে বেলেডোনা উপযোগী। উদরের উপসর্গ অর্থাৎ উদরাময়ে পলসেটিলা ফলপ্রদ। বিরক্তিকর কাশে কালী-বাইক্রমিকম বিশেষ উপযোগী। কেহ কেহ বায়োলা-ওডোরেটা ও কাফি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। অন্ত্যন্ত গুরুতর উপসর্গ ও পরিণামফল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রোগ স্বরূপ। উহাদের বিস্তারিত চিকিৎসা সেই সেই রোগের অন্তর্গত। এহলে সংক্ষেপে কতকগুলির বিষয় উল্লেখ করা গেল। পীড়কা সম্যক প্রকারে প্রকাশিত না হওয়াতে অথবা বসিয়া যাওয়াতে যদি গাত্র নীতল হইয়া পড়ে ও অবসন্নতা জন্মে, তবে বারংবার ক্যান্ধর সেবন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে; আক্ষেপ জন্মিলে জেলসেমিনম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বিশেষরূপে বক্ষঃস্থল আক্রান্ত হইলে, এমোনিয়ম কার্বনিকম ১ ক্রম ফলপ্রদ; কেহ কেহ ব্রাইওনিয়া ব্যবস্থা করেন। কুসকুস প্রদাহে কসকরাস উপকারী। মস্তিষ্কের উপসর্গে কুশ্রম্ এগেটিকম ব্যবস্থের। গণ্ডমালাধাতুগ্রস্ত রোগীদিগের রোগ শীঘ্র আরোগ্য না হইলে কিয়ৎকাল সলকার সেবন করান আবশ্যকীয়। রোমাস্ত্রী সাংঘাতিক

আকার ধারণ করিলে আর্সেনিকম প্রয়োগ করা উচিত ।

পরিণাম ।—চক্ষুপ্রদাহে—মার্ক-কবো, সলফ, একন, বেল ; কর্ণপ্রাঘ ও বধিরতার—পলস, সলফ, সিলি, মার্ক, হিপার ; গ্রন্থি স্বীততার—মার্ক-আইয়োড, ক্যাক, লাইক ; পুরাতন কাশ ও শ্বসনরোগাদি বক্ষঃস্থলের পীড়ায়—কস, হিপার কা-বাই, স্পঞ্জ, আর্স, কঠ, কার্বো, সলফ ব্যবস্থের ।

### প্রধান প্রধান ঔষধের লক্ষণ ।

(১) একোনাইট ।—তীব্র জ্বর, শুষ্ক কাশ । (২) ব্রাইওনিয়া ।

শীতলা বথ্য সময়ে প্রকাশিত না হইলে অপবা বসিয়া গেলে এবং শুষ্ক-সহকারে ঘর্ষণশূন্য উত্তাপ. শিরোবেদনা, পিপাসা, লেপাবৃত্ত জিহ্বা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হয় । অপব হামে ফুসফুস প্রদাহ উপসর্গ উপস্থিত হইলেও এই ঔষধ উপযোগী । (৩) পুন্সে টিলা ।—ঘমন, উদবোদ্ধদেশে বেদনা, আহাবে অরুচি, ধূসরাত লেপে জিহ্বার গাঢ় আচ্ছন্নতা, মুখ বৈয়স্য প্রভৃতি আমাণয়িক লক্ষণেব প্রাবল্যে পুন্সেটিলা ব্যবস্থের । (৪) এণ্ট-টার্ট ।—হামেন সহিত বায়ুনলী-ভূজ-প্রদাহ উপসর্গ উপস্থিত হইলে এবং শ্বাসের হাঁস ফাঁস বা ঘড় ঘড় শব্দ ও প্রভূত শ্লেষ্মা নিঃসরণ লক্ষণ থাকিলে টার্টার-এমেটিক প্রযুক্ত্য ; অপন, ক্ষত শ্বাস, আকর্ণনে আর্দ্র অন্ন অন্ন কেশঘর্ষণ-ধ্বনি, ও শ্বাস-কৃচ্ছ্র লক্ষণে কৈশিক বায়ুনলীভূজপ্রদাহে ও এই ঔষধ উপযোগী । (৫) ইপিকাক ।—প্রতিনিয়ত বিবগিধা, শুষ্ককাশ, আকর্ণনে বায়ুনলীতে হিম্‌হিস শব্দ লক্ষণে ইহা ব্যবস্থের । (৬) ফসফরাস ।—আবোগ্যোম্মুখ অবস্থায় শুষ্ককাশে, ফুসফুসের পুরাতন নিরেটতার, অথবা যজ্ঞা-সম্ভাবনার এই ঔষধ ফলপ্রদ ।

পথ্যাপথ্য ।—জ্বরের প্রবল অবস্থায় শীতল জল, গর্দের জল, যবের কাণ প্রভৃতি শীত পেষ ব্যবস্থের । কোন প্রকার উত্তেজক দ্রব্য দেওয়া বিহিত নহে । জ্বর উপশম পড়িলে তৃষ্ণ পথ্য দেওয়া বাইতে পারে । দৈবদ্রব্য জলে গামছা ভিজাইয়া প্রতিদিন দুই তিন বার গোপীর গাত্র মোছাইয়া তৎক্ষণাৎ আবার শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা উষ্ণ শুষ্ক করিয়া দিবে । এই বোগে বাবংবার রোগীকে বস্ত্র পরিমিত্যগ কবান উচিত ।

প্রতিষেধক ।—হামের প্রাদুর্ভাব সময়ে বালকদিগকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে এক মাত্রা পলসেটিনা ও সায়াছে এক মাত্রা একোনাইট সেবন করাইলে উহার সংক্রমণ ও আক্রমণ নিবারিত হইতে পারে ।

## [৫] আরক্ত জ্বর—স্কার্লেটফিবার-স্কার্লেটিনা ।

আরক্ত জ্বর এক প্রকার সংক্রামক বোগ । ইহা এদেশে প্রায়ই হয় না । এই রোগে বালকেবাই প্রধানতঃ আক্রান্ত হয় । দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসর বয়সেই ইহাব আক্রমণেব বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায় । এই জরে গাত্রে রক্তবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে আরক্ত জ্বর বলে

লক্ষণ ।—আরক্ত জ্বরেব পূর্বরূপ পাঁচ দিন বিদ্যমান থাকে । অনন্তঃ কম্প, গাত্রতাপ, ক্রান্তনাড়ী, পিপাসা, গলাবেদনা, শিরঃপীড়া, পৃষ্ঠবেদন ও বমন প্রভৃতি জ্ব-লক্ষণ মহাকায়ে এই বোগ প্রকাশিত হইয়া পড়ে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিবসে রক্তবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয় । এই সকল পীড়ক প্রথমতঃ গীবা ও বক্ষঃস্থলে, তৎপরে বৃহৎ বৃহৎ সন্ধিস্থানে, অনন্তর সর্বাস্থে প্রকাশ পায় । পীড়কা গুলি অতিশয় ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্মপ্র হইয়া থাকে । কিন্তু চক্ষোপরি এত উন্নত হয় না যে স্পর্শ কবিলে অনুভব করা যায় । চতুর্থ বা পঞ্চম দিবসে পীড়কা সকল হ্রাস পাইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে একেবারেই অন্তর্হিত হয় । এই বোগেও মহাবিকা এবং রোমান্টিকাব ছাব উপজ্বক আলিত হইয়া থাকে ।

আরক্ত পীড়কা, গাত্র ও রক্তে অত্যন্ত উত্তাপ (১০৫ তাপাংশ), রক্তবর্ণ ও উন্নত জিহ্বা-কণ্টক, এবং গলাবেদনা আরক্ত জ্বরেব বিশেষ পরিচয়-লক্ষণ ।

আরক্ত জ্বর ও রোমান্টিকাব প্রভেদ এই যে, রোমান্টিকার পীড়কা অসমগাত্র । রোগীর স্বকের উপর হাত বুলাইলে এই অগমতা বিলক্ষণ অনুভূত হয় । আরক্ত জ্বরেব পীড়কায় এ প্রকাব বন্ধুরতা থাকে না । রোমান্টিকার পীড়কা দীর্ঘ কৃষ্ণমিশ্রিত রক্তবর্ণ, আরক্ত জ্বরেব পীড়কা

উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ। অধিকন্তু, অশ্রুস্রাব, হাঁচি প্রভৃতি বোমাণ্টিকার প্রথম অবস্থার লক্ষণ সমস্ত সাধারণতঃ আরক্ত জ্বরে বিদ্যমান থাকে না।

আরক্ত জ্বরে কেবল চর্ম আক্রান্ত হইলে রোগ সহজসাধ্য থাকে। চর্ম ও গলমধ্য আক্রান্ত হইলেও তত উৎকট হইয়া দাঁড়ায় না। কিন্তু চর্ম ও গলমধ্য আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে যদি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অবসর হইয়া পড়ে, তবে রোগ অতিশয় সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে এবং ইহাকেই সাংঘাতিক আরক্ত জ্বর বলে। এই প্রকার আরক্ত জ্বরে কপিশবর্ণ জিহ্বা, মুহূঃ ওলাপ অনন্যাক পীড়কা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অপিচ, পীড়কাগুলি দ্রাব্যবিক বর্ণ অপেক্ষা একটু মলিন হয় এবং একবার প্রকাশিত ও একবার বিলুপ্ত হয়। গলমধ্য মলিন, কৃষ্ণবর্ণ ও গলিত হইয়া উঠে এবং তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে বোগী পক্ষত্ব প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার আরক্ত জ্বর এরূপ সাংঘাতিক যে কেবল অত্যন্ত মবল রোগী প্রথম ইহাতে অচিকিৎসিত হইলে রক্ষা পাইতে পারে।

চিকিৎসা।—(১) সামান্ত আরক্ত জ্বরে বেলেডোনা ও একোনাইট পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃতব্য। আরোগোদুঃখ অবস্থায় সলফার উপযোগী। (২) গল-লক্ষণ সংযুক্ত আরক্ত জ্বরে গলায় ক্ষত হইলে মার্কিউরিয়াস উপযোগী; অত্যন্ত ক্ষীণতায় এপিস্ বিধেয়। (৩) সাংঘাতিক আরক্ত জ্বরে প্রারম্ভ-বস্থায় এইলাক্সস বারংবার প্রয়োগ করা কর্তব্য। অপিচ, ব্যাপ্ট, আর্স, এপিস্, জেলস্, এসিড মিউন, কস্, ওপি প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত করা উচিত। বেলেডোনা এ রোগের প্রতিষেধক।

## ডেঙ্গুজ্বর—ডেঙ্গুফিবার।

শিরঃপীড়া, অস্থিরতা, শীত, দুর্বলতা, পৃষ্ঠ, অঙ্গ ও সন্ধিস্থলে ক্ষতীয় বেদনা এবং অল্প বা অধিক জ্বরভাব ডেঙ্গুজ্বরের প্রথম লক্ষণ। ক্রিয়াকাল পরে অর্থাৎ প্রথম পীড়া অম্লভূত হইবার প্রায় দ্বাদশ ঘটিকার মধ্যে গাত্রের রক্তবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয়। এই পীড়কা প্রায় দুই দিবস থাকে। জ্বর কালীন গাত্রতাপ ১০৩ বা ১০৪ অংশ উদ্ধিত

হয় এবং নাক্তী প্রতি মিনিটে ১২০ বার স্পন্দিত হয়। গাত্রতাপ ও নাক্তীর গতির এই বিবর্তিত ভাব কেবল জ্বরের প্রথম অবস্থারই থাকে এবং ইহা সচরাচর সঙ্কটজনক নহে। পীড়কা লীন হইতে আরম্ভ হইলেই জ্বর হ্রাস পড়ে এবং দুই তিন দিন পর্যন্ত জ্বরের প্রায় সম্পূর্ণ বিলয় থাকে। অনন্তর জ্বর বর্দ্ধিত হইয়া দ্বিতীয়বার পীড়কা উৎপন্ন হয়। এই জ্বরের পীড়কা রোমান্টিকার (হাম) জ্বর। ইহা কতিপয় ঘটিকা অথবা অধিক হইলে দুই দিবস থাকে। কখন কখন দ্বিতীয় বারের পীড়কাগুলি শীত-পিত্তের জ্বর দেখায় এবং উহাতে অতিশয় কণ্ডুয়ন থাকে। দ্বিতীয় বারের জ্বর ও পীড়কার পরে রোগী অত্যন্ত দুর্বল ও অপ্রকৃত হইয়া পড়ে এবং তাহার সন্ধিতানে আমবাতের বেদনার জ্বর বেদনা অসহ্য হয়। ডেঙ্গু জ্বর ব্যাপক ও স্পর্শ সংক্রামক। শূনক, বালক ও শিশু সকল-কেই এই জ্বর আক্রমণ করে। এই জ্বরের গাত্রবেদনা বশতঃ শিশুরা যে চকিত হইয়া উঠে উহা আক্ষেপ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। কিন্তু জ্বরের পরে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগেব যে প্রকার যন্ত্রণাকর গাত্রবেদনা থাকে সৌভাগ্যক্রমে বালকদিগের সেরূপ থাকে না।

চিকিৎসা।—প্রথম অবস্থায় প্রাদাহিক লক্ষণে ও গাত্রবেদনার একোনাইট ব্যবস্থায়। তৎপরে অস্থিবেদনা নিবারণার্থ ইউপেটোরিয়াম্ পার ফোলিয়েটম্ বিশেষ কলপ্রদ। দ্বিতীয় বারের আক্রমণে পেশী বেদনার একোনাইটের পরিবর্তে জেলসিমিনম প্রয়োজ্য। পীড়কা উৎপন্ন হইলে শৈথিল্য ঝিল্লী ও চর্ম্মের লক্ষণে রক্তজ্বর ব্যবস্থায়। শরীরের নানা স্থানে ঝিল্লী (খাল) ধরিলে তিরেট্রাম্ এলবম্; গ্রীবা, কক্ষ, বক্ষ (কুচকী) ও অন্তঃস্থিত হইলে মাকু'রি ও ক্রিসেটিস প্রয়োজ্য। পরিণাম ফল নিবারণার্থ ফাইটো, আসেনিক ও সলফার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

## বিলেপীজ্বর—হৌতিক ফিবার ।

ব্রণ, হুস্‌হুস ও সন্ধি রোগাদি হইতে অধিক পরিমাণ জ্বর নিঃসরণ বশতঃ বিলেপী জ্বর উৎপন্ন হয়। যত দিন আশ্রাব বৃদ্ধ থাকে ততদিন জ্বর সম্যকরূপে প্রকাশিত হয় না; কিন্তু অধিক পরিমাণে বা অনেক দিন

পথ্যাস্ত্র প্রাচ্য নিঃসরণ হইতে থাকিলে জ্বর হইবার আশঙ্কা জন্মে । কোন কোন অবস্থায় ষথা, বক্ষঃস্থলে মস্ত-সঞ্চয় ( Effusion ) হইলে অর্থাৎ ফুসফুস-বেষ্টের প্রাচীন প্রদাহে শরীরের বহির্ভাগে আস্রাব নির্গত না হইলেও অল্প অল্প বিলেপী জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে । সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই জ্বর উপশিত হয় এবং প্রত্যুষে বিরাম পড়ে । জ্বরের প্রাবল্লে কম্প ও শীত অক্লান্ত হয়, অনন্তর স্বক্ উত্তপ্ত ও কক্ষ হয়, চক্ষু ও মুখ উজ্জ্বল দেখায় এবং এক মিনিটে ১২০ বাব নাড়ীর স্পন্দন হয় । বোগী আবিগ ও দুর্গন্ধি মূত্র ত্যাগ কবে । প্রথমতঃ কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে অনন্তর বারংবার জ্বরের আক্রমণের পর উদবাসম জন্মে । জিহ্বার মধ্যভাগ শুভ্রবর্ণ লেপাবৃত এবং অগ্র ও প্রান্তভাগ পবিকার ও রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় । সচরাচর তীব্র শিশিঃপীড়া, অস্থিৰতা এবং শবীবের অভ্যন্তরে জ্বালা থাকে । প্রাতে অতি শয় ঘর্ষ নিঃসৃত হইয়া জ্বরের বিরাম হয় । কিন্তু ঘর্ষপ্রাবে রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে । দিবাভাগে জ্বর থাকে না । বিলক্ষণ ক্খাধ উদ্রেক হয় । বারংবার জ্বর হওয়াতে ক্রমশঃ বোগীর বলক্ষণ ও শীর্ণতা জন্মে । বিলেপী জ্বরগ্রস্ত বোগী সহজে বিমর্ষ ও উত্তেজিত হয় কিন্তু কখনই আঁবোগ্যাশায়া নিরাশ হয় না । যতদিন পৃথ্যপ্রাচ্য হয় তত দিন জ্বর থাকে । কিছুকাল পরে উদবাসম জন্মে । এই উদবাসম সুলক্ষণ নহে, কেন না এতদ্বারা রোগীর দুর্বলতা বর্দ্ধিত হয় ।

চিকিৎসা । —বিলেপী জ্বরে লক্ষণাক্রমে চাযনা, ফক্ষরিক এসিড, জেলসিমিনম, ফক্ষবাস, আর্সেনিক, িপাসলফব, সিলিশিয়া, সলফার, ট্যানম্, তাঁষুকস্ আদি ঔষধ ব্যবহৃত হয় ।

## সবিরাম জ্বরের রিপোর্টরির সূচীপত্র ।

শীত ।    উত্তাপ ।    ঘর্ম্ম ।    বিরাম ।

অভাব ...	১	৩২	৪৮	৬২
বিদ্যমানতা ..	১	৩২	৪৮	৬২
পূর্বলক্ষণ ...	৪	৩৩	৪২	...
উপস্থিতির সময়	৫	৩৩।৩৬-আ	৪২	...
আরম্ভ-স্থান ...	৯			...
অবস্থান-স্থল .	১০	৩৩।৩৬-আ	৫৩	...
প্রকৃতি ...	১৩	৩৩	৪২	...
সতাপ ...	১৪	.	...	...
সকলপ .	১৬	৩৭	৫২	...
হ্রাস ...	২৯	৪৭	৫২	...
বৃদ্ধি ...	৩০	৪৭	৫২	...
পর-লক্ষণ ...	৩২	৪৮	৬১	...

লক্ষণ বা উপসর্গ :—

অঙ্গ .	২৪	৪১	৫৭	৬৫
অঙ্গ-বর্দ্ধি ...	২৭	৪৪	...	...
অট্টেতত্ত্ব ...	২৮	৪৫		...
অভিসার ..	১৯	৩৭	৫৬	৬৩
অধিক কথা ..	২৫	৪২	৫৭	...
অঙ্গ .	১৮।২৩	...	...	৬২
অপস্মার ...	...	৩৮	...	...
অবশতা ..	২৫	৪২	...	...



## শীত । উত্তাপ । ঘর্ম্ম । বিরাম ।

লক্ষণ বা উপসর্গ :—

অবসন্নতা	.. ২০	.	৫৬	...
অবস্থান-পরিবর্তন	...	৪২	...	...
অঙ্গ	.. ...	...	...	৬৮
অঙ্গসত্তা	... ২৪	...	.	...
অশ্রুস্রাব	... ২৩	৪১	...	...
অস্থি	... ১৮	৩৬অ।	৫৬	৬১
অস্থিরতা	...	৪৩	৫৮	৬৭
অস্বচ্ছন্দতা	... ২৮	..	...	...
অক্ষি (চক্ষু দ্রষ্টব্য) ।			...	..
আকাজিকা		৪০।৪১।৪২	...	১৪
আক্কেপ	... ২৭	৩৭	...	..
আড়ামোড়া	... ২৭	■	...	..
আবৃত থাকার ইচ্ছা	১৯	৪৫	৫৬	৬৩
" " অনিচ্ছা	১৯	৪৫	৫৯	৬৩
আমাশয়	... ২৭	৪৪	...	৬৪।৬৮
আমাশয়-গহ্বর	.	৪৩	...	...
আলোক	... ২৪।২৫	৪১।৪২	...	৬৫
আহার	... ২১	৪০	.	৬৪
উগ্রতা	.. .		...	৬৫
উৎকর্ষা	.. ১৮	...	৫৫	৬১
উৎক্ষেপ	... ২৩	...	...	...
উত্তাপ	.. ..	...	...	৬৫
উদর	... ১৮	৩৬অ।	৫৫	৬১
উদরোর্ক	... ..	৩৮	..	...
উদগার	... ২০	...	...	৬৩.

# শীত । উত্তাপ । ঘর্ম । বিরাম ।

লক্ষণ বা উপসর্গঃ—

উদ্বেদ	...	...	৫৬	...
উপদাহিতা	...	২৩	...	...
উষ্ণ	...	২৭	...	...
উষ্ণতা	...	২৯	৪৭	...
একাকী থাকা	...	...	...	৬১
ওষ্ঠ	...	২৪	৪১	...
কটি	...	২৫	৪২	...
কণ্ঠ	...	২০	...	...
কণ্ঠ	...	...	৪৫	...
কণ্ঠ	...	২৭	...	...
কপাল	...	২২	৪০	...
কপ্প	...	২৮	৪৩/৪৫	৫১
কর্ণ	...	১৯	৩৮	৫১
কাতরোক্তি	...	২৫	৪২	...
কাস	...	১৯	৩৭	৫১
কুচকি	...	...	৪১	...
কুস্তন	...	২৭	...	৫৬
কৃমি	...	...	...	৭৩
কেশ	...	২২	...	...
কোষ্ঠবদ্ধ	...	...	৩৭	...
ক্রন্দন	...	...	৪৭	...
খলী	...	১৯	৩৭	...
গন্ত	...	১৮	৩৬/৩৭	...
গলা	...	২৮	৪২/৪৪/৪৫	...
গাত্রোচ্ছল	...	২৩	...	...

# শীত। উত্তাপ। বর্ষ। বিরাম।

লক্ষণ বা উপসর্গ :-

শুশ্রূষা	২৩	...	...	...
গ্রহি	...	...	...	৬৪
গ্রীবা	...	৪০	...	...
বর্ষ	৪৯	৫০	...	৬৮
বর্ষ (নৈশ)	...	...	...	৬৭
বৃষ্টিবৎ অন্ততব	১৮	৩৬ আ	...	৬২
চক্ষু	২০	৩৮	৫৬	৬৩
চক্ষুরতারা	২৬	৩৮	...	...
জাডা	২৪।২৫	৪১	৫৭	...
জল-পান	২৮	৩৭	নিপাসাদ্রষ্টব্য	...
জাহ্নু	২৩	৪১	...	...
জিহ্বা	...	...	...	৬৯
জন্তণ	২৯	৪৭	৫৯	...
উকার	১৯	...	৫৬	৬২
উলিয়াচলা	২৭	...	...	...
ভজা	...	৪৪	...	৬৮
ভামাক	...	...	...	৬৯
তালু	...	৪২	...	৭২
ত্বক্	২৬	৪১	৫৮	৬৭
দন্ত	২৭।২৮	৪৪	৫৮	৬৪
দৃষ্টি	৩৬ আ	৪২	...	৬৬
দুর্কলতা	২৯	৪৭	৫৬।৫৯	৭৩
দৃষ্টি	১৮।৫৬	৪৩	৫৯	৬১
ধৃত হওয়া	২৩	...	...	...
বথ	২৫	...	৫৭	...

( ৫ )

# নীতি । উত্তাপ । ধর্ম । বিরাম ।

লক্ষণ বা উপসর্গ :—

নাড়ী	... ২৫	৪২	৫৭	৬৭
নাশা	... ২০।২৫	৪২	...	...
নিজা	... ২৬	৪৩	৫৮	৬৮
নীরক্ততা	... ..	..	...	৬১
পতনামৃতব...	...	৩৯	.	...
পদ	... ২০	৩৯	৫৬	৬৪
পদাঙ্গুলী	.. ২৮	...	৫৮	...
পক্ষাঘাত	.. ...	৪২	...	...
পানাস্তে উপসর্গ	১৯	৪৫	..	...
পিপাসা	... ২৭	৪৪	৫৮	৬৯
পৃষ্ঠ	... ১৮।২৯	৩৬আ।	৫৮	৬৮
পেশী	... ২৫	৪২	...	৬৩
প্রতিজ্ঞায়	... ১৯	..	...	৬২
প্রলাপ	... ১৯	৩৭	৫৬	...
প্রীতি	... ২৭	৪৪	...	৬৮
বক্ষঃ	... ১৯	৩৭	৫৬	৬২
বদন (মুখমণ্ডল)	২০	৩৮	৫৬	৬৩
বধিরতা	... ..	৩৭	...	...
বয়স	... ২৯	৪৬	৫৯	৭৩
বাচালতা	অধিক কথা জটব্য ।		...	...
বাত	... ..	...	...	৬৭
বায়ু	... ১৮	৩৬আ। ৪৪	...	৬১
বাহু	... ১৮	ঐ	...	...
বিবমিষা	... ২৫	৪২	৫৭	৬৬
বিরাম, পরিহার	...	...	...	৬২

# শীত । উত্তাপ । ঘর্ম । বিরাম ।

লক্ষণ বা উপসর্গ :-

■ পরিকার নহে .	...	..	৬২
বৃক্ক . . . ২৩	.	..	..
বেদনা ... ২৫		৫৭	৬৭
" উদরে ১৮	৩৬আ	৫৬	৬১
" কটিতে... ২৫	.	.	...
"গাত্রঅনাবরণে ২৮	৪২	...	...
" ঘাড়ে ... .	৪২	.	৬৬
" ত্রিকস্থানে ২৬	...	...	...
" পৃষ্ঠে ও পৃষ্ঠবংশে ২৭	৪৪	৫৬	...
" পেশীতে ২৫	...	...	..
" পার্শ্বে . ...	...	৫৮	৬৭
" প্রসববৎ ...	৪১	..	...
" বৃক্কে . . . ২৩	...	...	..
" ভরপ্রাপ্ত অঙ্গে ...	৪২	...	৬১
" মস্তকে ২৩	...	—	৬৫
" মূত্রমার্গে ২৮	...	.	..
" মূত্রাশয়ে ...	৩৬আ	..	৬১
" জয়াযুতে . .	৪৬	...	...
" সন্ধিস্থানে ২৩	...	...	৬৫
" ক্লেদে ... ২৬	...	...	৬৭
বাক্যনেচ্ছা ... ...	৩৯	..	...
ভয় ... ...	৩৯	...	...
মণিবদ্ধ . . . ২৯	৪৪	...	...
মল . . . ...	৪৪	...	...
মস্তক ... ২২	৪০	৫৭	৬৪.

# শীত । উত্তাপ । ষর্মা । বিরাম ।

লক্ষণ বা উপসর্গ :—

মস্তক ঘূর্ণন .	২৯	৪৬	৫৯	৭০
নস্তিক			...	৬২
নাথধরা .	শিরঃপীড়া দ্রষ্টব্য...			...
মাংস	...		...	৬৬
মুখ	... ২৫	৪২	৫৭	৬৬
মুখদণ্ডন ( বদন )	২০	৩৮	৫৬	৬৩
মূত্র	. ২৮	৪৬	৫৯	৭২
মূর্ছা	২১	৩৯	৫৬	৬৭
মোহ	... ১৯		...	...
যকৃৎ	... ২৫	৪২	...	৬৫
রজঃ	. ...	...	...	৬৬
রক্ত	... ১৮	৩৬	...	...
রোমাঞ্চ	... ১৯/২২		...	...
লক্ষণের বৃদ্ধি, বিরতি		...	৫৮	...
লালা	... ২৫/২৬	৪৩	...	৬৭
শব্দ-দেব	.. ২৫	৪২	..	...
শয্যা	. ...	৪০	...	৬১
শরন	... ২৪	৪১	...	...
শরীর	... ২৫/২৭, ২৮	৪২	৫৬	...
শরীর-শাখা	... .	৩৮	.	...
শিরা	. ২৯	৪৬	৫৯	৭৩
শিরঃপীড়া .	মস্তকবেদনা দ্রষ্টব্য .		...	...
শিরোঘূর্ণন...মস্তক ঘূর্ণন দ্রষ্টব্য ।	...		..	...
শীতপিত্ত	... ২৮	৪৬	৫৯	৭৩
শীত	... ..	৪৬	৪৯	৬২

( ৮ )

শীত । উত্তাপ । ঘর্ম । বিরাম ।

লক্ষণ বা উপসর্গ :—

শোধ	...	...	...	৬৩
শাস	...	১৮।১৯।২৬	৩৬মা।৪৩	৫৬।৫৮
শাস-কষ্ট	...	২৬	৩৮	৫৬
শাস-লীর্ষ	...	১৮	৪৩	৫৮
সন্ধি	...	২৩	...	...
স্বর্ঘ্যোত্তাপ	...	২৭	...	...
স্বক	...	...	৪৩	...
স্বায়বীয়তা	...	২৫	৩৮	৫৭
স্পর্শ-স্তান	...	২৬	...	...
স্বর	...	২৩	৪১।৪৭	...
স্বাদ	...	২৭	...	...
স্বরগ	...	...	৪৩	...
হ্র	...	২৮	...	...
হ্রত	...	২২	৪০	৫৭
হ্রত-পদ	...	২০	...	৫৬
হ্রতাকুলী	...	২১	৪০	৫৭
হাঁচি	...	২৭	৪৪	...
জ্বপিঙ	...	২৩	৪১	৫৭
কুধা	...	১৮।২৩	৩৬মা।৪১	৫৫।৫৭
উত্তম	...	...	...	৫৫



## শুদ্ধিপত্র ।

রিপোর্টারি ।				প্রধান প্রধান ঐষধ ।			
পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ ।	শুদ্ধ ।	পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ ।	শুদ্ধ ।
৩	১	নীতোৎপত্তি...জরোৎপত্তি ।		১২	১১	ল্লাসকর...লালাসকর	
৪	১১	খেরিড ... খেরিড ।		১৩	৭	অশক্তি ... অশক্তি ।	
১১	২৭	মোনি ... মেনি ।		১৫	১৬	ঈতের ... ঈতের ।	
১৪	৬	পলিস ... পলিপ ।		৪১	৭	চায়ন ... চায়না ।	
১৬	১৩	বিকশ ... বিকন্ন ।		৫০	২	ভিয় ... ভিয় ।	
২৬	২০	ত্রিকাহনে...ত্রিকরানে		৬১	৮	মহের ... মহের ।	
২৬	২৫	দৃষ্টি ... দৃষ্টির ।		৬২	২৫	অবিয়ত ... অবিয়ত ।	
২৭	২৩	গুরু ... গুরু ।		৬৪	২৩	অহৃত্য ... তত্রত্য ।	
২৮	৭	পিপার ... পিপাসার ।		৬৯	২	বশেষতঃ...বিশেষতঃ ।	
২৮	১৭	অনাবরণ...অনাবরণে ।		৭৫	৫	বিরজ্জিচিত্ত...বিরজ্জিচিত্ত	
২৮	২১	নঙ্গন ... নঙ্গন ।		৮৭	২৬	জেলসিনিয়মেও...জেলসিনিয়মেরও ।	
৩০	১৮	সেগেনা ... সেনেগা ।					
৪১	১৫	আরোপিয়া...আরোপিয়া		৯০	২৪	রক্ত : ... রক্ত ।	
৫৮	১০	বন্ত ... বন্ত ।		৯১	৯	সত ... সন্তত ।	
৫৮	১০	পিপসা ... পিপাসা ।		৯৫	১৮	করিবা ... করিয়া ।	
৬০	১৪	বুজিয়া ... বুজিয়া ।					



## রিপোর্টরিতে ব্যবহৃত ঔষধের নাম ও সংক্ষিপ্ত নাম ।

আইওডিয়াম ( আইওড ) ।

আরেগিয়া ( আরেগ ) ।

আর্জেন্টাম ( আর্জ ) ।

আণিকা ( আণ ) ।

আর্সেনিক ( আর্স ) । [ পার্শ ] ।

ইউপেটোরিয়াম পার্শিউবিয়াম ( ইউপ  
[ প্যাফো ] ) ।

ইউপেটোরিয়াম পার্ফোলিয়েটম ( ইউপ-

\* ইউওনিয়াম ( ইউন ) ।

ইয়েশিয়া ( ইয়ে ) ।

ইথুসা ( ইথু ) ।

ইপিকাকুয়ানহা ( ইপিক ) ।

\* ইউফরবিয়াম ( ইউফর ) ।

ইলাপ্স ( ইলাপ্স ) ।

ইলেটেরিয়াম ( ইলাট ) ।

একোনাইট ( একন ) ।

এগেরিকস ( এগের ) ।

এস্টার্যা ( এস্ট ) ।

এন্টিমোনিয়ামকুডম ( এন্ট-কুড ) ।

এন্টিমোনিয়ামটার্টারিকম ( এন্ট-টার্ট ) ।

\* এনাকার্ডিয়াম — ( এনাক ) ।

এপিস মেলফিকা ( এপিস ) ।

এমোনিয়াম কার্বোনিকম ( এম-  
কার্ব ) । [ মিউর ] ।

এমোনিয়াম মিউরিয়েটিকম ( এম-

এস্ট্রা গ্রিসিয়া ( এস্ট্রা ) ।

এলষ্টোনিয়া ( এলষ্টোন ) ।

এলুমিনা ( এলু ) ।

এসাফিটিডা ( এসাফ ) ।

এসেয়াম ( এসেব ) ।

ওপিয়াম ( ওপি ) ।

কাকিউলস ( কক ) ।

ককিয়া ( কক ) ।

ককস ফ্লুরিডা ( ককস ) ।

কলচিকম ( কলচি ) ।

কলোসিসিস ( কলোস ) ।

কষ্টিকম ( কষ্ট ) ।

কাঞ্চালাগুয়া ( কাঞ্চা ) ।

কার্বোএনিমালিস ( কার্বো-এ ) ।

কার্বোভেজিটেবিলিস ( কার্বো ভে ) ।

কালোডিয়াম ( কালোড ) ।

কালীআইওডেটম ( কালীআইওড ) ।

কালী-কার্বানিকম ( কালী-কার্ব ) ।

কালীবাইক্রমিকম ( কালীবাই ) ।

কিউরেয়ার ( কিউর ) ।

কুপ্রম ( কুপ ) ।

কোনিয়াম ( কোন ) ।

ক্যান্টিস ( কান্ট ) ।

ক্যান্থেরিস ( কান্থ ) ।

ক্যান্সিকম ( কান্স ) ।

ক্যান্ডর ( ক্যান্ড )।

ক্যামোমিলা ( ক্যাম )। [ কার্ক )।

ক্যালকেরিয়া কার্বনিকা ( ক্যান্ড-  
ক্রিয়োটো ( ক্রিয়োট )।

\* ক্রোকস ( ক্রোক )।

চায়না ( চায় )।

চিনিমসলফিউবিকম ( চিন-সল )।

চেলিডোনিয়ম ( চেলিড )।

\* গ্রাফাইটিস ( গ্রাফ )।

\* গোল্ডজেকম ( গোল্ড )।

জেলসিমিয়ম ( জেলস )।

জিকম ( জিক )।

টারাক্সিকম ( টার )।

ডলকামারা ( ডলকা )।

ডিজিটেলিস ( ডিজি )।

\* ড্রিসিবা ( ড্রিস )।

\* ড্যাফনি-ইণ্ড ( ড্যাফ )।

থুজা ( থুজা )।

\* থেরিডিয়ন ( থেরিড )।

নক্সতমিকা ( নক্স-ড )।

নক্সমশ্চেটা ( নক্স-ম )।

\* নাইট্রম ( নাইট )।

নাইট্রিক এসিড ( নাইট-এসি )।

\* অট্রম কার্বনিকম ( অট্র-কার্ক )।

অট্রম মিউরিয়েটিকম ( অট্র-মিউ )।

পডফিলম ( পড )।

পলসেটিলা ( পলস )।

পলিপোরাস ( পলিপ )।

\* পারিস কোয়াড্রিকোলিয়া ( পারিস )।

পেট্রোলিয়ম ( পেট্র )।

প্লাণ্টেগো ( প্লাণ্ট )।

ফসফরিক এসিড ( ফস-এসি )।

ফসফরাস ( ফস )।

ফিরম ( ফির )।

\* বার্কেরিস ( বার্ক )।

\* বেঞ্জিনম ( বেঞ্জ )।

বেলেডোনা ( বেল )।

\* বোভিষ্টা ( বোভ )

ব্যাণ্টিসিয়া ( ব্যাপ্ট )।

ব্রাইওনিয়া ( ব্রাই )।

ভিরেট্রম এলবম ( ভিরেট-এ )।

ভিরেট্রম ভিরিডি ( ভিরেট-ভি )।

ভেলেবিরানা ( ভেলের )।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্বনিকা ( ম্যাগ্নি-কার্ক )।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকা ( ম্যাগ্নি-  
মিউর )।

ম্যাগ্নেনম ( ম্যাগ্ন )।

মারকিউরিয়স ( মার্ক )।

মারকিউরিয়ালিস ( মারকিউবিরিয়াল )।

মিউরিয়েটিক এসিড ( মিউর-এসি )।

\* মেজেরিয়ম ( মেজ )।

মেনিয়াসিস ( মেনি )।

\* মেবম ভেরম ( মেব )।

\* ক্রটা ( কটা )।

বসটকি কোডেডু ন ( বস )।

\* রোবিনিয়া ( রোব )।

* লরোসিরেসস ( লরো ) ।	সাইমেক্স ( সাইন ) ।
লাইকোপোডিয়ম ( লাইকো ) ।	সিড্রা ( সিড ) ।
* লেডম ( লেড ) ।	সিনা ( সিনা ) ।
লেণ্টাণ্ডা ( লেণ্ট ) ।	সিপিয়া ( সিপি ) ।
লোবিলিয়া ( লোব ) ।	সিলিপিয়া ( সিলি ) ।
ল্যাকনাইস ( ল্যাকনা ) ।	* সোরিনম ( সোর ) ।
ল্যাকেসিস ( ল্যাক ) ।	স্ত্রাবাডিয়া ( স্ত্রাবাড ) ।
* ষ্টানম ( ষ্টান ) ।	* স্ত্রাবিনা ( স্ত্রাবিন ) ।
ষ্টাকিসেগ্রিয়া ( ষ্টাক ) ।	স্ত্রাক্স ( স্ত্রাক্স ) ।
ষ্ট্রামোনিয়ম ( ষ্ট্রাম ) ।	* স্পাইজিলিয়া ( স্পিাজ ) ।
সলকার ( সলক ) ।	হাইওসারেসাস ( হাইওস ) ।
সাইকিউটা ( সিক ) ।	হিপারসলকার ( হিপার ) ।
সাইক্লোমেন ( সাইক্লো ) ।	* হেলিবোরস ( হেলিবোর ) ।

এই সকল ঔষধের শক্তি বা ক্রম সম্বন্ধে সর্বিশেষ বিবরণ মৎকৃত ভৈষজ্য-তত্ত্বের “মাত্রা ও ক্রম” বিচারে দ্রষ্টব্য। \*ষ্টার ( তার ) চিহ্নিত ঔষধগুলি জ্বরে কচিৎ ব্যবহৃত হয়। একত্র উদ্ভাদের বিস্তারিত লক্ষণাদি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয় নাই। রিপোর্টরিভে নাম মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

# সবিরাম জ্বরের রিপোর্টারি

অর্থাৎ

ব্যবস্থা-কোষ ।

শীতের অভিধান ।

\* এনাক, \* এপিস, \* আস, \* ক্যাঙ্ক, কষ্ট, কাম, সিনা, কফি, ইউপ-  
পার্কো, ফির, \* জেলস, হিপ, ইপি, কালী-বা, কালী-কা, ল্যাক-না, লাইক,  
জাট-গি, নজ, পেট্রো, বস, ষ্ট্রাস, সলফ, \* খুজা ।

শীত ।

একন, ইথ, \* এগাব, \* এলস, এলটন, এম্বা, এম-কা, এম-মি, \* এনাক,  
এজ, \* \* এণ্ট, \* এণ্ট-টার্ট, এপিস, \* \* আন ডা, আর্জ, \* \* আণ, \* আস,  
এসাফ, এসাব, ব্যাপ্ট, ব্যাবা-কা, বেল, বেজ, বার্ক. বোভ, ব্রাই, ক্যাষ্ট,  
কালাদ, ক্যান্ড, \* \* ক্যান্ফ, ক্যান্ড, \* \* ক্যান্ড, \* ক্যান্স, কার্কো-এ,  
\* কার্ক-ভে, কষ্ট, \* সিড, \* ক্যাম, চোনিড, \* \* চাষনা, \* \* চিনি-সলফ,  
সিক, \*সিমি, \*সিনা, কক, কক, কলচ ব-গাস, কোন, করণ, ক্রিয়োজ, ক্রোক,  
কুপ, কার, সাইক্ল, ডাক, \* ডিজি, ড্রন, ডক, ইলাট, \* ইলাঙ্গ, \* ইউপ-  
পার্কো, \*ইউপ-পাপু, ইউকব, ইভন, কিব, গ্যান্ড, \* জেলস, গ্রাফ, গোয়াজ,  
গম-গট, হেল, \*হিপাব, হাইরস, \*ইথ, আইওড, \*ইপি, কালী-বা কালী-কা,  
\* কালী-আইওড, \* ল্যাক, ল্যাকনা, লব, \* লেড, লোব, \* লাইক, ম্যান্ড,  
মার, \*মেনি, ম্যান্ড-কা ম্যান্ড-মি, ম্যান্ড-স, মাবকিউরিয়াল, মার্ক, মার্ক-করো,  
\*\*মেক্স, মিউর-এসি, \*নাইট-এসি, \* \*জাট্টি মি, নাট্টি-কা, \*নক্স-ম, \*\*নক্সভ,  
\* \* ওপি, পার, পেট্র, ফস-এসি, \* ফস, প্লাণ্ট, \* পড, পলিপ, সোর,  
\* পলস, \* \* বোব, \* \* বস, কটা, \* \* শ্রাবাদ, শ্রাবি, শ্রাব, শ্রাবা শ্রাস,  
\* \* সিকেল, \* সিপি, \* সিগি, স্পিজি, ষ্টান, \* ষ্টাক, \* ষ্টাম, \* সলফ,  
\* \* টার, থেরিড, \* \* খুজা, ভেথের, \* \* ত্রিয়ার্ট ।

ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

গর্ভপাতের আশঙ্কা,—পলস।

অতিসার উৎপাদক উৎকণ্ঠা,—  
জেলস।

আর্সেনিক অপব্যবহারের পর,—  
ইপিক।

বাতাতপের পরিবর্তন জনিত,—  
\* একন।

পুরাতন রোগী,—এপিস, কষ্ট, জেলস,  
ছাট-মি।

তরুণ রোগী,—একন, ছাট-মি।

বালক,—\* আস', \* ক্যাম, \* সিনা,  
\* জেলস, \* নক্স-ম, পলস।

স্তন, পায়ী শিশু,—এনাক, আস',  
সিনা, ভিরাট।

ওলাউঠার প্রাচুর্যাবস্থানে,—  
ভিবাট।

সহজে সর্দি লাগে,—\* ব্যারা-কা,  
কষ্ট, \* ডলক, সোব।

কচ্ছু-ধাতু,—\* ব্যাবাই-কা, \* ক্যাক,  
সিনা, \* সোর।

ক্লিমিকপ্রদাহের পর,—\* ব্যারা-কা,  
উদ্বেদের পর,—এপিস।

পাণ্ডুর মুখমণ্ডল ও নোলিত ত্বক,  
—\* ক্যাক।

জ্বর, স্বপ্নবিরাম প্রবণতা,—গম-গট  
জেলস, ফস, রস।

জ্বর, আরক্ত জ্বরের পর,—\* ব্যারা-কা

জ্বর, সন্নিপাতে পরিণত হইবার  
সম্ভাবনা,—\* ব্যান্ট, \* মেজ,  
ফস \* রস, \* সিকেল।

অতিসার উৎপাদক ভয়,—\* জেলস।

নূতন কষিত ভূমির প্রভাব জনিত,  
—\* ছাট-মি।

পুষ্টিদেহ,—একন।

ক্ষীণদেহ,—এলম।

কোপণতা,—\* এন্টাক, \* ইগ্রে, \* নক্স।

পারদ অপব্যবহারের পর,—  
নাইট-এসি।

বৃদ্ধবৃদ্ধি,—এলম।

কুইনাইন অপব্যবহারের পর,—  
\* আস', অর্গ, \* বেল, ক্যাক,  
ক্যাপ, কার্বো-ভে, সিনা, \* ফির,  
ইগ্রে, \* ইপিক, ল্যাক, মার্ক, \*  
ছাট-মি, নক্স, থলস, ত্রাক,  
সলফ, ভিরাট।

গণ্ডমালা,—\* ব্যারা-কা, \* ক্যাক, \*  
সিনা।

সমুদ্রকূলে উৎপন্ন,—\* আস'।

সুকুমার ত্বক,—ডলক।

অনুপস্থানের নিকট বাস,—\* সিড,  
ছাট-মি।

শীতপিত্ত—ডলক, ইলাট, রস।

স্থপশককাসের প্রাদুর্ভাব কালে

—\* ড্রস।

জীলোক,—নক্স-ম, \*পলস, \*সিপি।

জীলোক,রজ্জোবৈলক্ষণ্য,—সিপি।

জীলোক, জরানুরোগ,—সিপি।

ঋতু ও কাল।

শরৎকালে,—আর্স, নক্স।

আর্স ও শীতলকালে,—ক্যাক, কা.

কোঁ-ভে, চাথনা, কাব, ল্যাক,

নক্স-ম, পলস, রস, সল্ফ, ভিবাট।

উত্তপ্ত দিন ও শীতল রাত্রিকালে,

—একন।

বর্ষাকালে,—\* আরেণ্ড-ডায়া, সিড,

কার, ডলক, ফিব, জিক্স।

বসন্তকালে,—আর্স, জেলস, ল্যাক।

গ্রীষ্মকালে,—ক্যাপ্‌স, সিড।

উষ্ণকালে,—এণ্ট, \* আর্স, বেল,

ব্রাই, ক্যাক, ক্যাপ্‌স, কার্কো,

সিড, সর্সিনা, \* ইপি, \* ল্যাক,

জাট-মি, পল্‌স, \* সল্‌ফ, থুজা,

ভিরাট।

আর্স হইবার সময়,—সিপি।

শীতঋতুর অবসানে,—আর্স, ল্যাক,

জাট-মি।

শীতোৎপত্তির কারণ।

ক্রোধ—\* ব্রাই, \* নক্স।

উৎকর্ষা—জেলস্‌।

উত্তপ্তদিবস ও শীতলরাত্রি,—

\* একন। [পলস্‌।

আহারের অনিয়ম,—\* ইপিক, \*

অপস্মারের আক্রমণ,—কুপ্রম।

ব্যায়াম,—আর্স, মার্ক, নক্স, সিনি,

সল্‌ফ।

শীতোস্তাপাদিভোগ,—একন, ব্রাই,

ক্যাক, ডলক, রস।

ভয়,—একন, জেলস।

প্রমেহের অবস্থিতি,—থুজা।

শোক,—\* জেলস্‌।

নবকর্ষিতভূমির প্রভাব,—\*জাট-মি

অনুপপ্রদেশের প্রভাব,—সিড।

ঘর্ম্মরোধ,—একন।

বিশ্রামকাল,—ক্র।

গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থিতি,—আর্স

গৃহের উষ্ণতা,—ডলক, ব্রট।

সমুদ্রকূলে গমন,—\*আর্স।

সূর্য্যোস্তাপভোগ,—ক্যাক্‌ট।

অনুপস্থানে গমন,—জাট-মি।

উপদংশের বিদ্যমানতা,—থুজা।

অন্যের স্পর্শ,—স্পিজি।

উষ্ণদেশে বাস,—\*সিড।

বিচরণ,—জাটস।

আর্দ্র হওয়া,—একন, আবেগিনা,  
বাবা-কা, ব্রাই, কাক, ডগক,  
\* রস, সিপি।

### শীতের পূর্বে,—

শৃষ্ঠে বেদনা,—কার্কো-ভে, ইপিক,  
\*\* পডো, বস।

অস্থিতে বেদনা,—চায়না, \* ইউপ-  
পার্কো, ইউপ-পার্লু, জাট-মি,  
থোবিড। [ পার্কো।

অঙ্গে বেদনা,—আর্স, ইলাট, ইউপ-  
বন্ধে বেদনা,—আর্স, প্লাণ্ট মেজ।

শীত শীত অনুভব,—ইলাট, থুজা।

উদর বেদনা,—চায়না।

কাস,—এপিস, \* বস, কমেয়া, \* জ্যাস।

আবৃত থাকিতে ইচ্ছা,—ইউপ-  
পার্কো।

দুর্বলতা,—আর্স, চায়না, কবণ-ফ।

অতিসার,—আর্স, পলন।

শীতের কিছুকাল পূর্বে জলপানেব  
ইচ্ছা—ক্যাপ্স, \* ইউপ-পার্কো।

জলপানান্তে বমন,—\* ইউপ-পার্কো।

উত্তেজনা,—সিড।

চক্ষুর চারিদিকে নীলবর্ণ মণ্ডল,—  
\* সিনা।

চক্ষে জ্বালা,—বসটক্স। [ পার্কো।

চক্ষু-গোলকে স্পর্শঘেষ,—ইউপ-  
মুখমণ্ডলে উত্তাপ,—ট্র্যামো।

মুখমণ্ডলে পাণ্ডুরতা,—\* আর্স, সিনা  
জুব,—সিড, লাইক, \* নক্স।

আমশয়িক উপদ্রব,—এণ্ট।

শিবঃপোড়া,— আর্স, \* ব্রাই, কার্কো-  
ভে, সিড, চায়না, করণ, ইলাট,  
\* পিক, \* জাট-মি, প্লাণ্ট-মে, বস,  
থুজা।

মস্তকে উত্তাপ,—ট্র্যামো।

মস্তকে গুরুত্ব,—ক্যাক্স।

উত্তাপ,—সিড, লাইক, \* নক্স।

উত্তাপাবেশ,—লাইকো।

হৃদবক্ষ,—চায়না। [ট্র্যাক।

ক্ষুধা,—চায়না, সিনা, \* ইউপ-পার্কো।

সন্ধিতে আকৃষ্টতা,—ক্যাক্স।

আলস্য,—জাট-মি।

অঙ্গে আকৃষ্টতা,—আর্স, ব্রাই, \* নক্স।

অঙ্গে উর্দ্ধে আকৃষ্টতা,—আর্স।

অঙ্গে গুরুত্ব,—(নিম্নাঙ্গে),—সিমি।

অঙ্গে বেদনা,—কার্কো-ভে, ইলাট,

ইউপ-পার্কো, ছাট-মি, \*নক্স, রস ।

অঙ্গে দুর্বলতা,—নক্স ।

বিষাদ,—\*\* এন্ট, সিড ।

শ্লেষাবমন,—\* পলস ।

বিবমিষা,—আর্গ, চায়না, সিনা, \*ই-

উপ-পার্কো, +ইপি, লাইকো, ছাট-  
মি, পলস, ছাফু ।

অস্থিবেষ্টে বেদনা,—\* আণ ।

পাটলিকা,—আর্গ (?) ।

লালাস্রাব,—ইপিক, রস ।

কম্প,—ইয়ে, ল্যাক । [ সিড ।

নিদ্রালুতা,—আর্স, কবণ, পলস, থে-

নিদ্রালুতা, জ্বরাবেশেব পূর্বরাত্রিতে

—\* আর্স ।

নিদ্রাহীনতা—এন-ম ।

জ্বরাবেশের পূর্বরাত্রিতে অস্থির

নিদ্রা,—আর্গ, \* চায়না ।

ঠাঁচি,—চায়না ।

অঙ্গমর্দ ( আড়ামোড়াভাঙ্গা ),

—এন্ট-টার্ট, আর্গ, \*আর্স, ব্রাই

\* ইউপ-পার্কো, ইয়ে, ইপিক, \*

ছাট-মি, \*নক্স, সান্ট-নেজ, রস ।

ঘর্ম,—করণ, \* নক্স, ছাফু, ভিনাট ।

ঘর্ম, পরিশ্রমাস্তে,—করণ ।

উরুতেবেদনা,—নক্স ।

শিপিমা,—এলটন, এম-মি. এক, \*

\*আর্গ, বোবাক্স, \*ব্রাই, \*ক্যাপস,

\*\* চায়না, সিনি, \*ইউপ-পার্কো,

ল্যাক, লোন, ছাট-মি, নক্স, পলস,

ছাফু, \*সলফ ।

দন্ত-বেদনা,—কার্কো-তে ।

শিবোঘূর্ণন,—আর্স, ব্রাই, ছাট-মি ।

বমন,—সিনা, \* ইউপ পার্কো, ফির,

লাইকো, ছাট-মি, পলস, সিকেল ।

বমন, পিত্ত,—সিনা, ইউপ-পার্কো ।

বমন, ভুক্তদ্রব্য,—সিনা, ইউপ-পা-

র্কো, ফির ।

বমন, শ্লেষ্মা,—\* পলস ।

বমন, জল,—\* ছাট-মি ।

দুর্বলতা,—আর্স, ছাট-মি, থুজা ।

জ্বন্তুগ,—এন্ট-টার্ট, আর্গ, \* আর্স,

ইলাট, \* ইউপ-পার্কো, ইয়ে,

ইপিক, \* ছাট-মি, নিক, \*

নয়, রস ।

শ্রীত প্রকাশের সময় ।

অপরাক্ষে,—এলম এনাক, এন্ট, আর্জ,

\* আর্গ, \* আর্স, ব্যারা-কা, \*

বোবাক্স, ব্রাই, চেলিড, চায়না,

সিক, কক, ক্রোক, ডিজি,

\* ইউপ পার্কো, ফেলস, কালী-

বা, ল্যাক, লাইকো, মাবকি-



উনিয়াল, নাইটাব, নাইট এসি,  
\* নক্স, পেট্রো, ফস-এসি, ফস,  
পলস, বাথ-ব, রোব, সিলি,  
সলফ, থুজা ।

শয়নকালে,—এলম, এম-কা, আর্স,  
অর, বোরাক্স, বোভ, ব্রাই, কার্কো-  
এন, ক্যাক, চায়না, ড্রস, ফির,  
হিপ, লরো, মার্ক, নক্স, \* ফস,  
রোড, টার্ট-এসি ।

সমস্ত দিবস,—এলম, \*\* সিলি ।

নিবসের বে কোন সময়,—\* আর্স,  
ক্যাক, কালী কা, প্লাট-মেজ, সাস ।

সায়াক্লে,—একন, এগার, \* এলম,  
এম-কা, \* এম-মি, আরেগ-ডা,  
\* আর্গ, আর্স, অর, বেল, ব্রাই,  
\* বোভ, \* ক্যালাড, ক্যাক,  
কার্কো এ, কার্কো ভে, ক্যাম,  
চেলিড, চায়না, \* সিনা, কক,  
সাইক্লে, ডলক, ভিব, জেলস,  
গ্রাক, গোয়াজ, গম-গট, হিপার, \*  
ইথে, কালী-বা, \* কালী-কা, \* ল্যাক,  
ল্যাকনা, \* লাইকো, ম্যাক, মার্ক,  
ম্যাগ-কা, ম্যাগ-মি, ম্যাগ-স, নেজ,  
শাট-মি, শাট-স, \* নাইট-এসি,  
নক্স, \* পেট্রো, ফেল, \* ফস, ফস  
-এসি, প্লাট, পড, সোর, \* পলস,  
রটি, \* রস, শাখু, সারা, \*  
সিপি, সিলি, ষ্টান, ষ্টাক, ষ্ট্রল,

\* সলক, ট্যাবাক, টার্ট-এসি,  
টিউক্লি, টিলিয়া ।

পূর্বরাহ্ণে,—এম, এম, \* আর্স, ক্যাক,  
কোন, কোশ, ইউক. গোয়াজ,  
লেড, \* শাট-মি, \*\* নক্স, সিলি,  
ষ্টাগ, ষ্ট্রল ।

চতুর্দশদিন অস্তুর,—আর্স \* ক্যাক,  
চায়না, পলস ।

অনিয়মিত,—ইথে, মেনি, সিপি ।

—, দিবসের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে,—  
সিপি ।

মধ্য রাত্রির পর,—থুজা ।

প্রাতঃকালে,—এম, \* এগিস, \* আর্গ,  
\* ব্রাই, ক্যাক, কোন, সাইক্লে, \*  
ড্রস, \* \* ইউগ-পার্কো, \* ফির,  
ফেলস, গ্রাক, \* হিপার, কালী-কা,  
লেড, \* লাইকো, মার্ক, শাট-মি,  
শাট-স, \* নক্স, ফস, ফাইটো, \*  
গড, \* \* সিপি, সিলি, স্পিজি,  
থেনিড, থুজা । [ লাইকো ।

প্রাতে-শয্যায় — \* আর্গ, গ্রাক,  
রাত্রিতে,—এলম, এম, \* এগিস.

আর্জ, বেল, বোভ, কার্কো-এ,  
কার্কো-ভে, কঠে ফির, গম-গট,  
হিপার, আইরিস, \* কালী-আই-  
ওড, ম্যাগ-স, \* মার্ক, মিউন-এসি,  
\* নক্স, ওপি, \* ফস, সিলি, ষ্টাক,  
সলফ. টার্ট-এসি. থুজা ।

রাত্রি কখনও নয়,—\* চায়না ।

সকল সময়েই,—\*এন্ট-টার্ট,\*আর্স,

ব্রাই, চেলিড, চায়না,সিমি,ডিজি,

হাইওন, ইয়ে, মার্ক, সিকেল,

ট্রাম, সলফ ।

প্রতিদিন একই সময়ে,—এন্ট,

এপিস, \* আবেণ-ডা, বোভ, \*

ক্যাক্ট, \* \* সিড, চায়না, \*সিনা,

কোন, \* জেলস, গ্রাফ, হেল,

হিপ,কালী-কা,লাইকো, ম্যাগ-মি,

ফস, জাবাড, স্পিজি, ট্যাণ,

টাক, থুজা ।

একদিন অন্তর একদিন একই

সময়ে,—আরোণ-ডা ।

নিম্নান্তে,—\* আর্গ ।

সূর্যাস্তকালে,—ইয়ে ।

প্রতিবৎসর,—\* আস, কার্কো-ভে,

\* লাক, সলফ, থুজা ।

পূর্বাহ্ন ১টার সময়,—আর্স, ক্যাক্ট,

পলস, সিলি ।

পূর্বাহ্ন ২ টার সময়,—\* আস,

ক্যাক্ট, হিপ, সিং ।

পূর্বাহ্ন ৩ টার সময়,—এন-মি,

ক্যাক্ট, \* সিড, লেড, জাট-মি,

সিলি, থুজা ।

পূ-৪টার সময়,—একন,এম মি,আর্গ,

কোন, জাট-মি, সিলি ।

পূ-৫টার সময়,—চায়না, কোন, ড্রস

জাট মি, পলিপ সিলি ।

পূ ৬টার সময়,—\* আর্গ, বোভ,ড্রন,

গ্রাফ, \* হিপ, জাট-মি, নক্স,

সিলি, ট্রাম, \* \* ভিবাট ।

পূর্বাহ্ন ৭টার সময়,—বোভ, ড্রস,

\*ইউপ-পার্কো, ফিব গ্র ফ, \*হিপ,

জাট মি, নক্স-ন, নক্স, \* \* পডো,

সিলি, ট্রাম ।

পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত

একদিন,১২টার সময় পরদিন

—\* ইউপ-পার্কো ।

পূর্বাহ্ন ৮টার সময়,—বোভ, কক,

ড্রস, \* ইউপ-পার্কো, লাইকো,

মেজ, জাট মি, পলস, সলফ ।

পূর্বাহ্ন ৯টার সময়,—এলটন, \*

ইউপ-পার্কো, ইপিকা, কালি-কা,

ম্যাগ-কা, মেজ, জাট-মি, কস-

এসি, সিপি, টাক, সলফ ।

পূর্বাহ্ন, ১০টার সময়,—এলটন,

আর্স, ক্যাক্ট, কার্কো-ভে, চি-

নিন-সলফ, ইউপ পার্কো, লেড,

\* \* জাট-মি, পেটো, কস-এসি,

পলিপ, রস, জাক, সিপি, সিলি,

টান,সলফ, থুজা । [ ক্যাক্ট ।

পূর্বাহ্ন ১০।০ টার সময়,—মোব,

পূর্বাহ্ন ১১টার সময়,—\* ক্যাক্ট

কার্কোডে, কাম, চিন সলফ, হাইওস, ইপিফা, লোব, \*\* ত্রাট-মি, \*\* নক্স, ওপি, পলিপ, পলস, \* সিপি, সিলি, সলফ ।

পূর্বাহ্ন ১১টার সময় একদিন অ-পরাহ্ন ৪টার সময় পরদিন.  
—ক্যাক ।

পূর্বাহ্ন ১১টা হইতে ১২টা পর্যন্ত,—কালী-কা, কোবা-ট ।

পূর্বাহ্ন ১২টার সময়,—এন্ট, ই-নাট, ইউপ-পার্কো ফিব, কাক, মার্ক-সল, নক্স, সিলি, সলফ ।

অপরাহ্ন ১টার সময়,—\* আস, ক্যাট, ক্যাড, সিনা, ইলাট, লাক, মার্ক-সল, নক্স-ন, কস, পলিপ, পলস, সিলি, সলফ ।

অপরাহ্ন ১টা হইতে ২টা পর্যন্ত,  
—আস, ইউপ-পার্কো, ত্রাট-নি ।

অপরাহ্ন ২টার সময়,—\* আস, \* ক্যাক, ক্যাড, সিক, ক র, \* ইউপ-পার্কো, জেনস, প্লাণ্ট মেজ, সিলি, সলফ ।

অপরাহ্ন ৩টার সময়,—\* \* এক, \* এন্ট টাট, \* এপিস, আস এগাক, ক্যাড, \*\* সিড, \* চিন সলফ, সিক, কক, কোন, কার, ফির, লাইকো, পেট্রো, পলিপ, আবাড, আব, সিলি, টা, থুজা

অপরাহ্ন ৪টার সময়,—এনাক, \* এপিস, আস, এগাক, বোড, ক্যাড, কট, \* সিড, ক্যাম, কোন, গম-গট, জেলস, গ্রাফ, হেল, হিপ, হাপকা, কালী-আই ওড, লাইকো, নাগ-মি, ত্রাট মি, \* নক্স, পেট্রো, কস এগি, পলিপ, \*\* পলস, আব, সিপি, সিলি ।

অপরাহ্ন ৫টার সময়,—এনাক, এন-নি এপিস, আস, বোড, ক্যাড, ক্যাড, কার্কো-এন, \* সিড, চাবনা, কোন, গম-গট, জেলস, গ্রাফ, হেল, হিপ, \* কালী-কা, কালী-আই ওড, নাগ-কা, ত্রাট-মি, নয়-ম, \* নক্স, রস, আবাড আব, সাবাসি, সিপি, সিলি, সলফ ।

অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৬টা পর্যন্ত,—\* কালি কা, কস, সলফ ।

অপরাহ্ন ৬টার সময়—এন-মি, এন্ট টাট, আর্জ-না, আস, বেল, বোড, ক্যাড, ক্যাপ, কার্কো এ \* সিড, গ্রাফ, গম-গট, হেল হিপ, \* কালী-কা, কালী-আই ওড, লাইকো, নাগ-মি, ত্রাট মি, \* নক্স, নক্স-ম, \* পেট্রো, ক এগি, কস বস, আব, সিপি, \* সিলি, সলফ, থুজা ।

অপরাহ্ন ৭টার সময়,—এনাক.

গি, আর্স, \*বোভ, ক্যাঙ্ক, ক্যাঙ্ক,  
কার্কো-এন, \*সিড, গ্রাফ, \*গম-  
গট, হেল, হিপ, কালী-আইওড,  
লাইকো, মাগ-কা, মাগ-মি,  
জাট-মি, নল্ল, পেট্র, কস-এসি,  
কস, \*\*রস, সিলি, সলফ, থুজা ।

অপরাহ্ন ৮টার সময়, —এলম, আর্স,  
বাবা-কা, \* বোভ, ক্যাঙ্ক, কা  
কো-এন, কক, ইলাপ্স, গ্রাফ,  
গম-গট, হেল, হিপ, কালী-আই-  
ওড, মাগ-কা, মাগ-মি, নল্ল,  
কস-এসি, রস, সিলি, সলফ ।

অপরাহ্ন ৯টার সময়, —আর্স, \*বো-  
ভ, ক্যাঙ্ক, কার্কো-এন, গম-গট,  
জেলস, মাগ-কা, মারকিউরি  
বাগ, নল্ল-ভ, নল্ল-ন, কস-এসি,  
রস, সিলি, সলফ ।

অপরাহ্ন ১০টার সময়, —আর্স, \*বো-  
ভ, ক্যাঙ্ক, কার্কো-এন, চিনি-  
সলফ, ইলাপ্স, কালী-আইওড,  
মাগ-কা, পেট্রো, কস-এসি,  
জাবাড ।

অপরাহ্ন ১০টার সময়, —আর্স, \*  
ক্যাঙ্ক, ক্যাঙ্ক, কার্কো-এ, সলফ ।  
অপরাহ্ন ১২টার সময়, —আর্স,  
ক্যাঙ্ক, কট ।

## শীতের আরম্ভ ।

উদরে, —\*এগিস, কার, \*ইথে, ভিরাট  
জামু ও গুলফের মধ্যস্থানে, —\*  
চারনা, ল্যাক, পলস ।

বাম বাহুতে, —নল্ল-ন ।

দক্ষিণ বাহুতে, —\*মারকিউরিয়াল ।

দক্ষিণ বাহুতে ও বুকের দক্ষিণ  
পার্শ্বে, —\* মারকিউরিয়াল ।

বাহু দিয়ে, —\* বেল, ডিঞ্জ, হেল, \*  
ইথে, মেজ, প্লাট । [সোয় ।

বাহু উর্দ্ধভাগে ও উরুদেশে, —  
— — — ও তথা ইহাতে

বুকে পিঠেসম্প্রসারণ, —\*ইথে  
পৃষ্ঠে : —আর্জ-মে, ব্যাপ্ট, বোভ,

ক্যাঙ্ক, ক্যাঙ্ক, \* \* ক্যাপ্স, ডলক,  
\* ইউপ-পার্শ্বে, \* ইউপ-পার্শ্বে,  
জেলস, \* গম-গট, কালী-আইওড,  
\* ল্যাক, লেড, \* লাইকো, জাট-  
মি, \* \* পলিগ, সারাস, সিপি, স্পঞ্জ ।

পৃষ্ঠ, কটিদেশে : —\* ইউপ-পার্শ্বে,  
জেলস, ল্যাক, জাট-মি ।

পৃষ্ঠে, কক্ষাহির মধ্যবর্তী প্রদেশে :  
—\* ক্যাপ্স, লেড, \* \* পলিগ,  
সারাস, \* সিপি ।

বক্ষঃস্থলে : —\* এগিস, আর্স, \*  
কার্কো-এ, সিক, সিনা, মারকি-  
উরিয়াল, নল্ল, \* সিপি, স্পঞ্জ ।

বন্ধস্থলে, দক্ষিণ পাশ্বে :— \*

মারকিউরিয়াল ।

মুখমণ্ডলে :— ব্যারা-কা, বাক্স, \* কষ্ট,

ক্রিয়োজ, পেট্রো ।

পদে :— এপিস, আর্গ, \* চেলিড,

সিমি, জেলস, \* হাইওস, কালী-

বা, ম্যাগ-কা, \*\* ছাট-মি, নক্স-ম,

\* নক্স-ড, স্ত্রাবাড, \* সিপি, সলফ ।

পদতলে :— ডিজি ।

হস্তাঙ্গুলীতে :— \* ব্রাই, ডিজি, মেনি,

• ছাট মি, \* সিপি, সলফ ।

হস্তাঙ্গুলীর অগ্রভাগে :— \* ব্রাই ।

হস্তাঙ্গুলী ও পদাঙ্গুলীতে :— \* ব্রাই,

ডিজি, মেনি, ছাট-মি, \* সিপি,

ষ্টান, সলফ । [স্ত্রাবিন ।

দক্ষিণ পদে :— চেলিড, লাইকো,

হস্তে :— \* চেলিড, ডিজি, ইউপ-পার্কো,

জেলস, \* নক্স, স্ত্রাবাড, সলফ ।

বামহস্তে :— \* কার্কোভে, নক্স-ম ।

হস্তের তালুতে— ডিজি ।

হস্তে ও পদে :— এপিস, ব্রাই,

কার্কোভে, চেলিড, ডিজি, জেলস,

\* ছাট-মি, নক্স-ম, ওপি, স্ত্রাবি,

স্ত্রাবু, সলফ ।

মস্তকে :— ব্যারা-কা, ছাট-মি, ষ্টান ।

জ্ঞানুতে :— এপিস ।

জজ্ঞায় :— চায়না, কালী-বা ।

নিম্নাঙ্গে— \* নক্স-ম ।

ওঠে :— \* ব্রাই ।

ঘাড় :— ষ্টাফ, ভেলোব ।

নাসিকায় :— সলফ, ট্যারোজ ।

আমাশয়-গহ্বরে :— \* বেল, ক্যাফ ।

উরুতে :— \* খুজা, থেরিড ।

পদাঙ্গুলিতে :— \* ব্রাই, \* ছাট-মি \*

সিপি, সলফ ।

পদাঙ্গুলীর প্রান্তভাগে :— ব্রাই ।

— \* —

শীতের অবস্থান ।

উদরে :— \* ইথ, \* এপিস, ক্যালাড,

ক্যান, চেলিড, কার, \* ইথে, \*

মেনি, \* মার্কিউরিয়াল, \* মার্ক,

মেজ, \* ওপি, পার, \* ফস-এসি, \*

পলস, সলফ, ভিরাট ।

উদর হইতে পদ ও হস্তাঙ্গুলী

পর্য্যন্ত :— ক্যালাড ।

বাহুদ্বয়ে :— \* বেল, ক্যাফ, ক্যান,

সিক, ডিজি, হেল, ইথে, কালী-

বা, \* মেজ, ওপি, \* পলস, \* সিপি,

সলফ, ভিরাট । (\* রস ।

বাহুতে, বাম :— \* কার্কোভে, \* নক্স-ম,

বাহুতে, দক্ষিণ :— মার্কিউরিয়াল ।

উপরে উত্থান :— \* একন, এম-মি,

বেনজিন, কষ্ট, সিনা, ককি, ইউপ ।

পার্কো, জেলস, \*হাইওস, কালী-  
বা, \*স্তাবাড, \*সলফ ।

উপরে উত্থান, পদ হইতে বক্ষঃ  
পর্য্যন্ত :—একন, বেনজিন ।

উপরে উত্থান, পদ হইতে গ্রীবা  
পর্য্যন্ত :—কফি, বেনজিন ।

উপরে উত্থান, উর্দ্ধদেহ হইতে মস্তক  
পর্য্যন্ত :—সিনা ।

পৃষ্ঠে :—এগার, এলম, এল, এগিস,  
আর্স, বেল, বোভ, \* ক্যান্ট,  
ক্যান্ফ, ক্যান্ফ, \* ক্যান্ফ, ক্যান্ফ,  
কার্কো-এন, সিড, কানো, চেলিড,  
কক, ককু কোন, ফ্রোক, ডক,  
ইউপ-পার্কো, \*ইউপ-পার্কু, জেলস,  
হাইওস, ইথে, ইপিক, কালী-  
বা, কালী-আইওড, \*ল্যাক, \*লেড  
লোব, \* লাইকো, মাগ-কা, \*  
মেনি, \*নক্স, \*জাট-মি, ওপ, কস,  
\*পলিপ, \*পলস, স্তাবাড, স্তাবা,  
সিপি, টাক, \*ট্রামো, \* \* সলফ,  
ভেলের, তিবাট ।

পৃষ্ঠে, বেন জলনীচে নামিতেছে—  
এগার ।

পৃষ্ঠে, কক্ষান্তির মধ্যবর্তী প্রদেশে :—  
\*ক্যান্স, \*পলিপ, স্তাবা, সিপি ।

পৃষ্ঠে, নিম্নদেশে :—লেড ।

পৃষ্ঠে, নীচে অবনমন :—এগার, এগিস,

বেল, ক্যান্ফ, \*ক্যান্ফ, কার্কো-এ  
চেলিড, কক, ফ্রোক, ইউপ  
পার্কো, ইপিক, কস, লোব, টাক,  
\* ট্রামো, ভেলার ।

পৃষ্ঠে, আমাশয় গহ্বর পর্য্যন্ত অব  
নমন :—বেল ।

পৃষ্ঠে, উর্দ্ধে গমন :—এম-মি, আর্স, ই-  
উপ-পার্কো, \*জেল, \*হাইওস, ইপিক  
কালী-বা, কালী-আইওড, ল্যাক,  
মাগ-কা, পলস, স্তাবাড, সলফ ।

সমস্ত শরীরে :—এলম, এনাক, এণ্ট-  
টার্ট, আর্গ, আর্স, \*ক্যান্ফ, ক্যান্ফ,  
কার্কো-এ, \* কার্কো-ভে, সিড,  
চেলিড, \* \* চায়না, চিনি-সলফ  
সিক, সিম, কক, কোন, কিউর,  
ডিজি, ডলক, ইউপ-পার্কো, ফির,  
গ্যাথ, জেলস, গ্রাক, হিপ, হাই-  
ওস, \*ইথে, কালী-আইওড, ল্যাক,  
লাইকো, মেনি, \*নারকিউরিয়াল,  
মার্ক, মেজ, \*নক্স-ম, \* \* নক্সভ, \*  
ওপ, \*পেট্রো, কস-এসি, পলস, \*  
রস, সিকেল, \* সিপি, \* টাক, \*  
ট্রামো, \* তিবাট ।

মুখমণ্ডল ও জননেন্দ্রিয় ব্যতীত  
শরীরে :—এম ।

শরীরের সম্মুখভাগে :—\*ক্যান্ফ ।

পশ্চাৎভাগে :—ইথে ।

উর্দ্ধাংশে :—\* মোনি, কস, রস ।

বক্ষস্থলে:—\* এপিস, \* কার্কোএ, নিক,

সিনা, ইথে, \* মাংকিউরিয়াল,  
পার, সিপি, \* সলফ।

অবনমন:—এগাব, ব্যাবা-কা, কষ্ট,

নিক, \* ফস, \* ভিরাট।

অবনমন মস্তক হইতে পদাঙ্গুলী  
পর্যন্ত—ভিবাট।

উদরোর্ত্তে:—আর্গ, ব্যাবা-কা, বেল।

শাখা হইতে মুখমণ্ডল ও মস্তক—  
একন, \* জেলস।

মুখমণ্ডলে:—ব্যাবা-কা, বার্ক, কষ্ট,  
ক্রিয়াজ, পেট্রো।

মুখমণ্ডলের বামপার্শ্বে, মধ্যরাত্রির  
পর:—ড্রুগ।

পদে:—এলস, চেলিড, হাইওস, ইথে,  
\* নেজ, \* ওপি, \* সিপি, \* সিলি।

পদতলে:—ভিজি।

জননেন্দ্রিয়ের বরফবৎ শীতলতা:—  
\* \* সলফ।

হস্তে:—\* ক্যাষ্ট, চেমিড, \* নেনি,  
\* বার্ক, \* ওপি (শীতাবস্থায়  
লক্ষণ দ্রষ্টব্য)।

হস্তপদ শীতল, শরীরের অবশি-  
ষ্টাংশ উষ্ণ:—\* নেনি।

মস্তকের পশ্চাৎপ্রদেশে:—ডলক,  
টাক। [ ভিরাট।

মস্তক হইতে শাখা পর্য্যন্ত:—

বক্ষস্থলে:—\* বেঞ্চ।

দক্ষিণবক্ষস্থলে:—\* মারকিউরিয়াল।

দক্ষিণ জাম্বুর, বরফের ন্যায়  
শীতলতা:—চেলিড।

জাম্বুদ্বয়ে:—\* এপিস, \* কার্কো-  
ভে, ইথে, \* ফস, \* সিলি।

জজ্বাদ্বয়ে:—কষ্ট, নিক, কক, কফ,  
ইথে, \* মেনি, \* নক্স, \* ওপি,  
পাব, পলস, \* রস, সিকল,  
সিলি, \* ট্রানো, সলফ।

বামজজ্বায়:—\* কার্কো-ভে।

দক্ষিণ জজ্বাব বরফের ন্যায়  
শীতলতা:—চেলিড, \* স্তাবিন।

জজ্বা হইতে পৃষ্ঠে উত্থান:—কষ্ট।

দক্ষিণ অঙ্গ শীতলজলে থাকার  
ন্যায় শীতল:—স্তাবিন।

কটিদেশে:—ক্যান্ফ, \* পলস, থুয়া।

গ্রীবা হইতে নিম্নে অবনমন:—  
ভেলব।

একাক্ষে:—এব্রা, আর্গ, বেল, ব্রাই,  
\* কষ্ট, ক্যান্ফ, হিপ, \* ইথে,  
ক্রিয়াজ, \* লেড, লাইকো, \*  
নক্স, পার, \* পলস, রস, \* সিপি,  
সিলি, \* স্পিজি, ভিরাট।

ত্রিকাহিতে:—পলস, \* সলফ।

স্বাক্ষ:—কালী-বা, ভিবাট।

পাশ্চাত্যে :—মেনি ।

একপাশ্বে :—আণ, ব্যাণ কা, \*

বাই, \*কার্কো-ভে, \*কষ্ট, চেলিড,

ডিজি, ইলাট, ফিব, লাক, \*

লাইকো. নাইট-এসি, গ্ৰাট-মি,

নকস, \* পার, পলস, \* বস, \*

থুজা, ভার্ক ।

\* বামপাশ্বে :—\* কার্কো ভে. \* \*

কষ্ট, ইলাট, ফিব, লাক + \*

লাইকো, + বস, থুজা ।

দক্ষিণ পাশ্বে :—আণ, + বাই, কষ্ট,

গ্ৰাট-মি, নকস. \* পাব, বস, থুজা ।

দক্ষিণপাশ্বে, বামপাশ্বে'ব উষ্ণতা

সহ :—আণ, বস ।

যেপাশ্বে' শয়ন করা যায় :—আণ ।

আমাশয়-গহবরে :—আণ, বেল ।

## শীতের প্রকৃতি ।

\* শীত ।

শীতলতা :—একন, ইণ, \* এগাব,

এথ, \* এলন, এম-মি, \* এনাক,

\* \* আবেণ-ডা, আণ, আস,

এসার, অয়, ব্যাবা-কা, বেজ,

বোরাল, বোভ, বেল, ক্রস,

\* বাই, ক্যাষ্ট, \* ক্যাক, \* ক্যান্ফ,

ক্যান, ক্যাছ, \* ক্যান্স, কার্কো-

এ \* কার্কো-ভে, ক্যাষ্ট \* কষ্ট \*

সিড, \* চেলিড, \* চায়না, \* সিক,

সিনা, কক, কফ কলোস, কোন,

সাইক্রে, \* ডিজি, ড্রোস, ডলক, \* ই-

লাপ্স, ইউজেন, \* ইউপ-পার্কো,

ইউপ পার্ফ, ইউয়ে, ফিব, জেলস,

গ্রাফ, গ্রাট, হেল, \* হিপ, \* ইমে,

অতিওড, \* ইপিক, জেট, কালী-

বা, \* কালী-কা, \* কালী-আইওড,

ক্রিয়োজ, লাক, মারো, নেড,

\* লাইকো, মাগ-কা, \* মেনি,

মার্কিউবিয়াল, মার্ক, মার্ক-কবো,

\* \* মেজ, মক্ক, নিক. নাইটাব, \*

নাইট-এসি, \* গ্ৰাট-মি, গ্ৰাট-স,

\* \* নজ-ম, নজ-ভ, ওলিন. ওপ,

পাব, \* পেট্রো, ফস এসি, \* ফস,

প্লাস্ট-মেজ, \* পড, সোন, \* পলস,

বাণ-বথ, রাট, \* \* রস, \* স্তানড,

তাহ, ত্রাবা, ত্রাস, \* \* সিকেল,

সিপি, \* \* সিলি, স্পিজি, টাফ,

\* ট্রামো, \* সলক, ট্যাবাক, টিউক,

থুজা, \* \* ভিরাট, ভার্ক. ভাইওলাটি ।

শয্যা পবিত্রাণে শীত, শয্যায়

উত্তাপ :—মেজ ।

একাজ হইতে অন্যাজে শীতের

পরিবর্তন :—\* পলস । [মেজ ।

গায়ে শীতলজন প্রম্ভেপের ন্যায়

শীত :—চেলিড, নেড, মার্ক,



বাহ্যিক শীত : — \*এলম, \*এন্ট-টার্ট, আর্গ, আর্স, ব্যারা-কা, ব্রাই, ক্যাক, ক্যাক্স, চায়না, ডিজি, গম-গট, ইগে, \*ইপিক, মেনি, মেজ, নক্স ম, শ্রাবাড, সিকেল, সিলি, \*ভিরাট ।

বাহ্যিক শীত, আন্তরিকতাপ : — ক্যাক, ইগে । [ শ্রাবাড ।

স্পষ্টবিবামশীল শীত : — নক্স ম.

আন্তরিক শীত : — এলম, এনার্জ, আর্গ, \*আর্স, \*চায়না, শ্রাট-মি, শ্রাট-স, \*পাব, পেট্রো, সোর, \*রস, \*\*সলফ, থুজা, \*\*ভিরাট ।

আন্তরিক শীত, বাহ্যিক উত্তাপ : — আর্গ, বেল, কক, ডিজি, ড্রস, ইগে, শ্রাট মি, থুজা ।

আন্তরিক ও বাহ্যিক উত্তাপ সহ শীত : — \*চায়না, কফি ।

## উত্তাপ সহকারে শীত ।

বাহ্যিক শীত, ও আন্তরিক তাপ : — ক্যাক, ইগে ।

জরের কম্পসহ শীত : — চায়না, \*ড্রস, প্রাক; \*হিপ, মেনি, পেট্রো, \*পডো, পলস, \*রস, ভিরাট ।

যুগপৎ একাঙ্গে শীত ও অন্তরে উত্তাপ সহ শীত : — চায়না ।

পর্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ বিশিষ্ট

শীতাবস্থা : — \*এম-মি, \*আর্স, ব্যারা-কা, \*বেল, ক্যাক, চায়না, কক, ডিজি, \*ইলাপ্স, \*হাই ওস, আই ওড, কালী-কা, লরো, লাইকো, \*ফস পলিস, সোব, শ্রাবাড, \*ভিরাট ।

পর্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ বিশিষ্ট শীতাবস্থা, এবং উত্তাপ কালীন আবর্ত ও স্মৃত মুখমণ্ডল : — \*এম-মি ।

পর্যায়ক্রমে শীত ও ঘর্ম্মশূন্য জ্বালকব উত্তাপ : — \*বেল ; শীতোত্তাপ বিমিশ্রিত : — \*আর্স, ক্যাক, ক্যাপ্স, কার্কো-ভে, চায়না, ড্রস, ইপি, শ্রাবাড ।

মস্তক হইতে শাখা পর্যন্ত উত্তাপাবেশ সহ শীত : — একন ।

পৃষ্ঠে উত্তাপাবেশের অবনমনসহ শীত : — কক । [ সিড ।

মুখমণ্ডলে উত্তাপাবেশসহ শীত : —

আন্তরিকশীত, বাহ্যিক উত্তাপ : — \* আর্গ, আর্স, বেল, কক, ডিজি, ড্রস, ইগে, শ্রাট-মি, থুজা ।

বক্তৃৎসব বিশিষ্ট শীত : — \*এগিস, \* \* আর্গ, + বেল, ক্যাক্স,

ক্যাম্ফ, \* হাইওস, \*\* নক্স, \*\*  
ওপি, \*\* ভিরাট ।

গাত্রাবরণে উপশমিত হয়না এরূপ

শীত :—\* ক্যাস্টে, ক্যাহ্ নক্স ।

একই সময়ে এঁকাঙ্গে শীত,

অন্যক্ষে উত্তাপ :—চায়না ।

অধিকক্ষণস্থায়ী শীত :—এণ্ট-টাইট.

\*\* আরে-ডা, \*\* ক্যাম্ফ, \*\*

ক্যাহ্, গম-গট, \* ভিরাট ।

শীতের প্রাবল্য :—\*\* এণ্ট, \*এণ্ট-

টাইট, \*\* আরেগ ডা, বোত, \*

ক্যাম্ফ, \* ক্যাহ্, ক্যাম্প, সিড,

সিনা, ডুস, \* গম-গট, হিপ,

লাইকো, \*\* মেনি, শ্রাট-মি, \*\*

শ্রাবাড, ট্রীফ, থুজা, ভিবাট ।

কম্পকর শীত :—একন, এগার.

এম-কা, এনাক, এণ্ট, \* এণ্ট-

টাইট, আর্স, বেল, বাস, \* ব্রাই,

ক্যাক, \* ক্যাম্ফ, ক্যাহ্, ক্যাম্প,

কাষ্ট, কষ্ট, \* চেলিড, \*\* চায়না,

\*\* চিনি-সলফ, কক, কুগ্রম,

ডলক, \* ইলাপ্স, ইউপ-পার্কো, \*

ইউপ-পার্পু, জেলস, গ্রাফ, \*

গম-গট, \* হিপ, \*\* ইয়ে, আই-

ওড, ইপি, \* কালী-আইওড,

ক্রিয়োজ, \* লরো, \* লেড, \*

লাইকো, লোব, ম্যাগ-ক, ম্যাঙ্গ,

মেনি, মার্ক, \* মিউর-এসি, \* ৭

শ্রাট-মি, শ্রাট-স, \*\* নক্স, \* ওপি.

\* পেট্রো, ফেল, \* ফস-এসি

ফস, \* পড, পলস, \* রস, শ্রাবাড,

শ্রাব, \* সিকেল, সিপি, \*\* সিলি

\* ষ্টাক, ট্রামো, \*\* থুজা, ভিরাট ।

শীত, অল্পকালস্থায়ী :—\* এণ্ট টাইট,

\* ইপি, পলস ।

শীত, অল্প অল্প :—ইউপ-পার্পু, লিড,

লাইকো, ভিবাট ।

শীত, ঘর্ম্মসংযুক্ত :—এণ্ট, আর্স, \*

কষ্ট, ডিজি, ইউপ-পার্কো, \*ইউক্রে,

ল্যাক, ওপি, পেট্রো, মোর,

পলস, সাবা, \* ট্রাম, সলফ,

ভিবাট ।

শীত, দন্তসংঘর্ষণ সহ :—আস, ক্যাক,

\* ক্যাম্ফ, ক্যাম্প, চেলিড, ইলাপ্স.

ইউপ-পার্কো, গম গট, \* হিপার,

ইয়ে, \* ল্যাক, \*\* শ্রাট-মিউ, \*

শ্রাট-সলফ, \* নক্স, প্লাট, কন,

বাণ-বব, রস, শ্রাবাড, টাবাক, \*

\* থুজা । [ প্রস্তব্য ।

শীত, পণিশূন্য :—শীতের অভাব

কম্প :—একন, \* এনাক, এক্স, এণ্ট,

আরেগিয়া, \* অ্যাক্স, \* আর্স, ব্যারা-

কা, বেল, ক্যালড, ক্যাহ্,

ক্যানাব, \* ক্যাম্প, কাকো, কষ্ট,

সিড, \* ক্যাম, চেলিড, \* চিন, \*

সিনা, কক, কক, কোন, কিউর,

ডিজি, ডক, ইভন, ফের, হেল, হিপ, হাইওস, ইয়ে, \* ইপিক, কালী-বা, \* কালী-কা, কালী-আইওড, লবো, \* লেড, লাইকো, মায়ে কা মায়ে-স, মেনি, \* মার্ক, মার্ক-কবো, মক, ত্রাট-কা, ত্রাট সল, \* ত্রাট-মিউ, \* নক্স, নক্স-মশ্চ, \* ওলিএণ্ড, \*\* ফস, \* ফস-এসি, প্লাট-মেজ, প্লাট, পলস, রিউম, \* বস, \* রুটা, সাবড, \* স্তাবিন, স্তাবু, \* সিকেল সেনেগা, সোরি, সিপি, \* সিলি, \* সলফ, স্পিজি, টেক, ট্রাম, টাবাক, টিউক, থুজা, ভিবাট, বার্সা, ভাইলা, জিক। [ ডিজি।

কম্পপৃষ্ঠে:—এণ্ট, এপিস, কষ্ট, মিড,

কম্প, শীতলজল নিষ্ক্ষেপজনিতবৎ

--এনাক, এণ্ট-টাট, আণ, আস, \* ব্যারা-কা, ব্রাট, \* চিন, সিম, লেড লাইকো, \* ম্যাগ-কা, \* মার্ক, \* মেজ কস, পলস, \* \* বস, \* সাবড, ট্রাম, স্পিজি, থুজা, ভিরাট, বার্স। ( শীতল জল জনিত শীতেব ত্রায় শীত দ্রষ্টব্য )।

কম্প, দাহ পরিশূন্য, শীতেব পব

ষম্ম সংযুক্ত;—কষ্ট, ক্যাপ্স, সাই-

মেজ। (উত্তাপভাব দ্রষ্টব্য)।

কম্প, রৌমাঞ্চ সহ:—এক, ব্যারা-কা, চিন, ইয়ে, নক্স। ( পরবর্তী পবিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।

কম্প এক পার্থক্য:—বেল, কষ্ট, লাইক, নক্স, পলস, \* রস, থুজা \* বার্স।

কম্প আংশিক:—\* আস, ব্রাট, ক্যাপ্স, কষ্ট-চিন, কক, গ্রাফ, হেল, হিপ, ইয়ে, \* পলস, রস, স্তাবি, স্তাব, স্পিজি, স্পঞ্জ, ষ্টাক থুজা, ভিবাট।

কম্প একাঙ্গীন:—ক্যাম, চিন।

কম্প, স্থানবিকশণশীল:—নক্স।

## উত্তাপ সহ কম্প।

কম্প উত্তাপ সহ পর্যায়ক্রমে:—

\* আস, ক্যাক. বেল, \* দুস, কালী বা, কস-এসি, \* নক্স।

কম্প, পর্যায়ক্রমে কম্প ও মুখমণ্ড

লের উত্তাপ:—ক্যাম, \* সিনা।

কম্প উত্তপ্ত মস্তক ও আরক্ত মুখ,

মণ্ডমলসহ:—\* আণ।

কম্প ও উত্তাপ বিমিশ্রিত,--\* ক্যাম,

\* সিনা, সোব।

কম্প পরবর্তী উত্তাপব্যতীত,--এম-

মিউ, কক।

## জ্বরের প্রকার ।

অগ্রগামী ;—\*আস', \* ব্রাই, চিন,

চিন-সলফ, ইগ্নে, ত্রাট-মিউ, \*নক্স ।

পশ্চাদগামী :—চিন, সিনা, গম, ইগ্নে,

ইপি ।

পরিবর্তনশীল :—ইগ্নে, মেনি, পলস ।

রক্তসঞ্চিত বা দূষিত :—এপিস, \*

\*আর্গ, \* বেল, ক্যাক্টে, \* ক্যাম্ফ,

হাইওস, \* নক্স, ওপি, ভিবাট ।

পাক্ষিক :—আস', \* চিন, পলস ।

(শীতের সময় দ্রষ্টব্য) ।

মাসিক :—নক্স, \*সিপি ।

বার্ষিক :—\*আস', \*কার্কো-ভে, \*ল্যাক

\*সলফ, থুজা ।

আহারান্তিক :—মেবম ।

ঋতুর পরবর্তী :—নক্স ।

অনিয়মিত আবেশ :—\*আস', নক্স ।

\*পলস, স্ত্রাং ।

স্থল বিরাম সদৃশ :—চিন-সলফ ।

প্রাত্যহিক :—একন, আরেণ, আস',

এসাক, বেল, ব্রাই, ক্যাক্টে, ক্যাক,

ক্যাম্প, কার্কো, চিন, সিক, সিনা

\* কিউর, ড্রুস, ইলাপ্স, জেল,

গম, গ্রাফ, ইগ্নে, ইপি, কালী-

কা, ল্যাক, লাইকো, ত্রাট মিউ,

নাইট-এসি, \*নক্স, পেট্রো, কস,

পলস, রস, সাবড, সারা, স্পিজি,

টান, হাক, ট্রাম, সলফ, ভিরাট ।

প্রাত্যহিক দ্ব্যৌকালীন :—বেল,

চিন, \*ইলাট, গ্রাফ, লেড ট্রাম,

সলফ ।

দ্ব্যাহিক :—এলম, এনাক, এন্ট,

আরেণ, \* আস', \*বেল, বোর, \*

ব্রাই, ক্যাম, ক্যাক, \* ক্যাহ,

ক্যাম্প, কার্কো-এ, কার্কো-ভে, \*

চিন, \* চিন-সল, সিক, সিনা,

কোট, ডাক, ড্রুস, ডক, \*ইউপ-

পার্কো, ফের, জেলস, হাইওস,

ইগ্নে, \*ইপি, ল্যাক, \*লাইকো, \*

মেজ, \* \* ত্রাট-মিউ, নক্স-ম, \*

নক্স, \*পলস, রস, সাবড, সারাক,

সলফ, ভিরাট ।

দ্ব্যাহিক দ্ব্যৌকালীন :—আস', চিন,

ডলক, ইউপ-পার্শু, গম, লাইক,

নক্স-ম, \*বস ।

ত্র্যাহিক :—একন, এনাক, আর্গ, \*

আস', বেল, ব্রাই, কার্কো, সিনা,

ক্রিম, ইলাট, \*হাইওস, \* ইগ্নে, \*

আইওড, ইপি, ল্যাক, লাইকো,

\*মেনি, ত্রাট-মিউ, নক্সম, ন-ক্স, \*

পলস, রস, \*সাবড, \*ভিরাট ।

ত্র্যাহিক দ্ব্যৌকালীন :—আস', চিন,

ডলক, ইউপ-পার্শু, গম-গট, লাই-

কো, নক্স-ম, রস ।

সাধারণত এক অবস্থা পরিশূন্যঃ

—\*আর্স।\*

অতিশয় অনিয়মিত অবস্থাসম্পন্নঃ

—আর্স, ইপি, নক্স, ওপি।

শীতকালীন লক্ষণ ।

উদরের ক্ষীততাঃ—সিনা,\*কালী-কা

উদরের শীতলতাঃ—ইথু,এপিস,আর্স

ক্যাম, চেলিড,\*চার্যনা,মেনি, ফস  
এসি, সিকেল ।

উদরের বেদনাঃ—আরেগিয়া,আর্স,

বোভ, ব্রাই, কালাড, ক্যাক,  
চার্যনা, কফি, ইউপ-পার্কো, ইথে,  
শ্যাক, মেফ, মাবকিউরিয়াল,  
মার্ককরো, নাইট-এসি, নক্স,  
প্যালাড, ফস, পডো, পলস, রস,  
রুমেল্ল, সিপি। [ \*পলস।

বায়ু অতিবিক্ত উত্তপ্ত অনুভব,—

বায়ু অতিবিক্ত শীতল অনুভব—

\* ব্যারাই-কা, \* ক্যাক, ক্যাম্প,  
কষ্ট, কফি,সাইক্রে,\*ডিজি, ইলাপ্স  
\*হিপার, কালী-কা,মার্ক\* মেজ\*  
পেট্টো।

উষ্ণ বায়ু শীতল অনুভব,—\*খুজা।

উৎকর্ষা—একন, আর্স, ক্যাক,

ক্যাম্প, নক্স, পলস, ভিরাট।

উত্তম ক্ষুধা—চিনি, সলফ।

বাহ্যর শীতলতা,—বেল।

বাহ্যর পক্ষাঘাতবৎ দুর্বলতাঃ—

ফস এসি। [মেনি

বাহ্যর শিরা প্রসারণঃ—\* চেলিড,  
পৃষ্ঠের খঞ্জতাঃ—ককু।

পৃষ্ঠের বেদনাঃ—এপিস,আর্স,বেল

কাক,\*ক্যাম্প, কার্কোভে কষ্ট,  
\* চিনি-সলফ, ইলাট, \* ইউপ-  
পার্কো, হাইওস, ইথে, ল্যাক,মক্স,  
ক্লেট-মিউ, \* নক্স, প্যালাড,  
পলস, জিঙ্গ।

দৃষ্টিহীনতাঃ—পেট্টো।

রক্ত যেন সঞ্চালিত হইতেছে না

একুপ অনুভবঃ—বোব।

রক্ত যেন শীতল হইয়াছে একুপ

অনুভবঃ—\* রস।

অস্থিতে বেদনাঃ—আরেগিয়া,আর্স,

\* ইউপ-পার্কো, \* ইউপ পাপু,  
ক্লেট-মিউ, \* নক্স, \* সাবাড।

অস্ত্রে বেদনাঃ—ইথু।

শ্বাস শীতলঃ—\*কার্কোভে,ভিরাট

শ্বাস উত্তপ্তঃ—এনাক, ক্যাক, ক্যা-  
মো, \* রস।

শ্বাস দীর্ঘগ্রহণের ইচ্ছাঃ—সিম।

ঘৃষ্টবৎ অনুভবঃ—\* আর্গ।

এক গালের উত্তাপঃ—\* একন,  
আর্গ।

এক গালের আরক্ততাঃ—\* একন

আর্গ, \* ক্যাম, ইপি ।  
 এক গালের আরক্ততা, অপর গা-  
 লের পাণ্ডুরতা ও শীতলতা :  
 \* একন, ক্যাম, ইপি ।  
 গণ্ডদ্বয় শীতল :—চেলিড, \* সিনা,  
 \* পেট্রো, \* রস, সিকেল ।  
 গণ্ডদ্বয় মলিনারক্ত :—\* এলম ।  
 গণ্ডদ্বয় উত্তপ্ত :—\* একন, ব্রাই,  
 ক্যাক, ক্যাম, \* চায়না, \* সিনা,  
 \* লেড, পলস, হোফ ।  
 গণ্ডদ্বয় আরক্ত :—এলম, \* আর্গ,  
 \* চায়না, মারকিউরিয়াল ।  
 বক্ষঃস্থল ভারবোধ :—\* এপিস, \*  
 ব্রাই, সিম, ডাফ, ইপি, ল্যাক,  
 মারকিউরিয়াল, \* মেজ, \* জাট-  
 মিউ, পলস ।  
 বক্ষঃস্থলে বেদনা :—আর্স, বেল,  
 ল্যাক, \* সাবাড, \* রস, সিনেগা ।  
 বক্ষঃস্থলে স্পর্শদ্বৈষ :—ল্যাক ।  
 বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধ :—\* \* ব্রাই,  
 ইউপ-পার্কো, কালী-কা, ল্যাক,  
 \* রস, \* কমেজ, সাবাড ।  
 উদর-বেদনা :—\*\*\* ককু, \* লেড ।  
 মোহ :—বেল, \* হিপার, জাট-মিউ ।  
 টঙ্কার বা দঢ়কা :—\* ল্যাক, মার্ক,  
 নক্স ।  
 প্রতিক্ষায় :—কালাদ, ইলাট ।

কাস :—এপিস, \* \* ব্রাই, ক্যাক,  
 সিনা, ক্রিয়োক, কস, সোর, \* \*  
 রস, কমেজ, \*\* সাবাড, \* সাধু,  
 সলফ ।  
 কাস জলপানে উৎপন্ন :—\*\* সোর  
 আরক্ত থাকিতে পারা যায় না :  
 —ক্যাক ।  
 আরক্ত থাকিতে ইচ্ছা :—আর্গ, ক্যা-  
 ক্ষ, ইউপ-পার্কো, জাট-মিউ, \*  
 নক্স, ফস, \* ট্রায়ো ।  
 আরক্ত হইলেও অনুপশ্ম :—\*  
 ফস, রস ।  
 থলী :—\* সিলি ।  
 রোমাঞ্চ :—\* মারকিউরিয়াল ।  
 প্রলাপ :—\* আর্গ, বেল, জাট-মিউ,  
 নক্স, সলফ, ভিরাট । [ ভিরাট ।  
 অতিসাব :—আর্স, ইলাট, ফস, রস,  
 পানাস্তে কাস :—সিম ।  
 পানাস্তে শিবোবেদনা :—সিম ।  
 শ্বাস-কষ্ট :—\* এপিস, আর্গ, \* জাট-  
 মিউ, নক্স, পলস ।  
 কর্ণ-বেদনা :—গ্রাফ, গম-গট ।  
 কর্ণ শীতল :—সিক, জাট-মিউ ।  
 কর্ণ উত্তপ্ত :—একন, \* ইগ্রে, রাগ-  
 বহ ।  
 কর্ণ আরক্ত :—বেল ।  
 কর্ণে শব্দ :—চিনিব-সলফ ।

কণ্ঠে বেদনা :—এক, \* পডো।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব :—ক্রি-

বোজ।

রক্তের গন্ধের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট

উদগার :—এসাক।

অবসন্নতা :—এছা, আবেগিয়া, ইপি,

মার্কিউরিয়াল।

হস্তপদের শীতলতা ও নীলবর্ণ :

\* ক্যাম্ফ, ষ্ট্রামো।

হস্তপদে থল্লী :—সিড, কুপ।

চক্ষু স্থির :—একন।

চক্ষে বেদনা :—সেনেগা।

চক্ষে আলোকে অসুভবাধিক্য :

—নক্স।

চক্ষে কনকনি :—সিড।

বদন স্ফীত :—\* এম-মিউ, বেল।

বদন নীলবর্ণ :—জাট মিউ, \* নক্স,

পেট্রো, \* ষ্ট্রাম।

বদন শীতল :—\* ক্যাম্ফ, চেলিড,

\* সিনা \* ড্রস, \* হিগাব,

ইথে, \* নক্স, \* পেট্রো, \* প-

লস, রস, \* সিকেল, \* ষ্ট্রাম,

\* ভিরাট।

বদন শীতল ও পতনাবস্থা প্রাপ্ত :

\* ক্যাম্ফ, \* ভিরাট।

বদন উত্তপ্ত :—একন, এগার, এ-

নাক, এলব, এছা, \* এপিস,

\* আর্গ, বেল, বার্ব, ব্রাই,

ক্যাক, ক্যানাব, সিড, ক্যাম,

চায়না, কলোস, ডিজি,

\* ড্রোস, ইউক, \* ফির, জেলস

হেলি, \* হাইওস, জেট, ক্রি-

য়েস, ল্যাক, ল্যাউ, লেড,

লাইকো, মার্ক, মার্কিউরি-

বাল, মেজ, মিউর-এসি, জাট-

কা, নক্স, ওলিও, পলস,

রাণ-বব, \* বস, স্ত্রাবাড, সাঁ,

সেনেগা, ষ্ট্রাক, \* সলফ।

বদন কেবল উত্তপ্ত :—আর্গ।

বদন পাণ্ডুবর্ণ :—এণ্ট-টাট, পেল,

\* ক্যাম্ফ, ক্যাক, চায়না, চিনি-

সলফ, \* সিনা, \* ড্রস, \* হিগাব,

ইথে, নক্স, \* নক্স-ম, \* পলস,

\* সিকেল, সলফ, \*\* ভিরাট।

বদন পাণ্ডুবর্ণ শয়ন কালে :—বেল।

বদনের বামপার্শ্বে বেদনা :—

ড্রোস।

বদনের দক্ষিণপার্শ্বে উত্তপ্ত ও শুষ্ক

:—ড্রোস।

বদনের আরক্ততা :—\* একন, \*

এম-মিউ, আর্গ, আর্স, বেল,

ব্রাই, ক্যাম, চায়না, ডিজি, ফির,

\* হাইওস, \*\* ইথে, ক্রিয়োস,

লেড, লাইকো, মার্কিউরিয়াল,

মার্ক, নক্স, অক্স-এসি, পলস, \* রস,

ষ্ট্রাম, সলফ।

বদনের পর্যায়ক্রমে আবর্ততা ও

পাণ্ডুরতা:—রস ।

মূচ্ছা:—\*ভেলব ।

পদে একবার জ্বালা একবার শীত-

লতা:—গ্রাফ ।

পদ শীতল:—একন, এলম, এক

এণ্ট,\*এপিস, এসাফ, \* ব্যারাই-

কার্ক,\* বেল, বার্ক, বোভ, ব্রোম,

ক্যান্ফ, \* ক্যান্থ, কার্কো-এ, \*

কার্কো-ভে,\*কষ্ট, সিড, চেলিড,\*

চিন, সিম, কফ, কপ, ডিজি,

ড্রোস, ইউপ-পার্প,\*ফেব, জেলস,

গ্রাফ,\*হিপার,\*হাইওস,আইওড,

ইপি, কালী-বা, কালী-আইওড,

ক্রিয়োজ, ল্যাক,\*লাইকো, ম্যাথ-

কা, ম্যান্ড,\* \* মেনি, মার্ক,\* মেজ,

জাট-মিউ, \* নাইট-এগি, নক্স-গ,

\*ওপি, পালাড, পাব, পেট্রো,

\* \* ফস, প্লাণ্ট মেজব, পলিপ, \*

সোর, \*পলস, রস, সাবাড,\*

সাধু, সারাক,\*সিকেল,\* \*সিপি,

সিলি, ষ্টাণ, ট্রাম, গশফ, \* থুজা,

\* \* ভিরাট ।

পদ শীতল ও গাত্রবিস্তারিত:—এণ্ট ।

পদে খল্লী:—ইলাট,\*নক্স ।

পদে অসাড়তা অনুভব:—সিম,\*

পলস, ট্রাম ।

পদে শোথজনিত স্ফীততা:—ইউপ-

পার্কো, কালী-আইওড ।

পদে উত্তাপ:—কালিড, কালী-ক্লোর

পদতলে উত্তাপ:—মার্ক । [এসি ।

পদের ববফবৎশীতলতা:—\*নাইট-

পদেব নীলবর্ণ:—ট্রাম ।

পদেব অবশ্যতা:—ফেব, লাইকো,

নক্স-গ, পলস, সিপি, ট্রান ।

একপদ শীতল অন্যপদ উত্তপ্ত:—

পলস ।

পদে বেদনা:—কোপ ।

পদ আর্দ্রবৎ অনুভব:—ইপি,\*সিপি

পদ যেন শীতল জলে রহিয়াছে

একপদ অনুভব:—ব্রেলস, মার্ক,

সিপি ।

হস্তাঙ্গুলী নীলবর্ণ:—\*পেট্রো ।

হস্তাঙ্গুলী পর্যায়ক্রমে শীতল ও

উত্তপ্ত:—পাব ।

হস্তাঙ্গুলী শীতল:—এক, \* এপিস

\*ক্যান্ট, সিড, ডিজি, মেনি,\*

জাট-মিউ, নক্স, পার, ফস-এসি,

প্লাণ্ট-মেজ,\* সিপি, সলফ, টাব,

ভিরাট ।

হস্তাঙ্গুলীর আচ্ছন্নতা:—ফেব ।

আহারে অরুচি:—কালী-কা ।

আহারে দাদশৃণ্যতা:—আসি ।



কপালে শীতলঘর্ষঃ—চায়না,\*সিনা

কপালে উত্তপ্ততাঃ—\*একন,ক্যাক,

চায়না,\*লেড, জাট-সল ।

কপালে বেদনাঃ—ইউপ-পার্প্,\*

জাট-মিউ । [ডিজি ।

কপালে ঘর্ষঃ—ব্রাই, চিন, সিনা,

জুস্তগঃ—এলম, সিম, ইলাট, \*লাউ-

কো, \*নক্স ।

রোমাকঃ—এঙ্গ, ব্যাবাই-কার্ক, বেল,

ব্রাই, ক্যাক, ক্যানাব, ক্যাক,

কার্কো-এ, ক্রোক, ক্রোটন,হেলি,

লরো, \*লাইকো, \*জাট-মিউ,\*

নক্স, পার,ফস,প্লাণ্ট-মেজ,জাবাড,

ষ্টাক, থুজা ।

কেশ কণ্টকিতঃ—\* ব্যাবাই-কার্ক,

ডকা, গ্রাট, মেনি ।

হস্ত নীলবর্ণঃ—জেলস, জেট্র, জাট-

মিউ, \* \* নক্স,\* ট্রাম ।

হস্ত শীতলঃ—একন, এগার, এঙ্গ,

এপিস, \*আর্ণ,\*ক্যাক্ট,\* ক্যাক্স,\*

ক্যাক্স,\*কার্কো-ভে, \*চেলিড,\*

টিন, সিড, কক, কোন, ডিজি,\*

ড্রুস, ইউপ-পার্প্, ইউফ্রে,\*ফের,

জেলস,\* হিপার,\* হাইওস,

আইওড,\* ইপি, কালী-বা,\*

লেড,\* লাইকো,ম্যাক,\* মেনি,

\*মার্ক,\* মেজ, জাট-কা,\* জাট-

মিউ,\* নাইট-এসি, নক্স-ম,\*নক্স,

ওলিওড,\*ওপি, পালাড, পেট্রো,

ফস-এসি,\*\* ফস,\*পলিপ,\*পলস,

\* রস,\* সাধু, সাবাড, সারাক,\*\*

সিকেল,\*সিপি, টাণ, ষ্টাক,\*ট্রাম,

সলফ,\*টার,\*থুজা,\*\* তিরটি ।

হস্ত কুঞ্চিতঃ—সিম ।

হস্তের উত্তাপঃ—এপিস, সিড, সিনা,

ইপি, কালী-কা,\*মেজ, জাট-কা,

জাট-সল, সাবাড, সিপি ।

হস্তের শ্যাববর্ণঃ—ট্রাম ।

হস্তের অবশ্যতাঃ—সিম,ফির,লাইকো,

নক্স-ম,\*পলস, সিপি ।

হস্ত একখানা শীতল অপর শাসি

উষ্ণঃ—চিন ।

হস্তের তল আর্দ্রঃ—নিক ।

হস্তের আচ্ছন্নতাঃ—কালী-কা ।

হস্তে শীতল ঘর্ষঃ—সিনা ।

হস্তের শিরাবিলোপঃ—\*ইউফ্রে ।

হস্তের শিরাপ্রসারণঃ—\*চেলিড,

\* মেনি, \* ফস ।

হস্ত আর্দ্রবৎ অনুভবঃ—ইপি ।

মস্তক উত্তপ্তঃ—একন, এলম, \*

আর্ণ, এসার, বেল, বার্ক, ব্রাই,

সিড, চায়না, সিনা, ইউপ-পার্কো,

জেলস, ল্যাকনা, ম্যাক, মেজ,

জাট-সল, নক্স, ওপ, রোড, \*  
ট্রাম, ভিরাট ।

মস্তক নিরবচ্ছিন্ন উত্তপ্ত :—\*আর্প ।

মস্তক বাহিরে ব্যথিত :—হেলি ।

মস্তকে সূচী-বেধ :—এসাক ।

মস্তকে ঘর্ষ :—ওপি ।

মস্তকের মূর্দ্ধাদেশ আকুঞ্চিত অনু-  
ভব :—\* কালী-বা ।

মস্তক বেদনা ( মাথা ধরা ) —

একন, এনাক, এন্ট-টার্ট, \* আ-  
রেণিয়া, \* বেল, বার্ক, বোর,  
ব্রাই, ক্যাপ্স, কার্কো, চিন, চিন-  
সলফ, সিম, সিনা, কোর-র, ডাক,  
ড্রস, ইলাট, ইউফ-পার্কো, \* ই-  
উপ-পার্পু, ফের, গ্রাক, ইণ্ড, ইথে,  
ক্রিয়োজ, ম্যাক্স, মেজ, \*\* জাট-  
মিউ, নক্স, পেট্রো, \* পলস, সাক্স,  
\*\* সিপি, সলফ ।

মস্তক-বেদনা, খোলা বাতাসে উ-

উপশমিত :—\* আরেণিয়া ।

মস্তক-বেদনা, কশালে :—ইউপ-  
পার্পু, \*\* জাট-মিউ ।

মস্তক-বেদনা, একপাশে :—ইথের ।

হৃৎপিণ্ডে স্পন্দন :—জেলস, ফস-  
এসি ।

হৃৎপিণ্ডপ্রদেশে আক্ষেপ ও বে-  
দনা :—ক্যাক্স ।

ধৃত হইবার ইচ্ছা :—জেলস,

ল্যাক ।

দৃঢ়রূপে ধৃত হইবার ইচ্ছা :—

\*ল্যাক । [ \*\*ল্যাক ।

ধৃত হইয়া নীচে থাকিবার ইচ্ছা

দ্রবভঙ্গ :—হিপার ।

গাত্রে যেন চুল চলিয়া ফিরিতেছে

এরূপ অনুভব :—\* ব্যারাই-  
কা, মেনি, মোর, সারা ।

ক্ষুধা :—\*সিনা, নক্স, ফস, \*\*সিলি ।

গুল্মবায়ু :—\* ইউপ-পার্পু ।

বরফে যেন শয়ন করিয়া রহিয়াছে

একপ অনুভব :—\*\*লাইকো ।

অস্ত্রে জলপানান্তে শীতলতা :—

চেলিড ।

উপদাহিতা :—এনাক, ক্যাপ্স, \*

সিনা, জেলস, হাইওস, ইথে,

কালী-বা, ক্রিয়োজ, \* নাইট-

এসি, প্লাস্ট-মেজ ।

উৎক্ষেপ :—ট্রাম ।

সন্ধিহলে বেদনা :—\* সিম, হেল,

\* গড, রাক ।

বৃককে বেদনা :—মিলিফো ।

জানুর শীতলতা :—\*এপিস, \* কা-

কো, \* ইথে, \* ফস, \* সিলি ।

অশ্রুস্রাব :—ইলাট ।

অলসতা :—এস্থা, আরেণ, কার্কো,

কষ্ট, মারকিউরিয়াল, ন্যাট-মিউ।

বাম জজার শীতলতা :—\*কার্কো-

ভে। [ স্তাবিন, সিপি।

দক্ষিণ জজায় শীতলতা :—ইলাপ্স,

জজায় অতিশয় শীতলতা :—

\*\* মেনি, সিকেল, ট্রাম।

জজায় খল্লী :—ইলাট, \* নক্স।

জজায় গুরুত্ব :—থেরিড।

জজায় খঞ্জত্ব :—ইমে। [ \*নক্স।

জজায় অবশতা :—\* ইউপ-পাপু,

জজায় অবস্থান পরিবর্তন শীলতা  
সিম।

জজা প্রসারণে অসমর্থতা :—\*সিম

জজায় স্পর্শ-ধ্বংস :—বেল।

জজায় শ্রান্তি অনুভব :—জেলস,  
রস।

জজায় দুর্বলতা :—সেনেগা।

শুই, থাকিবার ইচ্ছা :—\* ব্রাই,

সিড, ড্রস, ফের, \* ল্যাক, মার্ক,

নক্স; পলস, \* সিপি, \* সিলি.

থেরিড।

আলোকের আতঙ্ক :—বেল।

অঙ্গের শীতলতা :—একন, ইবু. এ-

স্থা, এন্ট-টাইট, আর্প, আর্স, অবন,

\* বেল, বার্ক, ক্যালড, ক্যান্স,

ক্যান্স, ক্যান্স. কার্কো এ, কার্কো-

ভে, কষ্ট, ক্যান্স, চেলিড, চায়না,

সিক, কলোস, কোন, ডিজি,

গ্রাফ, হেলি, হাইড্রোসা, হাইওস,

ইপি, জেট্ট, কালীকা, লরো,

লেড, লাইকো, \* মেনি, মার্ক,

\* মেজ, 'স্টাট-মিউ, নাইট-এসি,

\* নক্স, \* ওপি, পিয়ন, ফস, প্লাট-

মেজ, \* পলস, বস, সিলা, \* \*

সিকেল, সিপি, \* ট্রাম. সলফ,

খুজা, ভিবাট, ডার্ক। ( শীতের

অবস্থান দ্রষ্টব্য )।

অঙ্গের আকৃষ্টন :—ক্যান্স, সিম।

অঙ্গের বেদনা :—একন, আর্স, বেল,

ব্রাই, সিনাব, ডাক, ইলাট,

ইউপ-পাফো, ইউপ-পাপু, গ্রাফ,

হেলি, ল্যাক, লেড, লাইকো,

মারকিউরিয়াল, \* মেজ, স্টাট-

মিউ, নাইটায়, \* নক্স, ওপি, \* পলস

\* বস, \* স্তাবড, সিপি, সলফ।

অঙ্গের পক্ষাঘাত :—\* ট্রামো।

অঙ্গপ্রসারণ ও অবনমন :—এলম।

অঙ্গ কক্ষান :—বেল, \* চিনি-সলফ,

কোন, স্তাবড।

অঙ্গ স্পন্দন :—\* নক্স, ট্রাম।

ওষ্ঠ নীলবর্ণ :—\* চিনি-সলফ, \*

ইউপ-পাপু, ইপি, \*\* স্টাট-মিউ

\* নক্স, \* সিকেল।

ষকৃদ্দেশে বেদনাঃ—আর্স, ব্রাই,\*

চায়না, নক্স,\*পডো, ভিরাট ।

কটিদেশে বেদনাঃ—আর্স, ক্রিয়োক্স,

ল্যাক, নক্স, ভিরাট ।

অধিক কথা বলাঃ—\*পডো ।

কাতরোক্তিঃ—\*ইউপ-পার্কো ।

মুখের শুষ্কতাঃ—\*মেজ, \* পেট্রো,  
থুজা ।

মুখের পশ্চাষ্টাণের শুষ্কতা, সম্মুখ  
ভাগে লালান্ধঃ—\*মেজ ।

মুখে ফেনাঃ—সিনা, থেরিড ।

শ্লেথ্মা বমনঃ—\*পলস ।

পেশীতে বেদনাঃ—\*আর্গ ।

নখের নীলবর্ণঃ—এপিস, আর্গ, আর্স,

\*এসাক্স, অবম, \* কার্কো ভে,

\*চিন-সল, কক, কোন, \*ড্রুস,

ইউপ-পার্কু, ইয়ে, ইপি, মেজ,

\*আটি-মিউ, \*\*নক্স, \*পেট্রো,

ফস-এসি, সলফ, \*থুজা ।

হাতের নখের হেতবর্ণঃ—সিলি ।

বিবমিষাঃ—আর্জ-নাই, \* আর্স,

অরম, বেল, ব্রাই, চেলিড, চিন,

সিনা, \*ইউপ-পার্কো, \*ইউপ-

পার্কু, ইয়ে, ইপি, কালী-বা, কালী-

কা, কোবান্ট, ল্যাক, লাইকো ।

\* লোন, মার্ক সল, \* আটি-মিউ,

পেট্রো, পলস, রস, কমেজ, \*

আবড, আক্স, সিপি, ভিরাট ।

বিবমিষা, জলপানাস্থে :—\* আর্স.

আর্গ, \* ইউপ-পার্কো ।

বিবমিষা, জল গিলিলে উপশম

প্রাপ্ত :—\* লোব ।

স্নায়বীয়তা :—কক, ইউপ-পার্ক ।

শব্দে বিদ্রোহ :—\*বেল, \* ক্যাপ্স, \*

হাইওস ।

নাসা, শীতল :—এপিস, এন্ট, সিড.

চেলিড, আইওড, মেনি, \* পলিপ,

মিলি, সলফ, \* টাব ।

নাসাগ্র, শীতল :—\* সিড ।

নাসা, আরক্ত :—বেল ।

নাসায় শীতল ঘর্ষ :—সিনা ।

অবশতা :—চিন, ফের, লাইকো,

পলস, \* সিপি ।

শরীরের যেখানে ভর দিয়া থাক

যায় সেইস্থানে বেদনা :—

ব্যাপ্ত ।

বেদনার আবেশ :—আর্স, চিন

ইউপ-পার্কো, নাইটার, পলস, রস

জজায় পক্ষাঘাতেরতায় অনুভব

—আর্স, ইয়ে ।

আলোকাতঙ্ক :—হিপ ।

লালাশ্রাবঃ—ক্যাপ্স ।

নাড়ী, পূর্ণ :—এন্ট-টার্ট, চিন সলফ ।

নাড়ী, কঠিন :—চায়না ।

নাড়ী, সপর্য্যাপ্ত :—একন ।

নাড়ী, বিষম :—চায়না ।

নাড়ী, দ্রুত :—চায়না ।

নাড়ী, মন্দগতি :—মেনি ।

নাড়ী, সূত্রবৎ :—একন, এপিস,  
চেলিড ।

নাড়ী, দুর্বল :—সিড, জেলস ।

চক্রে তারা কুঞ্চিত :—একন,  
জেলস । [ বেল, ইপি ।

চক্রে তারার প্রসারিত :—একন, \*  
স্মরণ করিতে অসমর্থতা :—আর্স,  
কাল, ট্রায়ম ।

হৃদয়, আয়াসিত :—এপিস, আর্স,  
জেলস, কালী-কা, \* মেজ, জাট-  
মিউ, পলস, সেনগা, \* থুঙ্গা, জিক ।

হৃদয়, দ্রুত :—থুঙ্গা ।

অস্থিরতা :—\* আর্স, বেল, প্লান্ট-  
মেজ, ইউপ-পার্পু, রস ।

ত্রিকা হুনে বেদনা :—আর্স, গম-গট,  
হাইওস \* \* নক্স, ভিরাট ।

লালা নিষ্ঠীবন :—এলম, ক্যাপ্স, রস ।

স্বক্কাহির নীচে বেদনা :—ইলাট ।

স্পর্শজ্ঞান-বিলোপ :—ল্যাক ।

দৃষ্টি অপরিচ্ছন্নতা :—বেল, সিক.  
হাইড্রোসা-এসি, সাবাউ ।

ত্বক নীলবর্ণ :—চায়না, মার্ক, জাট-  
মিউ, নক্স-ম, \* নক্স ।

ত্বক নীলবর্ণ ও দাগ দাগ বিশিষ্ট :—  
\* \* নক্স ।

ত্বক শীতল, আর্দ্র ও আঠাআঠা :—  
ল্যাক, \* \* ভিরাট ।

ত্বক, বরফবৎ শীতল :—\* সিকেল  
ত্বক, আকুঞ্চিত অমৃতবৎ :—পার ।

ত্বক, শুষ্ক :—আর্স, এসাক, আইওড ।  
ত্বক কণ্ডুয়ন :—\* হিগার, \* পেট্রো ।

ত্বক, ব্যধিত :—\* নক্স ।

ত্বকে স্পর্শ ঘেষ :—ক্যান্ড ।

ত্বকে জ্বল বেধ :—\* হিগার, সাধু ।

ত্বক, স্পর্শে উষ্ণ :—আর্স, ইলাক্স,  
গম-গট ।

নিদ্রা :—এহ্রা, এক্ট-টার্ট, \* এপিস,  
সিম, জেলস, \* কালী-আইওড,  
লাইকো, মার্ক, মেজ, \* জাট-  
মিউ, নক্স-ম, নক্স, \* ওপি, পডো  
সোর, সিলি ।

নিদ্রা, গভীর, নাক-ডাক বিশিষ্ট :  
—\* ওপি ।

নিদ্রালুতা :—ইথু, এহ্রা, বোরাক্স,  
সাইমেক্স, ডাক, হেলি, কালীবা,  
\* কালী-আইওড, মেজ, \* জাট-  
মিউ, \* নক্স-ম, নক্স, ওপি, কস, টার ।

হাঁচি :—অম্ল-এসি ।

স্পর্শ-দেবামুভব :—\* আর্গ ।

আক্ষেপ :—\* ক্যাক, ক্যাক, ভিরাট ।

আক্ষেপ ত্বরিত :—ক্যাক ।

পৃষ্ঠবংশে প্রচাপনে বেদনা :—\*

চিন-সল ।

প্লীহাশ্রদেশে বেদনা :—\* ব্রাই,\*

চিন-সল, \* ইউপ-পার্কো,\*পডো ।

প্লীহায় সূচী-বেধ :—\* ব্রাই ।

প্লীহারক্ষীততা :—ক্যাপ, পেট্রো ।

টলিয়া টলিয়া চলা :—ক্যাপ ।

একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা :—সিক ।

শরীরের দৃঢ়তা ও আটটতা :—ওপি ।

আড়ামোড়া ভাঙ্গা :—এলম, আর্স,

ব্রাই, ক্যাপ, সিম, কক, ইলাট,

\* ইউপ-পার্কো, ইপি, ক্রিয়োল,

লরো, মেরম, মিউর-এসি, নাইট-

এসি, নল্ল, পেট্রো, পনিপ, \*রস ।

আমাশয়ে উত্তাপ :—লোবি ।

আমাশয়ে বেদনা :—আর্স, ইউপ-

পার্কো, লাইকো, মারকিউরিয়াল,

সিপি, সলফ ।

আমাশয়ে তুরুত্ব অমুভব :—\* বেল :

সূর্য্যোস্তাপ্রাপ্তির ইচ্ছা :—কোন ।

স্বাদ, তিক্ত :—এলম, আর্স, ইউপ-

পার্কো, হিপ ।

স্বাদ, শূন্য :—অরম । [গট ।

কর্তনদন্তে শীতলতামুভব :—গম-

কণ্ডুরা অতিশয় হ্রস্ব অমুভব :—\*সিম

কুন্ডুন :—মার্ক-করো ।

উরুর উত্তাপ :—\* থুজা ।

উরুর দুর্বলতা :—ভিরাট ।

পিপাসা :—একন, \* এলম, এমন্-

মিউ, \* \* এসিস, আরেণ, \* \*

আর্গ, \* আর্স, বেল, বোর, \*

ব্রাই, ক্যানাড, \* ক্যাক, ক্যাক,

ক্যানাব, \* \* ক্যাপ, \* কার্কো-

ডে, চিন, \* চিন-সল, কক-ক,

ডলক, ইলাট, ইলাল, ইউজেন,

\* ইউপ-পার্কো, \* ইউপ-পার্কো, \*

ফির, গম-গট, গ্রাক, \* \* ইমে,

কালী-কা, কালী-আইওড, ল্যাক,

ল্যাকনা, লরো, \* লেড, লোব,

ম্যাগ-সল, মার্ক, মেজ, মিউর-এসি,

নাইট-কা, \* স্কাট-মিউ, স্কাট-সল,

নাইটার, নল্ল, প্লাঙ্ক-মেজ, সোর,

পলস, রাণ-ব, \* রস, \* সিকেল,

\* সিপি, থুজা \* \* ভিরাট ।

পিপাসার আধিক্য :—\* এলম, \*

এসিস,\* আর্গ, \* ব্রাই, \* ক্যাপ,

\* ইউপ-পার্কো, গম-গট, গ্রাক,

\* \* ইমে, লেড, মেজ, \* \* স্কাট-

মিউ, পলস, রস ।

পিপাসায় এক একবারে অধিক  
পরিমাণে জলপান ও তদ্বারা

শান্তি :—বাই, \* \* ভাটি মিউ।

পিপাসায় বারে বারে অল্প অল্প  
জলপান :—\* আর্স, \* ইউপ-  
পার্কো।

পিপার অভাব :—এগাব, \* এঙ্গ,

এম মিউ, এনাক, \* এণ্ট, \* এণ্ট.

টার্ট, \* আরেগিয়া, আর্স, এসার

অরম, বারাই-কা, \* বেল, বোভ,

\* ক্যান্ট, ক্যালড, \* ক্যান্ফ, \*

ক্যাঙ্ক, \* কার্কো-এ, কষ্ট, \* মিড,

\* ক্যাম, চেলিড, \* চিন, \* সিন,

\* সিনা, \* কক, কফ, কলোস,

কিউর, মাইক্রে, \* ড্রোস, ডলক,

ইলাপ্স, ইউফ্রে, জেলস, গ্রাক,

হেলি, হিপার, হাইওস, \* ইপি,

কালী-বা, ল্যাক, লাম, লাইকো,

ম্যাক্স, মেনি, মার্ক, মিউর-এসি,

নাইট-এসি, স্কাট-মিউব, স্কাট-

কার্ক, স্কাট-সল, নক্স-ন, নক্স-ভ,

ওলিএণ্ড, পেট্রো, ফস-এসি, দস,

পডো, \* পলস, রস, \* সানড,

সাব্ব, সিলি, স্পিজি, \* ষ্টাফ, ট্রাগ,

সলফ, থেরিড।

গলায় ঘড়ঘড় শব্দ :—ক্যান্ফ।

শরীরের অভ্যস্তরে দপদপ :—

জিঙ্ক।

পদাঙ্গুলীর শীতলতা :—\* ফের, \*  
মেনি।

পদাঙ্গুলীতে বেদনা :—এঙ্গ!

দন্ত-বেদনা :—কার্কো-ভে, কালী  
কা, গ্রাক, রস।

বোগাক্রান্ত পাথের নিশ্চেষ্টতা :—  
পলস।

কম্প :—এগনস, এনাক, এণ্ট টার্ট,

আস, বোরাক্স, \* সিনা, কক,

কোক, কোন, \* ইউপ-পার্কো,

ফের, জেলস, মার্ক-আইওড, \*

পাব, \* পেট্রো, প্লাট, স্কাভড,

টিউক, \* জিঙ্ক।

হনু শুষ্ক :—ল্যাক।

অচৈতন্য :—বেল, ক্যান্ফ, \* হিপাব,

\* স্কাট-মিউ, নক্স, ওপি, পলস।

গাত্র অনাবরণ বেদনা :—ট্রাম।

অশুচন্দ্রতা :—ক্যান্ফ, ক্যানাব, ক্যান্স,

হাইওস, সিলি।

মূত্র-মার্গে বেদনা :—\* ক্যাঙ্ক।

মূত্রত্যাগ বাবংবার :—ক্যাঙ্ক, মেফ,

মার্ক।

মূত্র, অম্ল :—সিপি।

মূত্র, কপিশ :—সিপি।

মূত্র, মলিন :—ভিবাট।

শীতপিত্ত :—\* হিপাব।

শিরা প্রসারিত :—আর্স, আই.

ক্যালাড, ক্যাপ্স, কষ্ট, সিনা, সিম,  
ইলাট, ইউপ-পার্কো, গম-গট,  
কোবান্ট, লবো, লাইকো, মেরম,  
\* মেনি, মার্ক, মেজ, মিউবেজ,  
ভাট-মিউ, ভাট-মল, ওলিয়াও,  
পার, ফস, পালপ, সিলি, থুজা ।

পৃষ্ঠের কশেরুকায় বেদনা :—\* \*  
চিন-মল ।

শিরোধূর্ন :—এলম, ক্যাফ, ক্যাপ্স,  
চিন, কালী বা, লবো, ভাট-মি,  
নক্স, ফস, পলস, রস, সলক, ভিবাট ।

বমন :—এলম, আর্গ, \* আর্স, এসাক,  
বোরাক্স, \* ইউপ-পার্কো, ফেন,  
গম-গট, ইথে, ইপি, ল্যাক, লাইকো,  
ভাট-মিউ, নক্স, পলস, বাণ, বস,  
ভিবাট ।

বমন, পিত্ত :—আর্গ, চিন, সিনা, \*  
ইউপ-পার্কো, ইথে ।

বমন, জলপানাস্থে :—আর্গ, \* আর্স  
\* ইউপ-পার্কো, নক্স ।

বমন, ভুক্তদ্রব্য :—কেব, ইথে ।

বমন, শ্লেষ্মা :—ক্যাপ্স, ইথে, \* পলস ।

বমন, অম্ল :—\* লাইকো ।

উষ্ণতার আকাজক্ষা অথচ তাহাতে

শাস্তি জন্মেনা :—এলম, আরেণ,  
ক্যাফ, সিক, সিনা, কক, হিপ, \*

\* ল্যাক, লাইকো, মেনি, নক্স, ফস,  
পডো, সিলি, ভিরাট ।

উষ্ণতায় অমিচ্ছা :—মেজ ।

উষ্ণতা বাহ্য অসহ্য :—\* পলস, \*  
সিলি ।

দুর্বলতা :—এব্রা, আর্স, আরেণ,  
বোরাক্স, ক্যাক, কার্কো, কষ্ট,  
ড্রস, \* ইপি, ল্যাক, মারকিউরি-  
বাল, \* ভাট-মিউ, ওপি, ফস, সোব ।

মণিবন্ধে ছিন্নকর বেদনা :—ফস-  
এসি, পডো ।

জ্বস্তগ :—\* আর্স, আই, ক্যালাড,  
ক্যাপ্স, কষ্ট, সিম, \* সিনা, ইলাট,  
\* ইউপ-পার্কো, গম-গট, কোবান্ট,  
লবো, লাইকো, মেবম, \* মেনি,  
মার্ক-মল, \* মেজ, \* মিউর-এসি,  
মিউবেজ, \* ভাট-মিউর, ভাট-মল,  
\* ওলিয়াও, পার, ফস, পালপ,  
সিলি, \* থুজা ।

শীতের হ্রাসপ্রাপ্তি,—

খোলা বাতাসে :—\* গ্রাফ, \* ইপি,  
ফস, পলস, সলক-এসি ।

শয্যায় গাত্র আবরণে :—\* কালী-  
আইওড, \* পডো, রস ।

শয্যা হইতে উঠিলে :—লাইকো, \*  
ভিরাট ।



শয্যার উত্তাপে :—কালী-আইওড ।

গাত্রাবরণে :—মার্কিউরিয়াল, পডো,  
রস ।

মাধ্যাহ্নিক আহারের পূর্বে :—বার্ক ।

শান্তিতে :—\*কষ্ট, \*গ্রাফ, \*ইপি ।

আহারান্তে :—এবু, \*কিউর, জাট-  
কার্ক, কস ।

খোলা বাতাসে ব্যায়ামে :—ক্যাম্প,  
ম্যাগ-কার্ক, পলস, টাক, মলফ-এসি ।

তপ্ত ইত্মির তাপদানে :—ক্যাম্প,  
ল্যাকনান ।

দৃঢ়রূপে ধৃত হইলে :—\*ল্যাক ।

শয়নান্তে :—\*কালী-কা, মার্কিউ-  
রিয়াল, রস, মলক ।

নড়িলে চড়িলে :—এপিস, আর্থ,  
এসার, বেল, ক্যাম্প, সাইক্লো,  
মার্ক, মেজ, নাইট-এসি, নক্স,  
পডো, রস, সিলি, স্পিজি ।

উপরে চাপ দিলে :—ল্যাক ।

উত্থানে :—রস ।

উপবেশনে :—ইয়ে, নক্স ।

নিদ্রান্তে :—ব্রাই, ক্যাক ।

নিদ্রাকালে :—রস ।

রৌদ্র সেবনে :—এনাক, কোন ।

অনাবৃত বায়ুতে বিচরণে :—\*ক্যাম্প ।

বাহ্য উত্তাপে :—\*আস, ব্যারা কা,

ক্যাম্প, ক্যান্ফ, কার্ফো-এ, \*চিন,  
সিক, কোন, কোর-ক্স, হিপো,  
\*ইয়ে; \*কালী-কা, \*ল্যাক,  
মেনি, \*মেজ, নক্স-ম, নক্স, \*  
সাবাড, মলক ।

গাত্রবস্ত্রাবৃত করিলে তৎপরে তীব্র  
উত্তাপ ও ঘর্ষণ :—সিলি ।

### শীতের বৃদ্ধি প্রাপ্তি ।

বায়ু-প্রবাহে :—ক্যাম্প, কার্ফো-এ,  
ডলক, \*নক্স ।

অনাবৃত বায়ুতে :—এনাক, এগার,  
এক্ট-টার্ট, \*আস, ব্যারা-কা,  
ক্যাম, চেলিড, চিন, \*সাইক্লো,  
ডলকা, \*হিপার, কালী-ক্লোর,  
মার্ক, মার্ক-করো, মক্স, নাইট-  
এসি, \*নক্স-ম, \*নক্স-ডম, পেট্রো,  
প্লাট, \*পলস, রাথ-বথ, রস,  
সেগেনা, সিপিরা, জিক্স ।

ঘুম ভাঙ্গিলে :—\*এমন-মিউ ।

শয্যাভাগে :—\*কাহ, \*\*নক্স,  
\*সিলি । [ \*ক্যাক ।

আর্দ্রতাভোগে :—আরেগিয়া,

শীতলদিনে :—\*আরেগিয়া, ক্যাম,  
ইয়ে ।

বৃষ্টিদিনে :—\*আরেগিয়া, কিউর ।

জলপানে :—এলম, \*আর্স, এসার,  
ক্যানাব, \*\*ক্যান্স, \*চিন, কক,  
\*ইলাপ্স, ইউপ-পার্কো, \*লোবি,  
লাইকো, মেজ, \*নক্স, \*রস,  
সিলি, টার, \*ভিরাট। [ ক্যাম।  
উষ্ণ পানীয় পানাস্থে :—এলম,  
আহারাস্থে :—কার্কো-এ, কক,  
ইউফ, \*গ্রাফ, \*\*কালী-কা,  
\*রস, টার। [ \*রস।  
আহার কালীন :—ইউফ, লাইকো,  
সায়াক্লে :—কার্কো-ভে, \*কালী-কা,  
পলস।  
প্রাক্কালে :—\*আর্স, মার্ক, নক্স,  
সিলি, সলফ।  
নড়িলে চড়িলে :—একন, এগার,  
এলম, \*এন্ট-টার্ট, \*এপিস, আর্গ,  
ক্যান্স, \*ক্যান্স, সিড, চিন, কক,  
কিউর, ইউপেট-পার্কো, \*হিপার,  
\*কালী-কা, \*নাইট-এসি, \*  
\*নক্স, \* \*রস, \* \*সিপি, \* \*  
সিলি, সলফ, থুজা।  
বিশ্রামকালে :—ড্র।  
অবশীর্ষাবস্থা হইতে উত্থানে :—  
মার্ক-করো।  
গৃহের অভ্যন্তরে :—আর্স, ব্রাই।  
ধূমপানে :—কক।

উষ্ণ হুমীর নিকটে :—এলম,  
এপিস, চিন, নক্স, সিপি।  
স্পর্শকরিলে :—একন।  
অনারৃত হইলে :—একন, এগার,  
\*এম-মিউ, আর্গ, বেল, কার্কো-এ,  
ক্যাম, ক্রিম, কোর-ক, \*সাইক্রে,  
মার্কিউরিয়াল, \*নাইট-এসি,  
নক্স-ম, \* \*নক্স, ট্রায়, \*থুজা।  
কাপড় ছাড়িবার সময় :—ক্যামো।  
অনারৃত বায়ুতে বিচরণে :—এলম,  
এম-কা, \*আর্স, কষ্ট, ডেলিড,  
চিন, কালী-ক্লোর, মার্ক, মার্ক-  
করো, নাইট-এসি, \* \*নক্স,  
পেট্রো, রস, ট্যাবাক।  
উষ্ণতায় :—এলম, এনাক; এপিস,  
এন্ট, আর্স, বেল, ব্রাই, বোভ,  
ক্যান্স, কষ্ট, সিক, চিন, সিনা,  
সিনাব, কক, ডলক, গ্রাট,  
আইওড, \*ইপি, ক্রিয়োজ, ল্যাঙ্ক,  
ল্যাম, লরো, ম্যাথ-মিউর, মেনি,  
মার্ক, মেজ, স্কাটি-মিউ, নক্স-ব,  
নক্স, ফস, পলস, রিউম, রস,  
\* রুটা, সিপি, সিলি, ট্রাক, স্পঞ্জ।  
শীতলজলে স্নানে :—\*আরেনিয়া।  
শীতল বাতাসে :—কিউর।  
আত্ম'ধাতুতে :—কিউর।

শীতাবস্থার পরে;—

পিত্তবমন :—\* ইউপ-পার্কো, কালী-

কা, \* ভাট-মিউ ।

হস্ত ও ষদনের স্নেহিততা :—লাইকো ।

বক্ষস্থলে বেদনা :—কালী-কা ।

কাসি :—সিম ।

চক্ষের আয়ুক্ততা :—সিড ।

চক্ষের পাতায় কণ্ঠ্যন :—সিড ।

মুখমণ্ডলের উত্তাপ :—ড্রস ।

পদের শীতলতা :—পেট্রো ।

হস্তাঙ্গুলীতে আকৃষ্টতা :—লাইকো ।

মস্তকের গুরুত্ব :—ড্রস ।

মস্তকের সম্মুখভাগে বেদনা :—

সিড, \* ভাট-মিউ ।

মস্তকের পশ্চাত্তাগে বেদনা :—ড্রস ।

গাত্র-কণ্ঠ্যন :—পেট্রো ।

ওষ্ঠের শুষ্কতা :—কালী-বা ।

মুখের শুষ্কতা :—কালী বা ।

বিবমিষা :—একন, \* ইউপ-পার্কো ।

নাসাগ্রের শীতলতা :—সিড ।

বেদনা :—কালী-কা ।

অস্থিরতা :—এপিস, ক্যান্ধ ।

কম্প :—লাইকো, সিপি ।

চর্ম-কণ্ঠ্যন :—পেট্রো ।

নিদ্রা :—\* এপিস, আর্স, ক্যান্ধ, লা-

ইকো, মেজ, নগ্ন-ন, \* নক্স, জাবিন ।

যন্ত্র :—\* ক্যান্স, \* কষ্ট, ডিজি, কালী-

কা, \* \* লাইকো, রস, \* থুজা ।

পিপাসা :—আর্স, \* ব্যারাই-কা, \*

চিন, \* সিম, ড্রস, হিপ, কালী-বা,

ক্রিয়োজ, ম্যাগ-সল, ভাট-কা,

পলস, \* সাবড, থুজা ।

শীতপিত্ত :—এপিস ।

বমন :—\* ইউপ পার্কো, কালী-কা,

\* লাইকো, \* ভাট মিউ ।

বমন, পিত্ত :—\* ইউপ-পার্কো, কা-

লী-কা, \* ভাট-মিউ ।

বমন, অগ্নি :—\* লাইকো ।

দুর্বলতা :—\* আর্স, লাইকো ।

শ্রান্তি :—সিম, লাইকো ।

মণিবন্ধে আকৃষ্টতা :—লাইকো ।

উত্তাপাবস্থার অভাব ।

এম-মিউ, \* আরেগিয়া, \* বোভ,

ক্যান্ধ, \* ক্যান্স, \* কষ্ট, সিম, কক,

\* হিপ, \* লাইকো, মাগে-কা, মেজ,

কস-এসি, রস, \* ভাবড, \* \* টাফ,

\* \* সলফ, \* থুজা, \* ভিরাট ।

উত্তাপ ।

\* \* একন, ইথু, এগাথ, এলটোপ,

এলম, এথ্রা, এম-মিউ, এনাক, এন,

এন্ট, \* \* এন্ট-টার্ট, \* এপিস, আরেগু

\* আর্গ, \* আর্স, এনাক, ব্যান্ট, \*  
 ব্যারাই-কা, \*\* বেগ, বেজ, বোর,  
 বোড, \* ব্রাই, \*\* ক্যান্ট, ক্যান্ড,  
 ক্যানাড, ক্যান্ড, ক্যান্ড, \* ক্যাই,  
 \* ক্যান্স, কার্শো-এ, কার্শো-তে,  
 কষ্ট, \* সিড, \* ক্যামো, \* চেলিড, \*  
 চিন, \*\* চিন-সল, সিক, সিম, সিনা,  
 \* কক, \* কফ, কোন, করণ, ক্রোক,  
 কূপ, \* কিউর, সাইক্রে, ডিজি, ড্রোস,  
 \* ডলকা, ইলাটি, \* ইলাপ, \* ইউপ-  
 পার্কো, ইউপ-পার্প, \* ইউকর, \* কের,  
 জেলস, \* গ্রাক, গম-গট, \* হেলি, \*  
 হিপ, \* হাইওস, \* ইয়ে, \* আইওড,  
 \* \* ইপি কালী-বা, কালী-কা, \* \*  
 কালী-আইওড, ল্যাক, লাকনান, \*  
 লম্বো, \* লেড, লোব, \* \* লাইকো,  
 মার, \* ম্যাথ-কা, ম্যাথ-সল, যেনি, \*  
 মারকিউরিয়াল, \* \* মেজ, \* মার্ক,  
 \* মক, \* মিউর-এসি, নিক, \*\* স্ফাট-  
 মিউ, \* নাইট-এসি, \* নক্স-ম, \*\* নক্স,  
 \* ওপি, পার, পেট্রোফস, \* ফস-এসি,  
 প্লান্ট, পডো, পলিপ, সোর, \* পলস,  
 রোড, \*\* রস, রোব, স্তাবাড, \* স্ফা-  
 বিন, \* স্ফা, \* সারাক, \* সিল, \*\*  
 সিকেল, \* সিপি, \* সিলি, \* স্টাণ, \* স্টাক,  
 \* স্ট্রাম, সলক, টারাক্স, থুজা, ভেলের,  
 ডিরাট ।

উত্তাপের পূর্বে, —

কাস :—কাক ।

বিবমিষা :—ট্রাম ।

তিজাহাদ :—হিপার ।

পিপাসা :—চিন, \* ইউপ-পার্কো,

স্ফাট-মিউ, পলস, \* স্তাবাড ।

বমন :—\* লাইকো, ট্রামো । (শীতের  
 পরে স্ফটব্য) ।

বমন, অল্প :—\* লাইকো ।

জ্বরণ :—কাক ।

উত্তাপের প্রকৃতি, সময়, ও  
 অবস্থান ।

উদরে :—\* ক্যান্ট । ( পরবর্তী পরি-  
 ছেদ স্ফটব্য ) ।

অপরাহ্নে :—\* এনাক, আর্স, বার্ক,

ব্রাই, ক্যাহ, চিন, কোপ, \* ইউপ-

পার্কো, গ্রাক, \* ফের, \* ইয়ে,

কালী-বা, ল্যাক, লাইকো, \* স্ফাট-

মিউ, স্ফাট-সল, পলস, সারাক,

\* সিলি, সিলিজি, স্টাণ ।

অপরাহ্নে, শীতশূণ্য :—\* এনাক ।

সর্বশরীরে প্রতিপন্ন মিনিট অ-

স্তর :—এছ ।

অগ্রগামী :—\* নক্স ।

উর্দ্ধগামী :—এলম, এম, \* সিনা,

হাইওস, \*আট মিউ, \* কস \* \*

মিপি, \* তিরাট।

পৃষ্ঠে :—কিউর, ডলকা, হাইওস,

মেনি, কস।

শয্যায় :—আর্জ, হেল, কালী-কা,

ম্যাথে-মিউ, ম্যাথে-সল, সলফ-এসি

শয্যায় না থাকা কালীন শীতানু-

ভব :—মার্ক। [ রস।

শরীরের বামপাশে :—\* \* মেল,

বামপাশে উত্তাপ, দক্ষিণ পাশে

উষ্ণতা :—রস। [ পলস।

দক্ষিণ পাশে :—\*এলম, মেনি, \*

উর্দ্ধাংশ :—এনাক, \* পলস।

সমগ্র শরীরে :—\* ক্যান্ফ, ইপি, \*

ইথে, কালী-কা, লেড, মেনি, \*

নাইট-এসি, \*নক্স, \*ওপি, পেট্রো,

সাহু।

বুকের উপর :—\* এপিস, \* সিক।

ছালা :—\* একন, \* এপিস, আর্গ,

এন্ট-টার্ট, \* আর্গ, ব্যারা-কা, \*

বেল, ব্রাই, ক্যান্ট, ক্যান্ফ, ক্যান্ফ,

\*ক্যাম, চেলিড, কিউর,\*

ডলক,\* ইলাপ্স, হেল,\* হিগ,\*

হাইওস, ল্যাক, লরো, লেড, লাই

কো, মারকিউরিয়াল, মার্ক,\*মা-

য়ে-কা, মক্স, নক্স, \*ওপি, কস,

\* \* পলস, স্তাবিন, স্তারাক, \*

সিল, সিকেল, টাক, টান।

ছালা, রোগীর অনুভূত হয় না :

—ক্যান্ফ।

ছালা, বাহ্যিক আরক্ততা ব্যতীত

:—হাইওস।

শীতশীত অনুভব, শীত, ও শীতলতা

সংযুক্ত উদ্ভাপ।

উত্তাপে. শীত শীত অনুভব :—\*

এপিস, \* আর্গ, \* কষ্ট, কিউব,\*

ইলাপ্স, কালী-বা, \* কালী-কা,

কালী-আইওড, ল্যাক, স্ট্রাকনা, \*

মার্ক, \*নক্স, পেট্রো, কস, \* পডো,

পলস, \* পলস, স্তাবাড, স্তাবিন,

সিকেল, মিলি, সলফ।

একবার শীতানুভব একবার উত্তাপ,

কিন্তু স্পর্শে উত্তাপ অনুভূত

হয় না :—মার্ক।

শীতানুভব, দিবাভাগে :—ড্রস।

শীতানুভব, শয্যাবস্ত্রের বাহিরে

হাত রাখিলে :—আর্গ,\*ব্যারাই-

কা, \* \* নক্স, ট্রাম।

শীত সঙ্কল্প :—\* \* সিকেল।

শীতলতা, মুখমণ্ডল ও মস্তক

ব্যতীত :—বেল, ওপি, ট্রাম।

শীতলতা বাহ্যিক, উত্তাপ আভ্য-

ন্তরিক :—বেল, আইওড, ফস ।

শীতলতা, স্পর্শে সর্বত্র শরীরে :—

\* কার্বো, \* ফের ।

দিবসে পর্যায়ক্রমে :—সিলি ।

উত্তাপ, শুষ্ক (মর্দনশূন্য) :—একন, \*

এগিস, আর্গ, \* আর্স, এরম-ট্রফ, ব্যারাকা, ব্যারা-মিউ, \* বেল, \* ব্রাই-ক্যাট, \* সিড, কক, কফ, কলোস, কোন, \* ডলক, ফের, গ্রাক, হেল, \* হিপ, হাইওস, নাইট, নাইট-এসি, স্কাট-সল, \* নক্স, ওপি, \* ফস, ফস-এসি, \* পলস, রস, \* সারাক, সিল, সিকেল, সিপি, ট্রাম ।

শুক, আবৃত অঙ্গে :—থুজ ।

সন্ধাকালে :—এম, এলম, এম্বা,

এস, আরেণ, \* বার্ক, কার্বো, \* চায়না, ড্রস, ফের, হেল, \* হিপার, হিপো, হাইওস, ল্যাক, লাইকো, ম্যাথ-কা, মার্ক, মক, মিউর-এসি, নিক, ওল-এন, ফস, ফস-এসি, \* মোর, রাণ, সাক, সাস, \*\* সিলি, সলফ, \* থুজ ।

বদনের উপর :—\* একন, এম্বা, \*

ক্যাট, সিনা, ড্রস, \* লাইকো, ট্রাম । (পরবর্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

উত্তাপাবেশ থাকিয়া থাকিয়া :—

এম, এম্বা, এম-মিউ, আর্গ, ব্যারা-কা, বিসমথ, বোরাক্স, \* ক্যাট, কাক, কার্বো-এ, কার্বো-ভে, চেলিড, চিন, চিন-সল, কক, কফ, কলোস, ক্রোক, কুপ, ডিজি, \* ইলাক্স, গ্রাক, গম-পট, হিপ, ইমে আইওড, \* কালী-বা, \*\* কালী-কা, \* কালী-আইওড, ক্রিয়োক, ল্যাক.লাইকো, \* মেনি, ম্যাথ-কা, স্কাট-কা, স্কাট-মিউ, \* \* নাইট-এসি, নক্স-কুগ, নক্স, ওলিয়াও, \* পেটো, ফস, পলস, রুমেক্স, স্কটা, স্কাভাড, সাবি, সেনেগ, \* সিপি, সিলি, স্পজ, ট্রান, সলফ-এসি, \* সলফ, টিউক, থুজা, ভেলের ।

উত্তাপাবেশ, ঘর্ষে পরিসমাপ্ত :—

এম-মিউ ।

উত্তাপ, পূর্ববাহু :—বার্ক, কালী-কা,

স্কাট-মিউ, নক্স, রস, সাস, থুজ ।

প্রদানতঃ মস্তকে :—সিনা, কিউর,

ড্রস, মার্ক, সাভাড । (পরবর্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ।

উত্তপ্তজলের ন্যায় অনুভব, বন্ধ :

স্থলে, বাহুতে, জঙ্ঘায়, ও কর্ণে :—সিকিট ।

উত্তপ্তজলের কাপড়ের ন্যায় অনু-

ভব :—পলস, রস, সিপি ।

উত্তাপ, তীব্র :—\* একন, \* এন্ট-টাইট,

\* আর্গ, আর্স, \* হেল, ব্রাই,  
ক্যাট, ক্যাঙ্ক, ক্যান্স, \* চিন-সল,  
জিঞ্জি, ইউজি, হিপ, কালী-আই ওড,  
লাইকো, ম্যাগ-কা, মারকিউরি-  
রাল, \* \* মেজ, \* \* ভাট-মিউ,  
নক্স-ম, \* নক্স, পলস, \* \* রস, \*  
সিকেল, সিলি, ঠাক, ট্রাম।

উত্তাপ, আভ্যন্তরিক :—\* একন,  
\* আর্গ, আর্স, \* বেল, \* ব্রাই,  
ক্যাঙ্ক, ক্যান্স, ক্যান্স, চেলিড, চিন,  
সিক, কোন, ফেরি মিউর, হেল,  
আই ওড, \* কালী-কা, \* ম্যাগ-  
কা, নাইট-এসি, নক্স, কস, \* কস-  
এসি, পলস, \* রস, \* মাভাড,  
সিকেল, সিলি, স্পিজি, ঠান,  
ভিরাট, দিক।

উত্তাপ, দীর্ঘস্থায়ী :—\* এন্ট-টার্ট, \*  
ক্যাট, \* হিপ, \* সিকেল, \* সিলি।

উত্তাপ, দুই প্রহর রাত্রির সময় :—  
রস, \* ট্রাম।

উত্তাপ, দুই প্রহর রাত্রির পূর্বে :—  
এন্ট, ইউজেন।

উত্তাপ, প্রান্তে :—\* আর্গ, বোরাক্স,  
টউকর, কালী-কা, ম্যাগ-কা, নক্স,  
রস, \* সলফ, খুজা।

উত্তাপ, প্রান্তের প্রাকালে :—কট।

উত্তাপ, রাত্রিতে :—এলস, এন্ট, আর্স,  
ক্যাঙ্ক-কা, বার্ক, ব্রাই, \* ক্যাঙ্ক,

কার্বো-এ, কার্বো-ডে, কট, সিউ,  
ক্যাঙ্ক, সিক, সিনা, কক, কক,  
কিউর, \* ড্রস, ডলক, গ্রাফ, \*  
হিপ, কালী-বা, লাক, লরো, \*  
ম্যাগ-কা, ম্যাগ মিউ, ম্যাগ-সল,  
মার্ক, নিক, নাইট, ভাট-মিউ,  
নাইট-এসি, \* পেট্রো, \* \* কস,  
কস-এসি, পলিগ, গোর, \* \*  
পলস, রাগ-বল, রোড, বস, ভাবিন,  
\* সারাক, \* \* সিলি, ঠাক, ট্রাম,  
ট্রাম, সলফ, খুজা, ভাইগুলাট্রি।

উত্তাপ, মধ্যাহ্নে :—ট্রাম। ট্রাম।

উত্তাপ, মধ্যাহ্নে, ও মধ্যরাত্রে :—

উত্তাপ, রুগ্মস্থানে :—ক্যান্স, ব্রাই,  
সলফ।

উত্তাপ, আবৃতস্থানে :—খুজা।

উত্তাপ, আভ্যন্তরিক স্থানের ভিত-  
রে জ্বালা, বাহিরে শীতানু-  
ভব :—বেজ।

উত্তাপ, একই সময়ে একাক্ষে  
উত্তাপ ও অন্যক্ষে শীত :—  
চিন।

উত্তাপস্থল স্পর্শে শীতল :—আর্গ।

উত্তাপের প্রাবল্য :—বেল, ক্যাট,  
\* ইপি।

( দীর্ঘ স্থায়ী ব্রহ্মক )।

উত্তাপ, কম্পসহ :—একন, এনাক,  
এন্ট-টার্ট, \* এলিস, \* আর্গ, বোড,

## উত্তাপের প্রকৃতি, সময়, ও অবস্থান ।

ক্যাক, \* কষ্ট, ক্যাম, চিন, কার্কো-  
 ভে, \* কিউর, সাইক্রে, \* ইলাপ, ইউপ-পার্কো, জেলস, ইয়ে, হিপ, ল্যাক, সেনি, \*\*নক্স, পেট্রে, ফস-এসি, পডো, রস, সাবাড, \*সলফ ।

কম্প ও উত্তাপ পর্যায়ক্রমে :—  
 বোভ, কষ্ট, চিন, সাইক্রে, \* ইলাপ, হিপ, ল্যাক, মার্ক, ফস-এসি, সাবাড । [ নক্স ।

কম্প, পান্নে :—ইউপ-পার্কো, \* \*  
 কম্প, নড়িলে চড়িলে :—এপিস, \*আর্গ, \*\*নক্স, পডো, ট্রাম ।

কম্প, উত্তাপ মিশ্রিত :—একন, এনক্স, এণ্ট-টার্ট, এপিস, ক্যাক, \*কষ্ট, ক্যাম, পেট্রা, পডো, বস ।

কম্প অনাবৃত হইলে :—\*আর্গ, এপিস, ব্যাবা-কা, \*\*নক্স ।

উত্তাপ, অল্পকাল স্থায়ী :—\*এণ্ট-টার্ট, আরেগিষা, নাইট-এসি ।

উত্তাপ, যৎসামান্য :—লোব, লাইকো, নক্স-ম । [ হাইওস ।

উত্তাপ, পৃষ্ঠবংশের উপরদিয়া :—  
 উত্তাপ, ঘর্ম্মসহ :—\*এলম, এম-মিউ, এণ্ট, ক্যাক্স, ক্যাম্প, মিড, \*\*কোন, ইউপ-পার্কো, ইপি, কালী-আইওড, ম্যাক্স কা, \*ওপি, ফস, পডো, সোর, পলস, \*রস, \*সাবাড, \*সিপি, ষ্টাফ, ট্রাম, তিরাট ।

উত্তাপ, মল্লক ব্যতীত :—এক ।

উত্তাপ, রাত্রি তিনটার সময় :—  
 এক । [ সিপি ।

উত্তাপ, রাত্রি চারিটার সময় :—  
 উত্তাপ, পূর্বাহ্ন নয়টার সময় :—  
 কালী-কা ।

উত্তাপ, পূর্বাহ্ন দশটার সময় :—  
 ছাট-মিউ, \*বস, খুজা ।

উত্তাপ, পূর্বাহ্ন এগারটার সময় :—  
 :—ছাট-মিউ, খুজা ।

উত্তাপ, অপরাহ্ন দুইটার সময় :—  
 \*\*পলস ।

উত্তাপ, অপরাহ্ন দুইটা ও তিনটার মধ্যে :—কিউব ।

উত্তাপ, অপরাহ্ন তিনটার সময় :—  
 কিউর, লাইকো, নিক ।

উত্তাপ, অপরাহ্ন চারিটার সময় :—  
 :—\*এনাক, গ্রাক, কালী-বা ।

উত্তাপ, অপরাহ্ন পাঁচটার সময় :—  
 \* - কালী-বা, কালী-কা, পেট্রা ।

উত্তাপ, অপরাহ্ন ছয়টার সময় :—  
 কষ্ট, নক্স, পেট্রো ।

উত্তাপ, অপরাহ্ন ছয়টা হইতে রাত্রি দুইপ্রহর পর্যন্ত :—ল্যাক ।

উত্তাপ, অপরাহ্ন সাতটার সময় :—  
 নক্স ।



## উত্তাপ কালীন লক্ষণ ।

উত্তাপ, রাত্রি ১২টা ও ৩টার  
মধ্যে :—কালী-কা ।

—————

উত্তাপকালীন লক্ষণ ।

উদরের শীতলতা :—জিহ্বা ।

উদরের উত্তাপ :—এপিস, \* ক্যাষ্ট,  
ক্যাফ, চিন, \* সিক, কিয়, ল্যাক,  
সেলেন, স্পিজি ।

উদরের ক্ষীণতা :—আর্স ।

উদরের বেদনা :—আর্স, ক্যাম্প,  
কার্বো-ভে, সিনা, ইলাট, ইমে,  
নক্স, \* রস ।

উদরের স্পন্দন :—কালী-কা ।

শীতল বায়ুতে অনুভবাবিক্য :—  
\* ব্যারা-কা, ক্যাম্প, \* কক ।

উষ্ণবায়ুতে অনুভবাবিক্য :—\* কক ।

বোধহয় যেন নিশ্বাসগ্রহণার্থ বায়ু  
নাই :—প্লাট-মেজ ।

অুখাহীনতা :—চিন, ল্যাক ।

আতাদিতক্কে স্পৃহা :—এণ্ট-টার্ট ।

বাহর শীতলতা :—কালী-বা ।

বাহর শিরার প্রসারিততা :—চিন-  
সল ।

পৃষ্ঠে, কটিদেশে উত্তাপ :—সারাক ।

পৃষ্ঠে ও নিতম্বে জ্বালা :—ক্যাগমিয়া ।

পৃষ্ঠে বেদনা :—এলটোন, আর্গ, আর্স,  
ক্যাম্প, কার্বো ভে, চিন-সল, \*

ইউপ-পার্কো, হাইওস, ইমে,  
কালী-কা, ল্যাক, লরো, লাইকো,  
জাট-মিউ, \*\* নক্স, পলস, রস ।

বিয়ারনামক আসবপানের ইচ্ছা :—  
নক্স ।

মূত্রাশয়ে বেদনা :—ক্যাষ্ট ।

রক্তে উত্তপ্ততা অনুভব :—\* আর্স, \*  
বেল, \*\* রস ।

রক্তবহা নাড়ীর প্রসারিততা :—

\* বেল, ক্যাম্প, চিন, পলস, চিন-সল ।

শরীরের আরক্ততা :—ক্যাফ ।

অস্থিতে বেদনা :—আর্স, \* ইউপ-  
পার্কো, ইমে, ব্যাফ-কা, জাট-মিউ,  
পলস । [ পলস ।

শ্বাস, ব্যাকুলিত ও দ্রুত :—একন,

শ্বাস, গভীর :—ল্যাক । [ সিলি

শ্বাস, হ্রস্ব :—ক্যাষ্ট, সিনা, কোন, \*

শ্বাস, আশ্বাসিত :—এপিস, আর্স,

বোভ, ক্যাষ্ট, কার্বো, \* সিম, ইলাপ্স,

\* ইপি, \* কালী-কা ।

ঘৃষ্টবৎ অনুভব :—\* আর্গ ।

একগালের উত্তাপ ও আরক্ততা :

—\* ইমে, \* ইপি, পলস ।

বাম গালে আরক্তচিহ্ন :—লাইকো

গালের জ্বালা ও মলিন আরক্ততা  
:—চেজিড, মারকিউরিয়াল ।

গালের আরক্ততা ও উত্তপ্ততা :

—কার্কো-এ, চেলিড, \* সিনা, \*  
কক, ডিজি, \*ইউপ-পার্কো, ফেরি,  
কালী-কা, ল্যাক, লাইকো, \*  
মেনি, মার্ক, নক্স, রস, রোব, \*  
ভিরাট ।

গাল রোগীর নিকট আরক্ত ও  
উত্তপ্ত অনুভব, কিন্তু বাস্তবিক  
উষ্ণ নয় :—\* চিন ।

এক গালের আরক্ততা ও অপর  
গালের পাণ্ডুরতা :—একন,  
ব্যার-কা, \*\* ক্যাম, কক, \*  
ইপি, \* পলস ।

বক্ষঃস্থলে জ্বালা :—এস-মিউ, \*  
এপিস, ক্যাম, পলস, সেনেগ,  
সলফ ।

বক্ষঃস্থলে ভারবোধ :—একন, \*\*  
এপিস, আর্স, বার্ক, বোভ, কা-  
র্কো-ভে, ইপি, কালী-কা, \* ল্যাক,  
মার্ক, প্লাণ্ট, পলস ।

বক্ষঃস্থলে বেদনা :—আর্স, ক্যাম,  
কার্কো-ভে, চিন, সিনা, কালী-  
কা, নক্স ।

বক্ষঃস্থলে সূচী-বেধ :—একন, \*  
ব্রাই, ক্রাসী-কা, নক্স ।

উদর-বেদনা :—ক্যাম, কার্কো, ই-  
লাট, রস ।

প্রায় জ্ঞানশূন্যতা :—কস-এসি ।

কোষ্ঠবদ্ধ :—চিন-সল, লাইকো, ক্রা-  
ট-মিউ, নক্স ।

আক্ষেপ :—কিউর, হাইওস, \* ট্রাম ।

আক্ষেপ, অপস্মারবৎ :—ট্রাম ।

কাস :—\* একন, ব্রাই, ড্রুস, ইউপ-  
পার্কো, \* ইপি, সলফ ।

কাস, বমনজনক :—ইপি ।

খল্লী :—কিউর ।

বধিরতা :—ল্যাকনান ।

প্রলাপ :—\*\* আর্গ, আর্স, বেল,  
বিউকো, কার্কো, চিন, \* চিন-  
সল, সিনা, কক, জেলস, হিপ,  
হাইপার, ইথের, ল্যাক, ল্যাকনা,  
\*\* ক্রাট মিউ, নাইট-এসি, নক্স,  
ওপি, \*পডো, \*সোর, সাবাড,  
শাক, মারাক, সিকেল, স্পঞ্জ, \*  
ট্রাম, ভিরাট ।

অতিসার :—\* সিনা, কোন, ইলাট,  
পলস, \* রস থুজা ।

জলপানে বিতৃষ্ণা :—নক্স ।

জল অতিরিক্ত শীতল অনুভব :  
—বেল । [ লাইকো ।

শীতল জল পানান্তে বিবমিষা :  
জলপান, এক একবার অল্প অল্প  
:—\* আর্স, চিন, লাইকো ।

উষ্ণজল পানে প্রবৃত্তি :—সিউ ।

শ্বাস-কষ্ট :—একন, এনাক, \*এপিস,

\*আণ, আর্স, বোত, ক্যাষ্ট, ক্যাম্ফ,

কার্সো, সিম, জ্রোট, ইলাপ্স, ইগ্নে,

ইপি, কালী-কা, লোব, লাইকো,

ফস, গলস, ক্রটা, সিপি ।

কর্ণের শীতলতা :—ইপি ।

কর্ণের উত্তাপ :—\* ক্যাম্প, চিন,

ডিজি, ইলাপ্স, ল্যাক, লাইকো,

\* মেনি ।

এক কর্ণের উত্তাপ :—\* ইগ্নে ।

কর্ণে গুণ্ণ উণ্ণ শব্দ :—নয় ।

কর্ণে বেদনা :—ক্যালাড ।

কর্ণের আরক্ততা :—ক্যাম্ফ, সিষ্টে,

ইলাপ্স ।

কর্ণে গর্জন্মধ্বনি :—নয় ।

উদবোদ্ধি দেশে পূর্ণতা :—আরেনিয়া

অপস্মার :—\*\* হাইওস, ট্রাম ।

জ্বায়বীয় উত্তেজনা :—\*একন, কোন

শরীর শাখায় বেদনা :—ইলাট, \*

ইউপ-পার্কো, \* বোব ।

শরীর শাখায় স্পন্দন :—জেলস,

\* ইগ্নে স্তোব ।

চক্ষের পাতা মেলিতে পারা যায়

না :—\* জেলস ।

চক্ষের পাতার উত্তাপ :—চেলিড ।

উপরেব চক্ষের পাতার ক্ষীততা :

—এপিস, কালী-কা । [ বাট ।

চক্ষের তাবা সঙ্কুচিত :—ওপি, ডি-

চক্ষের তাবা প্রসারিত :—\*বেল ।

চক্ষু ঘর্ষণ :—সিন ।

চক্ষের দুর্বলতা :—কার্সো, \*স্টাট-

মিউ, সিপি ।

মুখমণ্ডলে জ্বালা কিন্তু আবজ্ঞতা

নয় :—প্লাট ।

মুখমণ্ডলে, শীতলতা :—এস, ইপি,

পলস, বিউম ।

মুখমণ্ডলে উত্তাপানুভব :—\*থুজা ।

মুখমণ্ডলে, আহ্বারান্তে উত্তাপানু-

ভব :—কষ্ট, ক্যাম ।

মুখমণ্ডলে, উত্তপ্ত :—এনাক, পেল,

ক্যাষ্ট, ক্যাম্ফ, ক্যাম্প, \* কার্সো,

কষ্ট, ক্যাম, চেলিড, চিন, সিক, \*

\*সিনা, কক, \* কক, ডিজি, \*

ইউপ-পার্কো, \* জেলস, ইপি,

কালী-বা, কালী-কা, ল্যাক, লয়ো,

\* লাইকো, \* ম্যাথ-কা, মেনি,

মারকিউরিয়াল, মার্ক, নাইট-

এসি, ফস-এসি, ফস, প্লাট-মেজ,

\* পলিপ, রস, স্ত্রাবড, স্ত্রাবিন,

\* স্ত্রাব, \* স্ত্রাবাক, সিপি, সলক,

টার, \* ভিরিট । ( পূর্ববর্তী প-

রিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ) ।

মুখমণ্ডল, পাণ্ডুর :—আর্স, ব্রাই,  
ক্যাপ্স, সিনা, ক্রোক, \* ইপি,  
লাইকো, রস, রোব, সিপি ।

মুখমণ্ডল পাণ্ডুর উত্থানকালে :—  
\* একন ।

মুখমণ্ডল, আরক্ত :—একন, এলম,  
এমন-মিউ, ব্যাবাই-মিউব, \* বেল,  
ব্রাই, ক্যাক্ট, ক্যাক্স, ক্যাক্স,  
ক্যাপ্স, \* কার্কো, সিড, চেলিড,  
\* চিন, \* চিন-সল, দিক, কক,  
কফ, কেন, ক্রোক, সাইক্রে,  
ডলক, ইলাপ্স, ইউফর, \* ফেরি,  
গ্রাট, হিপাব, হাইপার, \* ইগে,  
কাল্ট-আইওড, ক্রিয়োজ, \* ল্যাকনা,  
লাইকো, মাগে-কা, মাগে-সল,  
মেনি, মার্ক, জাট-মিউ, নক্স-ম,  
নক্স, ওপি, \* পেট্রো, \* পলিপ,  
\* পলস, রস, জাবাড, সারাক,  
\* সিপি, \*\* সিলি, স্পিজি,  
স্পঞ্জ, ট্রাম, \* সলফ, টার, ভিরাট ।

মুখমণ্ডল, পর্যায়ক্রমে আরক্ত ও  
পাণ্ডুর :—একন, বেল, বোভ,  
ক্যাপ্স, ক্রোক, ইপি, নক্স, ওপি,  
ফস, পলস । [ \* একন ।

মুখমণ্ডল, আরক্ত শয়নকালীন :—  
মুখমণ্ডল, আরক্ত দক্ষিণপার্শ্বে  
অধিক :—ল্যাকনা ।

মুখমণ্ডলের মলিন আরক্ততা :—  
\* \* সিলি, ল্যাক ।

মুখমণ্ডলের মেহগনিকাঠের স্থায়  
মলিন আরক্ততা :—\* ইউপ-  
\* পার্কো ।

মুখমণ্ডলে ঘর্ষ :—ডিজি, ডলক ।

মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ষ :—ডিজি ।

মুখমণ্ডল, স্থীত :—এস-মিউ, আর্স,  
বেল, ক্যাক্ট, চেলিড, সিনা, পলস ।

মুখমণ্ডল, পীতবর্ণ :—আর্স, সিনা,  
জাট-মিউ ।

মূর্ছা :—একন, এনাক, \* আর্গ, বেল,  
ক্যাক, কিউব, ইউপ-পার্কো, মার্ক,  
জাট মিউ, নক্স, ওপি, ফস ।

মূর্ছা, উত্থানকালে :—একন ।

পতনবৎ অনুভব :—\* জেলস ।

ব্যজনেচ্ছা :—কার্কো-ভে ।

ভয় :—\* একন ।

পদের শীতলতা :—এনাক, এণ্ট, \*

আর্গ, বেল, ক্যালভ, ক্যাপ্স,  
ক্রোক, ফের, গ্রাক, হাইড্রোসা-এসি,  
ইগে, ইপি, কালী-কা, ল্যাক,  
ল্যাক্ট, মেনি, নক্স, পেট্রো, ফস-  
এসি, পলস, জাবাড, জাবিন,  
\* জাবু, \*\* ট্রাম, সলফ ।

পদের উত্তপ্ততা :—\* লেড, মার-  
কিউরিয়াল, নক্স, প্লান্ট, পলিপ,  
সারাক, টাক ।

পদে বেদনা :—নয় ।

পদতলে ছালা :—ক্যাছ, \* ফের,

গ্রাফ, ল্যাক, \*\* সলফ ।

পদে ঘর্ষ :—ষ্টাফ ।

হস্তাঙ্গুলীর উত্তাপ :—লাইকো ।

হস্তাঙ্গুলীতে বেদনা :—ইলাট ।

আহারে অপ্রবৃত্তি :—চিন । [ কস ।

শীতল আহার্যের আকাজকা :—

কপালের শীতলতা :—চিন,

সিনা, পলস । [ ট্রাম ।

কপালের উত্তপ্ততা :—চেলিড,

কপালে ঘর্ষ :—এন্ট-টার্ট, ইপি, ম্যাগ-

সল, সাস, ষ্টাফ, \* ভিরাট ।

গল-রোধ :—সিম ।

গ্রোবার গ্রহির ক্ষীততা ও আর-

ক্ততা :—সিষ্ট ।

হস্তের শীতলতা :—\* আর্গ, ক্যাছ

ক্যাপ, ইউফর, ইপি, নাইট-এসি,

পলস, জাবিন, \* থুজা ।

হস্তের উত্তপ্ততা :—এগার, বেল,

চেলিড, কিউর, ডিজি, গ্রাফ,

কালী-বা, ল্যাক, \* লেড, ম্যাগ-

কা, মারকিউরিয়াল, \* নাইট-

এসি, নক্স-ন, \* নক্স, পেট্রো, কস,

প্লাস্টি, \*\* পলস, রাণ, কস,

সাবাড, টান, ষ্টাফ, \*\* সলফ ।

এক হস্তের উত্তাপ; অপর হস্তের

শীতলতা :—চিন, কক, \*

ডিজি, পলস ।

পর্ষায়ক্রমে এক হস্তের শীতলতা

ও অপরহস্তের উত্তপ্ততা :—কক ।

হস্তের গুরুত্ব :—আরেগিয়া ।

হস্তের তালুকার উত্তপ্ততা :—এনাক,

ক্যাছ, \* ফের, ল্যাক, লাইকো,

মার্ক, \* পলিপ, \* সলফ ।

হস্তে বেদনা :—নক্স ।

হস্তে শীতল ঘর্ষ :—নাইট-এসি ।

হস্তে ঘর্ষ :—ব্যারা-কা, হিপ, নাইট-

এসি, প্লাস্টি ।

হস্তের শিরা প্রসারিত :—\* বেল,

\* চিন, \* হাইওস, \* লেড ।

শয্যা কঠিন অনুভব :—আর্গ ।

মস্তকের শীতলতা :—বেল ।

মস্তকের উত্তপ্ততা :—\* বেল, ক্যাষ্ট,

\* ক্যাফ, ক্যান্ড, কার্কে-এ, কষ্ট,

চেলিড, কিউর, ডিজি, ইউপপার্কো,

ফির, জেলস, ইপি, কালী-আই-

ওড, লাইকো, \* ম্যাগ্নি-কা, মার-

কিউরিয়াল, \* পেট্রো, কস-এসি,

প্লাস্টি, রোব, রস, জাবাড, সাস,

সিলি, ষ্টাফ, ট্রাম, ভিরাট ।

মস্তকে ছুরি দিয়া কর্তনবৎ ঘাটনা

:—\* ক্যাষ্ট ।

মস্তকে ঘর্ষ :—মাঝি-কা ।

মস্তক-বেদনা ( শিরঃপীড়া ) :—

একন, এগার, এগঠোন, \* এক,  
\* আর্গ, আর্স, \* বেল, বার্ক,  
বোর, ব্রাই, ক্যাক্ট, ক্যাক, ক্যান্স.  
\* কার্কো ভেজি, \* চিন, চিন-সল,  
সিনা, কলোস, ক্রোটন, ডুস,  
ডলক, ইলাট, \* ইউপ-পার্কো,  
গ্রাক, \* হিপ, হিল্ল, \* ইয়ে, কালী-  
বা, কালী-কা, ল্যাক, লোব,  
\*\* ভ্রাট-মিউ, নক্স, ওপি, প্লাট,  
\* পডো, পলস, রোব, \* রস,  
কুটা, স্তাবাড, সিপি, \*\* সিলি,  
সলফ, ভেলার ।

মস্তক-বেদনা, একপার্শ্বিক :—\* থুজা

মস্তক বেদনা, শব্দদ্বয়ে সূচী-বেধ :

—\*\* নক্স, পলস । [—চিন-সল ।

মস্তক-বেদনা, পিপাসায় উপশমিত

ক্লঃকম্প্যু :—একন, \* ব্যারা-কা,

ক্যাক, মার্ক, মাস, সিপি, সলফ ।

কুচকিতে স্থালা :—কিউর ।

কুচকিতে বেদনা :—\* রস ।

ক্লঃভজ :—হিপ । [ কস ।

ক্লুধা :—\* চিন, \* সিনা, কিউর, \*\*

বরফ সেবনের আকাঙ্ক্ষা :—কস ।

উগ্রতা :—\* ক্যাম, প্লাট ।

জামু, উত্তপ্ত :—ইয়ে ।

জামু, দুর্বল :—এনাক ।

প্রসবৎ বেদনা :—পলস ।

অক্ষশ্রাব :—ইউপ-পার্কো ।

এক জজ্বার বেদনা :—ভেলস ।

জজ্বার শীতলতা :—যেক, \* ট্রাম ।

জজ্বার উত্তাপ :—ক্যাম্ফ, কিউর ।

\* লেড, সারাফ ।

জজ্বার অবশতা :—সিড । [ সল

জজ্বার শীরার স্ফীততা :—চিন-

যেন শয়ন করিতে হইবে এরূপ

অমুভন :—ভ্রাট-মিউ ।

আলোকে অমুভবাধিক্য :—বেল ।

অকঃপ্রত্যঙ্গের শীতলতা :—কার্কো

এ, সিপি, \* ট্রাম ।

অকঃগৌরব :—আরোগিরা, ক্যাক ।

অকঃবেদনা :—আর্স, ব্রাই, ক্যাক,

ক্যাম্ফ, কার্কো, চিন, \* ইউপপার্কো,

হিউপপার্গু, ল্যাক, লাইক, পলস

রস, সিকেল, সিপি, সলফ ।

অকঃস্পন্দ :—ওপি ।

ওষ্ঠ, স্থালা :—চিন ।

ওষ্ঠ, পরিশোধ :—রস ।

ওষ্ঠে, জ্বর-স্ফোট :—\* হিপ, \* ইয়ে,

\*\* ভ্রাট-মিউ, \*\* নক্স, রস ।

ওষ্ঠ, লেহন, কিন্তু জলপান না

করণ :—\* পলস ।

সন্ধুঃ দেশে বেদনা :—আর্স, চিন,

ইলাট, \* নক্স। [কা।

কটিতে বেদনা :—ক্রোট, কালী-

বাবলুকতা :—\* কার্সো, \* ল্যাক,

\* মেরস, \*\* পডো, টিউক।

দুগ্ধপানের আকাজক্ষা :—মার্ক।

কাতরাণ, (অস্ফুট কাতরোজি) :—

একন, ক্যাম, \* ইউপ-পার্কো,

ল্যাক, \* পলস। [পার্কো

কাতরাণ, নিদ্রাবস্থায় :—\* ইউপ-

মুখেজ্বলা :—\* পেট্রো।

মুখ-শোষ :—চিন, চিন-সল, নক্স-ম।

মুখের চারিদিকে জ্বর স্ফোট :—

\* হিপ, \* ইগে, \*\* জাট-মিউ,

\*\* নক্স, রস।

মুখ, বিকসিত :—\* ওপি। [সিনা।

মুখের চারিদিকে পাণ্ডুরতা :—\*

পেশী, স্পন্দন :—জেলস, ইগে, আ-

ইওড, ওপি।

নিবমিষা :—এনাক, এন্ট-টাট, আ

রেগ-ডা, আর্স, বোবাক্স, ব্রাই, \*

কার্সো, ক্যাম, কক, ড্রস, সাইস,

\* ইলাট, \* ইউপ-পার্কো, ইউপ-

পাপু, ফ্লোর-এসি, \* ইপি, লা-

ইকো, \* জাট-মিউ, নাইট-এসি,

\* নক্স, ওপি, কস, জাবাড, সিপি,

থুজা, ভিবাট।

ঘাড়ে বেদনা :—গ্রীক।

শব্দে অমুভবান্বিত্য :—\* বেল, \*

ক্যাপ, জেলস।

নাসিকা, শীতল :—ইগে।

নাসিকার প্রান্ত উত্তপ্ত :—\* ক্যাপ,

চেলিড। [সিনা।

নাসিকার চারিদিক পাণ্ডুবর্ণ :—

নাসিকা খুঁটন :—\* সিনা।

অবশতা :—সিড, সিপি, থুজা।

মস্তকের পশ্চাৎভাগে উত্তাপ :—

ক্যাম্ফ।

গলনলীতে চাপ :—\* সাইস।

যে যে স্থানে ভর দেওয়া যায়

তাহাতে বেদনা :—ব্যান্ট।

শরীরে, স্পর্শে ব্যথিততা :—ম্যাক,

পলস, \* ট্রায়।

শরীরে, অনাবৃত হইলে বেদনা :

—মার্ক, ট্রায়।

অনাবৃত হইলে বেদনার প্রাবল্য

:—\* ট্রায়।

তালুকার উত্তাপ :—ডলক।

পক্ষাঘাত :—কিউর।

আলোকাতঙ্ক :—\* হিপার।

অবস্থান পরিবর্তনের প্ররুতি :—

\* আর্গ।

নাড়ী, পূর্ব :—একন, ক্যাম্ফ, সিড,

চিন-সল, নাইট-এসি । [নাইট-এসি  
নাড়ী, অনিয়মিত :—\* চিন,  
নাড়ী, দ্রুত :—\* একন, ক্যাম্প, \*  
চিন, ডিজি, আইওড, রস ।  
নাড়ী, বৃদ্ধ :—ফেরি-মিউর । [ওড ।  
নাড়ী, দুর্বল :—এট-টার্ট, আই-  
চকেরতারা, প্রসারিত :—\* বেল,  
সিনা, ইপি । [ ব্রাই. জেলস ।  
চুপ করিয়া থাকিবার ইচ্ছা :—  
স্মরণ করিতে অসামর্থ্য :—আর্স,  
\* স্টাট-মিউ, ফস-এসি, সিপি ।  
হাস, দ্রুত :—প্লাট-মেজ ।  
হাস, নাকডাকা বিশিষ্ট :—কোন,  
\* ওপি, লরো, বোব ।  
অস্থিরতা :—\* একন, এম-কা, আর্গ,  
\* \* আর্স, ব্যাপ্ট, ব্যাবা-কা, বেল,  
ক্যাম্প, \* ক্যাম, চিন, সিনা,  
\* জেলস, হিপো, ইপি, ম্যাগ-মিউ,  
প্লাট, \* পলস, \* \* রস, \* সিকেল ।  
প্রভূত জলীয় লাল নিঃস্রব :—  
\* ড্রস । [ নক্স ।  
দক্ষিণ স্কন্ধাশ্রিত নিম্নে বেদনা :—  
আমাশয়-গহ্বরে বেদনা :—ইউপ-  
পার্কো ।  
মাত্রাবদ্ধ খুলিয়া ফেলিলে কাম্প :—  
আর্গ, এপিস, ব্যাবা-কা, \* \* নক্স ।  
স্কন্ধদ্বয়েব মধ্যে বেদনা :—\* রস ।

দীর্ঘ নিদ্রাস ত্যাগ :—ইমে, পলস ।  
দৃষ্টির অপরিচ্ছন্নতা :—স্টাট-মিউ,  
পলস ।  
হৃকের আর্দ্রতা :—ওপি ।  
হৃকের পরিভুক্ততা :—\* একন,  
এপিস, আর্স, ব্যাবা-কা, হাইওস,  
ইমে, আইওড, ইপি, পলিপ,  
সিকেল । ( পূর্ব পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ) ।  
হৃকের অবদারণ :—\* সারাফ ।  
হৃকের বিদারণ :—\* সারাফ ।  
হৃকের উত্তপ্ততা :—এপিস, আর্স,  
ব্যাবা-কা, বেল, হাইওস, পলিপ ।  
( পূর্ব পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ) ।  
হৃকের কণ্ডুয়ন :—এম-মিউ,  
এপিস, \* ইমে, \* রস । [ \* রস ।  
হৃকের কণ্ডুয়ন, বর্ষণে বিবিক্তিত :—  
হৃকের কণ্টক বেধবৎ যাতনা :—  
ফ্রোক, জেলস, নাইট-এসি, পলিপ ।  
হৃকের হল বেধবৎ যাতনা :—  
এম-মিউ, চিন ।  
হৃকের আরক্ততা :—আর্গ ।  
নিদ্রা :—এপিস, \* এট-টার্ট, ক্যাম্প,  
মিড, \* চিন, \* ইউপ-পার্কো, \*  
জেলস, ইমে, \* ল্যাক, ল্যাকনা,  
লরো, লাইকো, \* \* মেজ, \*  
স্টাট-মিউ, নক্স-স, \* ওপি, \*  
পডো, \* বোব, রস, \* স্যাঙ্ক, স্ট্রাম,



নিদ্রা, উত্তাপের চরমাবস্থায় :—

পড়ো।

নিদ্রা, গভীর ও : ক-ডাকবিশিষ্ট :—

কোন, \* \* ওপি, লবো, \*রোব।

নিদ্রাকালে স্থপ :—ইলাপ্স।

রাত্রি তিনটার পবে নিদ্রা বাইতে

অসমর্থতা :—এক।

নিদ্রাকালে চমকিত হইয়া উঠা :—

ক্যাম, \* দিনা, কোন, জেলস,

বাইকো।

নিদ্রিত হইবাব প্রান্তে চমকিত

হইয়া উঠা :—পলস।

নিদ্রালুতা :—এপিস, এসাক, সিড,

চিন, \* জেলস, হিপ, ইগে, লাইকো।

ত্ৰাট-কা, নক্স-ন, ওপি, কস, পলস,

রস, ট্রাগ, ভিনাট।

নিদ্রাহীনতা :—একন, আর্গ, এক্স,

আর্গ, ব্যাথা-কা, কফ, কোন,

এাক, হাইওস, ত্ৰাট-কা, পলস,

বোড, ট্রাক। [ কার্কো]

গল-রোধামুভব :—\* \* এপিস,

ইটি :—চিন-সল।

তন্দ্রালুতা :—এটে-টাট, আর্গ, আর্স,

ক্যাট্টে, ক্যাঙ্ক, ডলক, জেলস,

ইগে, \* ত্ৰাট-সিড, নক্স-ন, ওপি,

ফস এগি, গিপি।

বাকের অসংলগ্নতা :—কিউর।

পৃষ্ঠবংশে প্রচাপনে বেদনা :—

\* চিন-সল।

[\* নক্স।

প্লীহা প্রদেশে বেদনা :—আর্স, কার্কো,

আমাশয়-গহ্বরে উত্তাপ :—ল্যাক,

সাবাক।

আমাশয়ে বেদনা :—আর্স, কার্কো,

সিনা, কালী-কা, বস, সিকেল, গিপি।

মলত্রাব-বারংবার :—ল্যাক।

মল-বেগ :—ক্যাপ্স।

অঙ্গমর্দ :—ক্যাঙ্ক, চিন-সল, কিউর,

রস, জাবাড।

গলাধঃকরণে কষ্ট :—গিক, \*সাইম।

ঘর্ম্ম :—এলম, এস-গিউ, এটে, ক্যাম্প,

ক্যাপ্স, কোন, সাগ-কা, ট্রাক।

( পূর্ক পবিচ্ছেদ প্রষ্টব্য )।

দন্তে দন্তে শব্দ :—সিড।

দন্ত বেদনা :—কার্কো।

বায়বীয় পবিবর্তনে অনুভবধিক্য

:—\* ব্যারা-কা।

পিপাসা :—\* একন, এলটোন, এস-

কা, এস-মিউ, এপিস, এক্স, \*

আর্গ, \* \* আর্স, ব্যারা-কা, \* বেগ,

গোভ, \* ড্রাই, ক্যাট্টে, ক্যাঙ্ক,

ক্যাঙ্ক, ক্যাপ্স, কার্কো, \* সিড,

\* ক্যাম, চিন, \* চিন-সল, \*

সিনা, \* কফ, কোন, ক্রোক,

কিউব, ইলাট, ইলাপ্স, ইউপ-

পার্কো \* ইউপ-পার্পু, \* হিপ,  
হাইওস, ইপি, কালী-বা, ল্যাক,  
লাইকো, \* গ্যাথি কা, মার্ক, \*\*  
আট-মিউ, \* নক্স, ফস প্রাণ্ট-মেজ,  
\* পডো, \* মোর, \* পলস, \*  
বোব, \* বস, সাবড, সাবাক.  
\* সিকেল, সিপি, \* সিলি, ষ্টাক,  
ট্রাম, মলফ. \* থুজা, ভে.লব,  
ভিরাট ।

পিপাসা, একবারে অধিক জল  
পানের ইচ্ছা:—\*একন, বাবা-  
কা, বেল. \*\* আট-মিউ ।

পিপাসা, একবারে অধিক জল  
পানের ইচ্ছা ও তদ্বাচা উপ-  
শমপ্রাপ্তি:—\*\* আট মিউ ।

পিপাসা, অধিক:—একন এলষ্টোন,  
\* আর্গ, \* আর্স, বেল, \* ব্রাই,  
ক্যাম, চিন. চিন মল, ইলাট, \*  
হিপ, হাইওস, \*\* আট-মিউ ।

পিপাসা, ব্ল:—ক্যাট, সাবড ।

পিপাসা, শরীর অনারত করিলে  
বৃদ্ধি:—বারা-কা ।

পিপাসা,কিন্তু পানান্তে বমন:—  
এলষ্টোন, \* আর্স ।

পিপাসা পরিশূন্যতা:—\*এলন, \*  
এন্ট-টার্ট, \* এপিস, বাবা-কা  
বোভ, \* ক্যাক, \* ক্যাম্ফ, \*

ক্যাপ, কার্কো-এ, \* কার্কো-  
ভে, \* কষ্ট, \* চিন, \* সাইম,  
কক, ডিজি, \* ডুম, \* ফের,  
জেলস, হেল. \* ইগে, ইপি,  
কালী-কা, \* গেড, মেনি, মিউর-  
এসি, নক্স-ম, ওপি, ফস এসি,  
পলস, রস, সাবু, সাবড, \*\*  
সিপি, স্পিজি । [এসি, সিপি ।

গল-মধো, বেদনা:—ফস, ফস-  
গল-মধো, গিলিবার সময় স্পর্শ-  
দেয়:—বার্প, ফস এসি ।

কণ্ঠনাভ পবিত্রতা:—পেট্রো ।

কম্পন:—আর্স, ক্যাক, মিষ্ট, ইউপ-  
পার্কো, কালী-আইডেড, গ্যাথি-  
কা, সিপি ।

অচৈতন্য:—লবো, + আট-মিউ ।

অনারত হইতে ইচ্ছা:—একন,  
এপিস, আর্গ, \* আর্স, বারা-কা,  
ক্যাক, \* চিন, \* ইউপ-পার্কো,  
ফেব, \* হিপ, আইওস, \* ল্যাক,  
লাইকো, মিউ-এসি, \*\* আট-  
মিউ, নাইট-এসি, \* ওপি, \*  
পেট্রো, প্রাট, \*\* পলস, স্পিজি,  
ষ্টাক, ভিবাট ।

অনারত হইতে অপ্রবৃত্তি:—\*এ-  
পিস, আর্স, অর, \* বেল, ক্লিম,  
কক, কনচ, কোন. হিপ, ইগে,

\*ম্যাগ্নি-কা, মার্ক, নক্স-ম, \*\*  
 নক্স, কস-এসি, পলস, রস, \*  
 স্লাম, \* সিলি, \*\* ট্রাম, \* ট্রান।  
 অনাবৃত্ত হইলে শীতানুভব :—  
 আর্গ, \* চিন, \*\* নক্স, পলস।  
 ( পূর্ব পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )।  
 মূত্র প্রকৃতি, জলপানান্তে :—সা-  
 ইম, \*ইউপ-পাপু।  
 মূত্র-ত্যাগ, বারংবার :—আর্জ,  
 বেল, ক্রিয়োল, লাইকো, মার্ক,  
 কস-এসি, রস, সিলি, টাক, ট্রাম।  
 মূত্রে, ইন্সটকচূর্ণের ন্যায় অধঃক্ষেপ  
 :—ফস।  
 মূত্র, পাণ্ডু বর্ণ :—সিড, ক্যাম।  
 মূত্র, লোহিত বর্ণ :—নক্স।  
 মূত্র, প্রভূত :—এন্ট, আর্জ, সিড,  
 \*ক্যাম, ডলক, \* ইউপ-পাপু,  
 মিউর-এসি, \*কস, সিলি, ট্রাম,  
 মূত্র, বিলুপ্ত :—কাষ্ট।  
 মূত্র, আবিল :—ফস।  
 শীতপিত্ত :—এপিস, \* ইথে, \*রস।  
 শীতপিত্ত, ঘর্ম্মসহকারে অস্তুহত :  
 —\* ইথে।  
 জরায়ুপ্রদেশে বেদনা :—কাষ্ট।  
 শিরায়, রক্ত জ্বালাকরা :—\*আর্স,  
 \*হাইওস।

শিরায়, শীতল রক্ত প্রবাহিত  
 হওয়া :—ভিগাট।

শিরা, প্রসারিত :—এপার, \*বেল,  
 \*ক্যাম \* চিন, চিন-সল, ক্রোক,  
 সাইক্রে, ডিজি, \* হাইওস, \*  
 লেড, \*গারকিউরিয়াল, \*পলস

শিরোগূর্ণন :—আর্স, বেল, বার্ক,  
 ব্রাই, \* কার্কো-ভে, কক, জেলস,  
 হিপ, ইথে, \*ইপি, লরো, মার্ক,  
 \* স্লাম-মিউ, নক্স, কস, পলস,  
 \*সিপি, \*ট্রাম, ভেলের, ভিগাট।

বমন :—এলটোন, এন্ট, আর্স, ব্রাই,

কাষ্ট, \* ক্যাম, \* সিলি, কোন,  
 \* ইলাট, \* ইউপ-পার্কো, ইউপ-  
 পাপু, ফেব, ইথে, \*ইপি, ল্যাক,  
 \* লাইকো, \* স্লাম-মিউ, নক্স,  
 পলস, ট্রাম, থুজা।

বমন, পিত্ত :—\* ক্যাম, সিলি,  
 \*ইউপ পার্কো, \*স্লাম-মিউ, থুজা।

বমন, তিক্ত :—ইউপ-পার্কো।

বমন, পানান্তে :—আর্স।

বমন, শীতল দ্রব্য পানান্তে :—  
 লাইকো।

বমন, ফেণিল :—\*ইলাট।

বমন, ভুক্তদ্রব্য :—সিলি, \* ইউপ-  
 পার্কো, ফেব, ইথে, নক্স।

বমন, অন্ন :—\* লাইকো ।

বমন, জল :—এলটোন ।

স্বর, ক্রীণ :—হিয়ার ।

শয্যার উষ্ণতা অসহ :—\* গেড ।

উষ্ণতা, বাহ্যিক অসহ :—এপিস,

\*\* পলস ।

উষ্ণতা, বাহ্যিক সুখদ :—ইয়ে ।

দুর্বলতা :—এনাক, \* অর্গ, \* আর্স,

ব্রাই, ক্যাক, \* কার্কো, কিউর,

ইউপ-পার্কো, ইয়ে, ইপি, লাইকো,

জাট-কা, \* জাট-মিউ, নক্স-ম,

ফস, রোব, সারাক, সলফ ।

ক্রন্দন :—স্পঞ্জ ।

জ্বলন :—ক্যাক, \* চিন-সল, কিউর

কালি-কা \* রস, সাবাড ।

### উত্তাপের হ্রাসপ্রাপ্তি ।

অনাবৃত বায়ুতে :—জাট-মিউ ।

শকটারোহণে :—নাইট-এসি ।

আহারান্তে :—এনাক, চিন, কিউর,

ফের ।

কৃত্রিম উত্তাপে :—কোর-ক ।

সঞ্চরণে :—\* ক্যাপ্স, ফের ।

হাঁটিবার সময় :—ক্যাপ্স ।

উপবিষ্ট অবস্থায় :—নক্স ।

কথা বলিবার সময় :—ফের ।

অনাবৃত হইলে :—আর্স, বোড ।

উত্তাপের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি :—

অনাবৃত বায়ুতে :—কিউর, \* নক্স ।

শয্যায় :—\* মার্ক ।

শকটারোহণকালে :—গ্রাক, \* সোর ।

জলপানে :—ক্যাক, কক ।

আহারান্তে :—এম-কা, ব্রোম,

কষ্ট, কক, ফ্লোর-এসি, সিপি ।

সঞ্চার প্রাকালে :—ফের ।

গ্রমকালে :—এট, এণ্ট-টার্ট, \* ক্যাম্ফ,

নক্স, অক্স-এসি, ব্রোম, \* সিপি ।

দুইপ্রহর রাত্রির পরে :—\* ড্রস ।

নড়িলে চড়িলে :—এলম, এণ্ট-টার্ট,

\* ক্যাম্ফ, \* চিন, কিউর, নক্স,

সিপি, ব্রোম ।

রাত্রিতে :—সিনা, কিউর, \* সিপি ।

কার্যে নিবিষ্টকালে :—ওলিএড ।

উপবেশনকালে :—ফস, সিপি ।

নিদ্রাবস্থায় :—ডলক, পেট্রো, ভাই-

ওলা-ট্রিক ।

নিদ্রান্তে :—সিনা ।

ধূমপানে :—সিক, কক ।

অবশীর্ষ হইলে :—মার্ক-কর ।

বিরক্তির পর :—পেট্রো, সিপি ।

হাঁটিলে :—\* ক্যাম্ফ, \* চিন ।

উষ্ণতায় :—\* এপিস, ব্রাই, \*ইথে।

আদ্র দিনে :—কিউর।

উত্তাপান্তে :—

শীত :—চিন, মার্ক, নক্স, \* পলস।

শীত শীত বোধ :—মেনি, মার্ক।

অবসন্নতা :—আর্স।

মুখমণ্ডলের পাণ্ডুবর্ণ :—সিলা।

মুখমণ্ডলের লোহিতবর্ণ, দক্ষিণপাশে

আধিক্য :—ল্যাক।

শিবঃপীড়া :—আর্স, ক্যাক, \*কার্কো

ক্ষুধা :—\* সাইম, ডলক, \* ইউপ-

পাপু, ইথে।

ক্ষুধা, রান্ধসবৎ :—সাইম।

নিদ্রা :—এপিস, \* ইউপ-পার্কো।

নিদ্রা, নাকডাকুসহ :—\* ওপি।

পিপাসা :—এনাক, এম-মিউ, ক্যাক্টে,

\* চিন, কফ, সাইক্রে, নক্স, ওপ,

পলস, ষ্টান, ট্রাম।

পিপাসাহীনতা :—ওপি।

বমন :—ক্যাক, \* ইউপ পার্কো।

বমন, পৈত্তিক :—\* ইউপ-পার্কো।

দুর্বলতা :—\* আর্স, ডিজি।

ঘর্ষ পরিশূন্যতা।

একন, এলম, এম-কা, এপিস, \*

আবেগিয়া, আর্গ, \* আর্স, \* বেল,

বিসমথ, \* বোভ, ব্রাই, ক্যান্ড, ক্যা-

নাব, ক্যাম, চিন, কফ, কলচ, ডলক,

\* ইউপ-পার্কো, জেলস, \* গ্রাফ, হা-

ইওস, আইওড, ইথে, ইপিক, কালী-

কা, কালী-বা, ল্যাক, লেড, \* লা-

ইকো, ম্যাগ্নি কা, মার্ক, জাট-কা, না-

ইট-এসি, নক্স ম, নক্স, ওলিও, ওপি,

কস, কস-এসি, প্লাট, পলস, রস, সোর,

শ্রাবাড, সিলা, সিকেল, সিনেগা,

সিলি, স্পঞ্জ, সলফ, ষ্টাক, টিউক,

ভার্স, ভাইওল-ওড।

ঘর্ষ ।

\* একন, ইথ, \* এগার, এলষ্টোন,

এলস, \* এম্বা, এম-মিউ, \*এনাক, এল,

এণ্ট, \*\* এণ্ট-টার্ট, এপিস, আর্গ,

আর্স, এসাক, ব্যাপ্ট, \*\* বার্না-কা,

\* বেল, \*\* বেঞ্জ, \* বোভ, \*\* ব্রাই,

ক্যাক্টে, ক্যালাড, \*\* ক্যাক, \* ক্যান্ড,

ক্যাক, \* ক্যান্ড, ক্যাপ, \*\* কার্কো-

এ, \* কার্কো-ভে, \*\* কঠ, \*\* মিড,

ক্যাম, চেলিড, \*\* চিন, \*\* চিন-সল,

সিক, সাইম, সিনা, কক, ক্রোক,

কফ, কোন, করণ ক, কুপ, কিউর,

সাইক্রে, \*\* ডিজি, ডুস, ডলক, \*

ইলটি, \* ইলাঙ্গ, ইউপ পার্কো, \*

ইউপ-পাপু, ইউ-কর, ইউপিয়ন, \*\*

ফের, গ্যাঙ্ক, \* জেলস, \* গ্রাফ, গো-

রাজ, হেল, \*\* হিগার, \* হাইওস,  
\* আইওড, ইগে, \*\* ইপি, \*\* কালী-বা,  
কালী-কা, কালী-আইওড, \*\* ল্যাক, ল্যা-  
কনা, লরো, লেড, লোব, \*\* লাইকো,  
সার, \*\* ম্যাগি-কা, মেনি, \*\* মার্ক,  
\* মেজ, জাট-কা, \*\* জাট-মিউ, \*\*  
নাইট-এসি, নক্স-ম, \*\* নক্স, \*\* ওপি,  
পাব, \* পেট্রো, \*\* ফস-এসি, \*\* ফস,  
প্লাণ্ট, \* পডো, \* পলিপ, \*\* সোর,  
পলস, \* রোব, রিউম, \* রস, জা-  
বড, জাবিন, \*\* জাভ, \* সারাক,  
\*\* সিকেল, সেলেন, \*\* সিপি, \*\*  
সিলি, স্পঞ্জ, টান, \* টাফ, ট্রাগ, \*\*  
মলক, \*\* ট্যাডাক্স, \*\* থুজা, \* ভে-  
লার, \*\* ডিহ্রাট ।

### ঘর্ষের পূর্বে :—

খল্লী :—দিড ।

শিরঃপীড়া :—\* ফেব ।

কুধা :—ষ্টাক ।

পিপাসা :—কফ, থুজা ।

### ঘর্ষের প্রকৃতি ও সময় ।

তীব্র :—ক্যাপ্স, ক্যাপ, কোন, গ্রাফ,  
আইওড, রস, টার ।

অপর্যবেক্ষিত :—বার্ক, ম্যাগি-মিউ, ম্যাগি-  
সল, \* জাট-মিউ, \* নক্স, সিলি, টাফ ।

নিম্ন হইতে উর্দ্ধে গতি :—আর্প,  
বেল । [সিপি ।

জাগ্রত সময়ে প্রভূত :—জাব,  
শয, য় :—\* এলম, এক । [ল্যাক ।

শয, হইতে উঠিবার সময় :—  
রক্তাক্ত :—ক্যাক, ক্লিম, ফ্রেটাল,  
\* কিউর, ল্যাক, লাইকো,  
নক্স-ম, নক্স ।

শীতান্তে :—এন্ট, কষ্ট । [ক্যাপ্স ।

শীতান্তে, পূর্ববর্তী উত্তাপ, তীতঃ  
শীত ও ঘর্ষ পর্য্যায়ক্রমে :—এন্ট,  
\* নক্স ।

শীত ও ঘর্ষ যুগপৎ :—এন্ট ।

শীত শীত অনুভব সহ :—এন্ট, ব্রাই  
\* ইউপ-পার্কো, ইউপ পার্ণ, জাট-  
মিউ, \*\* নক্স, পেট্রো, ফস ।

শীতানুভব সহ, স্নান জন্য :—  
\* আর্প ।

শীতানুভব সহ, সঞ্চরণে বা গায়  
বাতাস লাগাইলে :—ইউপ-  
পার্কো, \*\* নক্স ।

শীতলতা সহ, নড়িলে চড়িলে :—  
ইউপ-পার্কো, \*\* নক্স ।

শীতলতা সহ, অনাবৃত হইলে :—  
ইউপ-পার্কো, \*\* নক্স ।

আঠা আঠা :—একন, এনাক, এন্ট-  
টার্ট, আর্প, \*\* আর্স, ক্যাক,

ক্যান্ড, ক্যান, কুপ, ডাক, ডিজি,  
ইলাট, \* ফের, ফোর-এসি, হেল,  
হিপ, আইওড, জ্যাট্র, ল্যাক, \*  
লাইকো, লিউ-পুলস, মার্ক, মক,  
নক্স, ওপি, অক্স-এসি, কস-এসি,  
\* কস, \* ভিরাট ।

শীতল :—এনাক, \* এণ্ট-টার্ট, আর্গ,  
\*\* আস, ব্যারা-কা, ব্রাই, ক্যালড,  
\* ক্যান্ড, ক্যানাব, ক্যান্ড, ক্যান্স,  
চিন, \* সিনা, কক, কুপ, \* কিউর,  
ডিজি, ডলক, ড্রস, ইলাপ্স, জেলস,  
\* হিপ, হাইওস, আইওড, \* ইপি,  
জ্যাট্র, ক্যালমিয়া, ল্যাক, ল্যাকনা,  
\* লাইকো, মার্ক, মার্ক-কনো,  
মেজ, জ্যাট কা, জ্যাট-সিউ, নকস,  
ওপি, অক্স-এসি, প্লাটে, পডো,  
পলস, রিউম, কটা, সিকেল, \*  
সিপি, সিলি, স্পিজি, টান, \* ট্রাম,  
টাক, সলফ-এসি, থুজা, \* ভিরাট ।

দিবাভাগে :—এগাব, এব্রা, এম-  
মিউ, এনাক, \* এণ্ট-টার্ট, বেল,  
ব্রাই, \* ক্যান্ড, \* কান্টো-এ, \* চিন,  
\* কোন, \* ডলক, \* ফের, \*  
গ্রাফ, গোয়াজ, \* হিপ, কালী-  
কা, ল্যাক, লরো, লেড, \* লাইকো,  
জ্যাট-কা, \* জ্যাট-মিউ, \* ন ইট-  
এসি, ফস-এসি, পলস, \* রিউম,  
\* সেলেন, \* সিপি, সিলি, \* টাক,

\* ট্রাম, সলফ, সলফ-এসি,  
ভিরাট, জিক ।

দৌর্বল্যজনক নহে :—\* রস, \* তাধ  
একবার ঘর্ষ একবার লক্ষ্যতা :—  
এসি, জ্যাট-কা । ( উত্তাপ সহ  
দ্রষ্টব্য ) ।

সন্ধাকালে :—\* ব্যারা-কা, মিউর-  
এসি, \* তাধ, সলফ ।

একদিন পর একদিন সন্ধাকালে  
:—\* ব্যাব-কা । [ নক্স ।

মুখ মণ্ডলে শীতল ঘর্ষ :—কক,  
ঘর্ষ পায়ে আরম্ভ :—আর্গ, বেল ।  
ঘর্ষে মাছি পড়ে :—\* ক্যালড,  
\* মথল ।

ঘর্ষ পূর্ববাহে :—\* ফের, তাধ ।

উত্তাপ সহ :—এণ্ট, এসি, বেল,  
হিপ, কালী বা, জ্যাট-কা, ওপি,  
জ্যাট, টাক, ভেলের ।

উত্তাপ সহ, নিদ্রাকালে :—তাধ ।

উত্তাপাবেশ সহ :—এণ্ট, বেল, \*  
হিপ, কালী-বা, ওপি ।

উত্তপ্ত :—\* ওপি ।

বস্ত্র, শক্তকর :—মার্ক, সেলেন ।

বস্ত্র, রক্তাক্তকর :—ল্যাক, নক্স-ম ।

বস্ত্র, লোহিত বর্ণকর :—আর্গ, ড-  
লক, নক্স ।

বস্ত্র, পীতবর্ণকন :—বেল, ব্রাই,

\*\*কার্বো-এ, চিন, \*কেব, \*গ্রাফ,  
ইপি, ল্যাক, ম্যাগ্নি-কা, \*মার্ক-  
\*থুজা, \*ভিরাট ।

দীর্ঘকাল স্থায়ী :—\*কেব, আইওড ।

শয়নাস্থে :—ম্যাগ্নি-সল, মেনি ।

দুইপ্রহর রাত্রির পরে :—এলম,  
এম্বা, এম-মিউ, ব্যাবা-কা, ব্লিম,  
ড্রস, ম্যাগ্নি-মিউ, \*মারকিউ-  
রিয়াল, নক্স, ফস, \*পলিপ ।

দুইপ্রহর রাত্রির পূর্বে :—মিউব-  
এসি ।

প্রাতে :—\*এলম, এম্ব, এণ্ট,  
আঞ্জি-না, অরম, বেনজিন,  
বোরাক্স, বোভ, ব্রাই, ক্যাক,  
কার্বো, কষ্ট, চেলিড, চিন-সল,  
সিক, ব্লিম, কক, কফ, ডলক,  
ড্রস, ইউজেন, ইউফব, \*ফের-  
মিউ, গ্রাফ, হেল, হিপ, আইওড,  
ক্রিয়োজ, লাইকো, ম্যাগ্নি-কা,\*  
ম্যাগ্নি-মিউ, ম্যাগ্নি-সল, মারকিউ-  
রিয়াল, \*\*মার্ক, মক্স, মিউব-  
এসি, স্কাট-কা, স্কাট-মিউ, স্কাট-  
সল, নিক, নাইট-এসি, নাই-  
টার, নক্স, পার, \*ফস, \*ফস-এসি,  
পলস, রাণ-বব, \*রস, শ্রাবাড,  
সিপি, সিলি, স্পঞ্জ, ষ্টান, \*সলফ,  
মলক্স-এসি ।

রাত্রিতে :—একন, এগার, \*এম্ব,

\*এম্বা, এম-কা, \*এম-মিউ, \*  
\*এনাক, এম্ব, এণ্ট-টার্ট, আর্জ,  
আণ, আর্স, অর, ব্যারা-কা,  
বেল, বেঞ্জিন, ব্রাই, \*ক্যাক,  
ক্যাক, \*\*কার্বো-এ, \*কার্বো-  
ভে, \*কষ্ট, ক্যাম, চিন, সিক,  
সিষ্ট, কক, \*কলোস, \*কোন  
কুপ, কিউব, সাইক্রে, ডিজি, \*  
ড্রস, \*ডলক, ইউপ-পার্কো,  
ইউক্রে, ফের, \*গ্রাফ, গোয়াক্স,  
গম-গট, হেল, \*হিপ, আইওড,  
ইপি, \*কালী-কা, ল্যাক, লরো,  
লেড, লাইকো, \*ম্যাগ্নি-কা,  
ম্যাগ্নি-মিউ, ম্যাগ্নি-সল, ম্যাক্স,  
মেনি, মারকিউরিয়াল, \*\*মার্ক,  
মার্ক-করো, \*মিউব-এসি, \*স্কাট-  
কা, স্কাট-মিউ, স্কাট-সল, \*নাইট-  
এসি, নাইটার, নক্স, অক্স-এসি,  
পেট্রো, ফস-এসি, \*ফস, পলিপ,  
পলস, রস, শ্রাবাড, স্কাডু,  
-নাক, \*সিপি, সিলি, স্পঞ্জ,  
\*ষ্টাক, ষ্ট্রাম, \*ষ্ট্রণ, \*\*সলফ,  
ট্যাবাক, টার, টিলিয়া, থুজা,  
ভিরাট, ভাইওল-ওড, ভাইওল-  
ট্রিক, জিঙ্ক । [এনাক ।

রাত্রিতে, বন্ধ :—হলে ও উদরে :—

মধ্যাহ্নে :—সিনাব ।



গন্ধ-শূন্য :—\* রস ।

তৈলাক্ত :—এগার, \*ব্রাই, \*চিন, \*

ম্যাগ-কা, \*\*মার্ক, নক্স, রোব,  
ষ্ট্রাম, \*\*থুজা । [ ষ্ট্রাম, থুজা ।

একাদ্রীন :—ক্যাম, চিন, মার্ক, নক্স,

প্রভূত :—এফন, এগার, এষ, \*এণ্ট-

টার্ট, \*ব্যারা-কা, বেল, \*বেঙ্কিন,

বোভ, \*\*ব্রাই, ক্যাক, ক্যাম্ফ,

ক্যাফ, ক্যাম্প, \*কার্কো এ,

কার্কো-ভে, \*কষ্ট, সিড, \*চিন,

\*চিন সল, \*ডিজি, ইলাট, ইলাপ্স,

ইউপ-পার্কো, ইউপ-পাপু, \*ফের

জেলস, গ্রাফ, \*\*হিপ, হাইওস,

আইওড, \*ইপি, কালী-বা, কালী-

কা, \*ল্যাক, \*লাইকো, লোব,

\*ম্যাগ-কা, \*\*মার্ক, মেক্স, \*\*

ম্যাট-মিউ, \*নাইট-এসি, \*নক্স,

\*ওপি, \*ফস-এসি, \*ফস, পডো,

\*পলিপ, পেট্রো, রোব, রস,

স্রাবাড, সোর \*\*স্রাম, সারাক,

\*সিকেল, \*সিপি, \*\*সিলি, ষ্টাক,

ষ্ট্রাম, \*সলফ, টার, \*থুজা,

ভেলের, ভিরাট । [ :—\*নক্স ।

প্রভূত, রক্তসঞ্চয় সংযুক্ত শীতাস্থে

প্রভূত, বস্ত্রাবৃত স্থলে :—ক্যাম ।

প্রভূত, অল্প শীতাস্থে :—\* ইউপ-

পার্কো ।

প্রভূত, মস্তক ভিন্ন অনাবৃত স্থলে

:—থুজা । [ পর :—ইপি ।

প্রভূত, কুইনাইন অপব্যবহারের

গৃহের অভ্যন্তরে :—\*ইপি ।

উত্তাপের কয়েক ঘণ্টাপরে :—

আর্স । [ \*নক্স ।

কম্পসহ :—সিড, কফ, ইউপ-পার্কো,

নিদ্রাকালে :—আর্স, বেল, ক্যাম্ফ,

চেলিড, ক্যাম, \*\*চিন, \*\*কোন,

হাইওস, ফস, স্রাবাড, থুজা ।

ঈষৎ :—এণ্ট, এপিস, সিন, \*সিনা,

ইলাপ্স, \*ইউপ-পার্কো, ইউপ-

পাপু, ইয়ে, \*ইপি, কালী-আ-

ইওড, ল্যাক, লেড, নক্স-ম, নক্স,

সিপি, সিলি ।

সুগন্ধি :—কোপ, রোড ।

তিক্তগন্ধি :—ভিরাট ।

রক্তগন্ধি :—\* লাইকো ।

কপূর-গন্ধি :—ক্যাম্ফ ।

এলডার ( elder ) মকুলগন্ধি :—

সিপি ।

কস্তুরিগন্ধি :—পলস, সলফ ।

ক্রিম-গন্ধি ( ছাতাপড়ারদ্বারা গন্ধ

বিশিষ্ট ) :—পলস, সলফ ।

দুর্গন্ধি :—\*আর্গ, আর্স, \*ব্যারা-কা,

বেল, \*কার্কো-এ, কার্কো-ভে,

সাইম, কোন, \* ডলক, ইউকর,  
ফের, \*গ্রাফ, গোয়াজ, কালী-কা,  
\*ল্যাক, লেড, \* লাইকো, ম্যাথ-  
কা, \* মারকিউরিয়াল, \*\*মার্ক,  
\*নাইট-এসি, \* নক্স, পলস, \*  
রস, রোব, \*সিপি, \*সিলি, ষ্টান,  
ষ্টাক, প্লিজি, সলফ, ভিবাট ।

পলাণ্ডু-গন্ধি :—\*বোভ, \*ল্যাক, \*  
লাইকো ।

পচা-গন্ধি :—কার্সো-ভে, ডাক,  
লেড, রস, ট্রাম, \*ষ্টাক, ভিরাট ।

রেউচিনি-গন্ধি :—রিউম ।

অল্প-গন্ধি :—একন, \*আণ, আর্স,  
এসায়, \*\*ব্রাই, ক্যাক, কার্সো-  
ভে, \* কষ্ট, ক্যাম, সাইম, গ্রাফ,  
\*হিপ, হাইওস, আইওড, \*ইপি,  
লেড, \* লাইকো, \* ম্যাথ-কা,  
মার্ক, জাট-মিউ, \*নাইট-এসি,  
নক্স, রস, \*সিপি, \* সিলি ।

ঈষৎ অল্প-গন্ধি :— ( হামে যেমন  
হয় ) \* ফেরি-মিউ ।

গন্ধক-গন্ধি :—\*ফস ।

মূত্র-গন্ধি :—বার্ক, \* ক্যাস, ক-  
লোস, \* নাইট-এসি ।

অশ্রুমূত্র-গন্ধি :—\* নাইট-এসি ।

চর্ট চটে :—এন্ট-টার্ট ।

মলত্যাগের পূর্বব :—মার্ক ।

আকস্মিক :—ইপি। [ওড ।

কথা বলিবার সময় :—গ্রাফ, আই-  
হাঁটিবার পর :—সলফ ।

হাঁটিবার সময় :—এগার, এম্বা,  
ক্রস, কক, কালী-কা, লেড, জাট-  
মিউ, সেলেন, সিলি ।

উষ্ণ :—একন, এন্ট, বেঞ্জিন, ক্যান্ড,  
ক্যাম, কক, ড্রস, ইগ্নে, কালী-কা,  
ল্যাক, লেড, জাট-মিউ, নক্স,  
ওপি, ফস, সিপি, ষ্টাক, ট্রাম ।

ঔষ্যতা লাগাইলে সহজে ঘর্ষ  
নিঃসরণ :—কার্সো-ভে ।

খুইয়া ফেলা কঠিন :—\*ম্যাথ-কা,  
\* মার্ক ।

### ঘর্ষের অবস্থান,—

উদরে :—এম্বা, \*এনাক, সিক, \*\*  
ড্রস, ষ্টাক ।

বাহুতে :—ইপি, \* মারকিউরিয়াল ।

কঙ্কে :—\* বেঞ্জিন, \*বোভ, ক্যাপ্স,  
চিন-সল, ডলক, \* কালী-কা,  
ল্যাক, \*নাইট-এসি, পেট্রো ।

পৃষ্ঠে :—চিন-সল, ডলক, হাইওস,  
ইপি, ল্যাক, পেট্রো, প্লান্ট, পলস,  
\* সিপি, \*সলফ ।

পৃষ্ঠে, কটিদেশে :—প্লান্ট-মেজ ।

পূর্বে, ত্রিকদেশে :—প্লাট-মেজ ।

সর্বশরীরে :—\*এন্ট-টার্ট, \*বেজিন,

কক, \* কট, কফ, ডলক, ইলাপ্স,

গম-পট, হাইওস, আইওড, লেড,

\*লাইকো, \* সারকিউবিরাণ, \*

জাট-মিউ, \* নাইট-এসি, ওপি,

\* ফস, পলস, সিকেল, গিপি \*

\* সিলি, \* ট্রাম, সলফ ।

সর্বশরীরে, মুখমণ্ডল ব্যতীত :—

\*বস, \*সিকেল ।

সর্বশরীরে, মুখমণ্ডল ও মস্তক

ব্যতীত :—\*থুজ ।

সর্বশরীরে, সম্মুখ ভাগে :—আর্জ,

\* ক্যাক, গ্রাফ, মার্ক, ফস, \*

সেলেন ।

সর্বশরীরে, নিম্নভাগে :—সিনাব,

ফ্রোক, সাইক্রে, ইউফর ।

সর্বশরীরে, উর্দ্ধভাগে :—এসার,

আর্জ, \* ক্যাম, সিনা, ডলক, ই-

উপ-পার্পু, ইপি, কালী-কা, লরো,

নক্স, ওপি, \* রিউম, সিপি, স্পিজি

সলফ-এসি, ভেলেব, ভিবাট ।

সর্বশরীরে, কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নহে

:—লাইকো ।

বক্ষঃস্থলে :—\* এনাক, \* বেজিন,

বেভ, ক্যাক, সাইম, কক,

গ্রাফ, \* সিপি ।

মুখমণ্ডলে :—এলম, কফ, \* \* ড্রস,

সোর, \* পলস, বস, শ্রাবাড, \*

শ্রাফু, \* সিলি, \* ট্রাম । [রস ।

মুখমণ্ডল ব্যতীত সর্বশরীরে :—

মুখমণ্ডল ও মস্তকে কেবল :—

সিলি । [পলস ।

মুখমণ্ডলের দক্ষিণপার্শ্বে :—এলম,

পদে :—বেল, ক্যাক, ক্যাম্ফ, ক্যাস,

\* কার্বো-এ, কার্বো-ভে, ড্রস,

গ্রাফ, লেড, \* পেট্রো, ফস, পলস,

\* \* সিলি, ট্রাফ ।

পদতলে :—\* \* নাইট-এসি, শ্রাবাড

কপালে :—\* সিনা, ইলাপ্স, ইউপ-

পার্পু, ইপি, কালী-কা, লেড, ওপি,

\* ট্রাম, \* ভিরাট । [ ট্রাফ ।

জননেন্দ্রিযে :—ক্যাস, কোন, জেলস,

পুংজননেন্দ্রিযে :—\* সিপি ।

বামহস্তে :—এনাক ।

হস্তদ্বয়ে :—ক্যাস, \* সিনা, কক, \*

কালী-কা, লেড, ফস, সিকেল ।

হস্তদ্বয়ে, পর্যায়ক্রমে :—কক ।

হস্তের তালুতে :—ক্যাক, কফ, ডিজি,

ডলক, আইওড, পেট্রো, \*সোর ।

মস্তকে :—ক্যাক, সাইম, ইউপ-পার্পু

ওপি, পেট্রো, ফস, শ্রাবাড, \*

সিলি ।

মস্তকের পশ্চাৎপ্রদেশে :—সলফ ।

কেবল মস্তকে :—\* গিলি ।

প্রদাহিতস্থলের উপরিভাগে :—  
গ্রাক ।

সন্ধিতে :—লাইকো ।

জানুতে :—ক্যাক ।

জানুগহ্বরে :—\* কার্কো-এ ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গে :—ক্যাক, কোন হাই-  
ওল, পেট্রো, সারাক ।

ঘাড়ের :—ইলাপ্স ।

নাকে :—\* দিনা ।

কৃষ্ণহানে :—\* এণ্ট-টার্ট, এম্ব্রা, কক,  
মার্ক, ফ্লোর-এসি, সিপি, সিলি ।

বস্ত্রাবৃত্তস্থানে :—\* একন, \* বেল,  
ক্যাম । [সল ।

বস্ত্রদ্বারা প্রচাপিতস্থানে :—চিন-  
অনার্বতস্থানে :—\* থুজা ।

একাদ্বে :—\* একন, ব্যারা-কা, বেল,  
ব্রাই, \* ক্যাক, ক্যাম্প, কষ্ট,  
ক্যাম, চিন, গ্রাক, হেল, হিপ,  
ইমে, ইপি, লেড, \* লাইকো,  
মার্ক, নল্ল, পেট্রো ফস, পলস,  
রিউস. রস, স্যাবিন, স্যাসু, \*  
সেলেন, \* সিপি, সিলি, স্পিজি,  
স্পঞ্জ, \* সলফ, \* থুজা ।

বস্ত্রি-গহ্বর-প্রদেশে :—ক্যাছ ।

মূলাধারে :—চিন-সল, কোন, \*  
হিপ, \* কালী-কা, \* সোর, থুজা ।

মস্তকের কেশাবৃত্ত স্থানে :—  
পলস, রোব ।

অণুকোষে :—\* থুজা ।

কৃষ্ণ পার্শ্বে :—\*\* এম্ব্রা, নল্ল ।

বাম পার্শ্বে :—\* ব্যারা-কা, \* পলস  
ফস ।

অশয়িত পার্শ্বে :—\* বেঞ্জিন ।

এক পার্শ্বে :—\* এম্ব্রা, একন,  
\* ব্যারা-কা, বেঞ্জিন, ব্রাই, ক্যাম,  
চিন, লাইকো, নাইট-এসি নল্ল-  
ম, \* নল্ল, \*\* পলস, রস, সলফ ।

শয়িত পার্শ্বে :—\* একন, ব্রাই,  
চিন, \* নাইট-এসি ।

দক্ষিণ পার্শ্বে :—নল্ল, \* পলস ।

উভয় পার্শ্বে :—\* মার্কিউব্রিয়াল ।

উরুতে :—এম্ব্রা, \* কার্কো-এ,  
হিপ, সিপি ।

উরুর অভ্যন্তর দিকে :—\* থুজা ।

### বর্ষাকালীন লক্ষণ ।

উদরের ক্ষীণতা :—ট্রাম ।

উত্তম ক্ষুধা :—ট্রাম ।

উৎকর্ষ :—আর্গ, বার্ক, ব্রাই,  
ক্যাক, কক, ফের, ম্যাক্স, জাউ-  
কা, নল্ল, ফস, পলস, সিপি,  
সলফ ।

উৎকর্ষা, উপশমিত :—একন,  
ব্যায়-ক।

পৃষ্ঠে, বেদনা :—কোর্কো-ভে।

শরীরের নিম্নভাগ উত্তপ্ত ও  
অনাঙ্গ :—ওপি।

শরীরের নিম্নভাগ আরক্ত, উত্তপ্ত,  
ও অনাঙ্গ :—\* ট্রাম।

অস্থিতে বেদনা :—\* ইউপ-পার্কো।

শ্বাস, সশব্দ :—\* ওপি।

বক্ষঃস্থলে বেদনা :—\* ব্রাই।

উদর-বেদনা :—নক্স, ট্রাম।

টিকার :—নক্স।

কাস :—আর্স, ব্রাই, \* ড্রুস, ইপিকা।

কাস, আক্কেপিক :—\* ড্রুস।

আবৃত থাকিতে ইচ্ছা :—একন,  
ইথ, অর, ক্রিম, কলচি, কোন,  
নক্স-ম, \*\* নক্স, শ্রাঘু \* সিলি,  
\* ট্রাম, ট্রেন।

দুর্বলতা :—এম্বা, \* বেঞ্জিন, ব্রাই,  
ক্যাক, ক্যান্থ, কক, \* কার্কো-এ,  
\* চিন, চিন-সল, ক্রোক, ডিজি,  
\* ফের, গ্রাক, হাইওস, ইথে,  
আইওড, লাইকো, \* মার্ক, স্রাট-  
মিউ, \* নাইটার, \* কস, সোর,  
সিপি, \* ষ্টান, সলক, টার।

প্রলোপ :—থুজা।

অতিসার :—একন, চিন-সল, ট্রাম,  
সলক।

অতিসার, রাত্ৰিকালীন :—চিন-সল।

স্বপ্ন :—পলস।

শ্বাস-কষ্ট :—এনাক, ক্যান্টে, মার্ক।

কর্ণ-বেদনা :—ইথে।

কর্ণ-নাদ :—আর্স, ইথে।

উদ্বেদ :—কোন। [ একন।

স্নায়বীয় উত্তেজনা প্রশমিত :—

অবসাদ :—\* বেজ, ক্যান্থ, \* কার্কো-  
এ, \* চিন, ইথে।

হাত পায়ে বেদনা :—সিড।

চক্ষে জ্বালা :—ট্রাম।

মুখমণ্ডলের শীতলতা :—কাক,  
ল্যাক, নক্স।

মুখমণ্ডলের শুষ্কতা :—\* কালী-বা।

মুখমণ্ডলের উত্তপ্ততা :—বেল, নক্স,  
শ্রাবাদ।

মুখমণ্ডলের মৃতবৎ পাণ্ডুরতা :—  
\*\* ভিরাট। [ কোন, সিপি।

মুখমণ্ডলের আরক্ততা :—বেল,  
মূর্ছা :—এনাক, \* এপিস, আর্স,  
চিন, ইথে, সলক।

পদের শীতলতা :—সিড, আইওড।

পদের খল্লী :—পলস।

পদের বেদনা :—\* নাইট এসি, ট্রাক।

পদের স্পর্শ-দ্রব্য :—গ্রাক, \*\*সিলি ।

পদের কন্দুকের স্পর্শ-দ্রব্য :—

\*\* নাইট-এসি ।

হস্তাঙ্গুলী, রজকবৎ কুঞ্চিত :—

এণ্টজু, \*কাঞ্চ, \*মার্ক, ফস-এসি,

ভিরাট ।

হস্তাঙ্গুলী, কুঞ্চিত :—এণ্ট, \*কাঞ্চ,

\*মার্ক, ফস-এসি, ভিরাট ।

হস্তের শীতলতা :—কাঞ্চ, সিড,

কালী-বা, নাইট-এসি ।

হস্তে খন্নী :—পলস ।

হস্তের উত্তপ্ততা :—নক্স ।

মস্তকে, রক্তসঞ্চয় :—খুজা ।

মস্তকে, গুরুত্ব :—আর্স, কষ্ট ।

মস্তকে, গর্জ্জনধ্বনি :—কষ্ট ।

শিরঃপীড়া :—আর্গ, ইউপ-পার্কো,

ফের, ভ্রাট-মিউ, রস, খুজা ।

ঘর্ষসহ শিরঃপীড়ার আরম্ভ :—

ফের । [ :—ভ্রাট-মিউ ।

শিরঃপীড়া ক্রমে ক্রমে উপশমিত

শিরঃপীড়া, পিপিসাৎকার উপ-

শমিত :—চিন-সগ ।

হৃৎকম্প :—সিড, মার্ক ।

ক্ষুধা :—সাইমেন্স, \* সিনা ।

জজ্ঞায় বেদনা :—কার্কো-ভে ।

জজ্ঞায় দুর্বলতা :—আর্স, আই ও ড ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শীতলতা :—সিকেল

বাচালতা :—\*\*পলস ।

মুখশোষ :—সিড ।

মুখ বিকাশিত :—\* ওপি ।

নখের নীলবর্ণ :—\*নাইট-এসি ।

বিবমিষা :—\*ড্রস, গ্নন, ইপি, মার্ক,

খুজা ।

স্নায়বীয়তা—কঞ্চি ।

গাত্রে ধূমের স্থায় গন্ধ :—বেল ।

বেদনা, অনাবৃত্ত হইলে :—ট্রাম,

ট্রন ।

বেদনা, কঞ্চি ও তামাক সেবনে

বিবর্জিত :—ইয়ে ।

বেদনা, অনুপশমিত :—ইউপ-

পার্কো, কালী-কা, ল্যাক, মার্ক,

ভ্রাট-কা, ভ্রাট-মিউ, নক্স, পলস,

রস, ট্যাবাক, টিলিয়া ।

বেদনা, উপশমিত :—\* আর্গ,

ব্রাই, ক্যালাড, চেলিড, \* ল্যাক,

\* ভ্রাট-মিউ, \* নক্স, সিকেল ।

বেদনা, উপশমিত, শিরোবেদনা

ভিন্ন :—ইউপ-পার্কো ।

বেদনা, উপশমিত, ক্রমে ক্রমে

:—বেল, \*\* ভ্রাট-মিউ ।

বেদনা, অস্থি-বেষ্টে :—\* আর্গ ।

নাড়ী, সবিরাম :—সিকেল ।

নাড়ী, দুর্বল :—চিন-সল, সিকেল ।

শ্বাস, দ্রুত :—সিড ।

অস্থিরতা :—ব্রাই, ল্যাকনা ।

দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ :—ব্রাই ।

পার্শ্ব, সূচীবোধ :—মার্ক ।

স্বক, জ্বালা :—মার্ক, ওপি ।

স্বক, কণ্ঠরস :—এপিস, কলোস,

ফ্লোর-এসি, ম্যাক্স, পাব, বোড,

রস । [চিন, মার্ক ।

স্বক, অল্প অল্প সিদ্ধ বস্তু :—ক্যাক্স,

স্বক. টাটান :—ক্যাপ্স, ক্যাম,

কোন ।

নিদ্রা :—আর্থ, আর্স, বেল, কর্কো-

এ, চেলিড, চিন, সিক, সিনা,

সাইক্রে, ইউফন, ফের, হাইওস,

ইথের, কানী-কা, মেজ, মিউব-

এসি, নাইট-এসি, নক্স-ম, \*ওপি,

ফস, ফস-এসি, প্লাট, \*\*পডো,

\*পলস, \*\*রস, জ্বাড, সোর,

সেলেন, সলফ । [\*ওপি ।

নিদ্রা, গাঢ় নাকডাক বিশিষ্ট :—

নিদ্রা, অস্থির :—\*সলফ ।

পৃষ্ঠবংশের উপদাহ :—এগের ।

পৃষ্ঠবংশের প্রচাপনে ব্যথিততা :

—চিন-সল । [এগের ।

পৃষ্ঠবংশের স্পর্শে অনুভবাবিক্য :

পৃষ্ঠবংশের দুর্বলতা :—এগের ।

স্বর্গকালে লক্ষণের বৃদ্ধি :—\*ফের,

\*ইপি, মার্ক, \*ওপি ।

পূর্ব বিদ্যমানলক্ষণের বিরতি :—

আর্স, ক্যালাড, সাইম, ইলাট,

জেলস, \*জাট-মিউ, জাম্বু, সিকেল ।

পূর্ব-বিদ্যমান লক্ষণের ক্রমে ক্রমে

বিরতি :—\*\*জাট-মিউ ।

কুশ্নন :—সলফ ।

পিপসা :—একন, এনাক, \*\*আর্স,

ক্যাডে, \*সিড, \*\*চিন, \*চিন-

সল, \*\*কফ, কোন, ইউজেন,

হিপ, আইওড, মার্কিউরিয়াল,

\*\*জাট-মিউ, ফস-এসি, রস,

সিকেল, \*ড্রাম, টার, থুজা ।

পিপাসাসহ স্বস্তারম্ভ :—ককি,

থুজা ।

পিপাসা পরিশূন্যতা :—\*এপিস,

ব্যারা-কা, \*ক্যাক্স, \*ক্যাপ্স,

কষ্ট, \*সাইম, \*সিনা, ইউপ-

পাপু, ইউফর, হেল, \*ইথের নক্স,

\*জাম্বু, ষ্টাফ, ড্রাম, \*ভিরেট ।

পদাঙ্গুলীতে স্পর্শদ্রব্য :—\*\*নাইট-

এসি । [কফ ।

দন্তবেদনা :—কার্কো-ভে, চিন, \*

দন্ত-বেদনা, শীতল জল মুখেধারণ

করিলে উপশম পড়ে, কিন্তু

সেই জল উষ্ণ হইলে পুনরায়

উপস্থিত হয় :—ব্রাই, \*কক ।

কম্পন :—এপিস, আর্ম, নক্স, রস ।

অনারুত হইতে ইচ্ছা :—\* একন,

ক্যাক, \*ইউপ-পার্কো, ফের, আই-

ওড, লেড, মিউব-এসি, জাট-মিউ,

\*ওপি, স্পিজি, ষ্টাক, ভিরাট

মূত্র, অধিক :—একন, ডলক, ফস ।

মূত্র, লোহিত :—সিড । [ ডলক ।

মূত্র, পরিমাণে অধিক :—এন্ট-টোট,

মূত্র, দুগ্ধবৎ :—ফস ।

মূত্র, স্বল্প :—সিড ।

মূত্র, দৃঢ় :—ডলক ।

মূত্র, ঘোলা :—\* ইপি, ফস ।

শীতপিত্ত :—\*এপিস, \* বস ।

শিরার স্ফীততা :—\* এগেব ।

শিরোঘূর্ণন :—ল্যাকনা, অকজ-এসি ।

অপরিচ্ছন্নদৃষ্টি :—ট্রাস ।

বমন :—\*আর্ম, ক্যাক, চিন, ড্রস,

\* ইউপ-পার্কো, ইপি, সলফ ।

বমন, তিক্ত :—\* ইউপ-পার্কো ।

বমন, শীতলপানীয় পানাস্থে :—

\* আর্ম, চিন । [ক্যাক ।

বমন, কালে বদনের শীতলতা :—

বমন, ভুক্তদ্রব্য :—\*ইউপ-পার্কো ।

বমন, নিদ্রা হইতে জাগরণ কালে

:—এমাক, জাট-মিউ, নাইট-এসি ।

দুর্বলতা :—এপিস, আর্ম, ব্যারা-

কা, ক্যাক, ফের, আইওড, মার্ক,

অক্স-এসি, \*কস, পলস, মোর ।

জ্বরণ :—কষ্ট ।

ঘর্মের হ্রাসপ্রাপ্তি :—

অনারুত বায়ুতে :—এলম, গ্রাক ।

শয্যা পবিত্যাগে :—হেগ ।

আবৃত হইলে :—একন ।

পানাস্থে :—চিন সল ।

আহারাস্থে :—চিন, ফ্লোর-এসি,

ল্যাক, ফস ।

আহাব করিলে :—এনাক, কিউর ।

উষ্ণ খাদ্যদ্রব্য আহারাস্থে :—

কালি-কা, ফস, সলফ-এসি ।

প্রাতে :—বোবাক্স, ল্যাকনা ।

সঞ্চরণে :—\* ক্যাপ ।

নিদ্রায় :—নক্স, ফসেজ, \* জাছু ।

বিচরণে :—ক্যাম, চেলিড, \* পলস,

\* থুজা ।

ঘর্মের বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ।

বায়ুতে বায়ামে :—\* ব্রাই, \*

কষ্ট, \* চিন ।

অনারুত বায়ুতে :—ব্রাই, ক্যাক, \*



কার্কো-এ, \*কষ্ট, \* চিন, গোরাঙ্গ,  
ইপি, কটা, \* সোর ।

শয়, পরিভাগে :—ল্যাক ।

শয়্যার :—\* নাইট-এসি ।

আবৃত্ত হইলে :—\* বেল, \* চিন,  
নাইট-এসি ।

পানে :—কক ।

আহারে :—বারা-কা, বোরাক্স,  
ক্যাক, \* কার্কো-এ, \* কার্কো-  
ভে, কক, কোন, গ্রাফ, ইথে,  
লাইকো, জাট-মিউ, \* নাইট-  
এসি, নক্স, ফস, সাস, সিপি,  
সলফ-এসি ।

চক্ষু বুঝিয়া থাকিলে :—\* কোন ।

ব্যায়ামে :—বেল, বার্ক, ব্রোম,  
ব্রাই, \* ক্যাক, ক্যাহ কার্কো-ভে,  
কষ্ট, \* চিন, \* কক, ইউপিয়ন, \*  
ফের, ফের-মিউ, \* গ্রাফ, \* হিপ,  
\* কালী-কা, লেড, লাইকো,  
মার্ক, \* জাট-কা, জাট-মিউ,  
ওপি, \* ফস, \* সোর, \* টোন,  
সলফ-এসি । ( সঞ্চারণ দ্রষ্টব্য ) ।

মানসিক পরিশ্রমে :—হিপ, \*  
কালী-কা, \* সোর, \* সিপি, \*  
সলফ ।

শয়নাস্থে :—ম্যাগ্নি-সল, মেনি ।

দুইপ্রহর রাত্রিরপর ।—এলম, এম্বা,  
এম-মিউ, ব্যারা-কা, ক্রিস, ড্রস,

কালী-কা, ম্যাগ্নি-মিউ, নক্স, ফস,  
\* সিপি ।

প্রাতে :—এম্বা, পলস ।

সঞ্চারণে :—এলম, এম-মিউ, বেল,  
ব্রাই, ক্যাক, ক্যাম্ফ, ক্যাহ, \*  
কার্কো-এ, \* কষ্ট, \* চিন, চিন-সল,  
\* কক, কিউর, জেলস, গ্রাফ, \*  
হিপ, ইপি, কালী-বা, \* কালী-  
কা, ম্যাগ্নি-কা, \* মার্ক, \* জাট-  
মিউ, \* ফস, \* \* সিপি, \* সিপি,  
\* সলফ, সোর, ভেলের, \*  
ভিবাট ।

গৃহের অভ্যন্তরে :—ক্লোর-এসি ।

রুগ্ন পার্শ্বে :—এম্বা ।

উপবেশনকালে :—এনাক, \* কালী-  
বা, রস, সিপি, ষ্টাক ।

নিদ্রাকালে :—আর্স, বেল, ক্যাম্ফ,  
ক্যাম, চেলিড, চিন, \* \* কোন,  
হাইওস, \* মেজ, \* ফস, \* থুজা ।  
রাত্রির প্রারম্ভে :—এম-কা, আর্স,  
কোন, মিউর-এসি, ট্যাবাক,  
থুজা, ভিরাট ।

প্রথম নিদ্রায় :—ক্যাক ।

ধূমপানে :—কক ।

প্রতিবার মলত্যাগাস্থে :—\* ভিরাট ।

শ্লেষ্মা বমনাস্থে :—\* ভিরাট ।

জাগরিত হইবামাত্র :—ক্যাহ, \*  
জাষ্, \* \* সিপি, \* সলফ ।

গৃহের উষ্ণতায় :—গ্লাউ-বেজ ।

আর্দ্র ঋতুতে :—কিউর ।

শীতল বাতাসে :—কিউর ।

লিখিলে :—\* হিপ, \* কালী-কা,  
\* সিলি, \* সলফ ।

ঘর্ম্মের পর ;—

শীত :—\* কার্শো-ভে, করণ-ফ ।

কাস :—ইউপ-পার্শো, সিলি ।

অভিসার :—পলস ।

ক্ষুধা :—\* সিনা, ঠাঁফ ।

দুঃক্ষুধা :—\* সিনা ।

উন্মাদবশ :—কুপ ।

অবসন্নতা :—আর্স ।

নিদ্রা :—নক্স-ম ।

পিপাসা :—বেল, বোরাক্স, \* \*  
লাইকো, নক্স, ভাবাড ।

পিপাসা, অতিশয় :—লাইকো ।

বমন :—\* সিনা ।

দুর্বলতা :—আর্স ।

বিরামকালীন লক্ষণ ।

উদরের স্ফীততা :—\*আর্স, চিন,

গ্রাফ, ভাট-মিউ, সিলি ।

উদরে খন্ডী :—ভিরাট ।

উদরের প্রসারিততা, আহাৰান্তে

:—কার্শো, \*কালী-কা, লাইকো ।

উদরে বেদনা :—এন্ট-টার্ট, নেড,  
পলিপ, রাণ-ব, সলফ ।

অম্লদ্রব্যে স্পৃহা :—\* এন্ট, আর্গ,  
আর্স, ডিজি, ইউপ-পার্শো, কালী-  
বা, পলিপ, পলস, সিকেল ।

শীতলবাতাসে অনুভবধিক্য :—  
ব্যারা-কা, \* হিপ, নক্স-ম ।

একাকী থাকিতে অপাবগতা :—  
লাইকো ।

একাকী থাকিতে ইচ্ছা :—চিন ।

নীরক্ততা :—\*আর্স, কার্শো-ভে, \*  
চিন, \*কেয় ।

উৎকর্ষ :—একন, ক্যাফ ।

ক্ষুধা, উত্তম :—এলম, ক্যাফ ।

ক্ষুধার অভাব :—একন, এন্ট, এপিস,  
আর্গ, আর্স, ব্রাই, ক্যাম্প, কার্শো,  
কক, চিন, কবণ-ফ, সাইক্লো,  
ডিজি, গ্রাফ, ইথে, ইপি, কালী-কা ।

শয্যায় থাকার আবশ্যিকতা :—  
\*ক্যাফ ।

প্রতে, কবস্ত্র কাল দর্শন :—\*নক্স ।

জলপানে মূত্রাশয়ে বেদনা :—  
ক্যাফ ।

শরীরের প্রতে, কস্থানে চাপদিলে  
বেদনা :—ব্রাই ।

অস্থিতে বেদনা :—আরেণিয়া, \*

আর্ণ, ব্রাই, কষ্ট, \* ইউপ-পার্কো,  
নক্স, রস । [ লাইকো ।  
অস্ত্র-কুজন ( পেটডাকা ) :—  
মস্তিকে রক্ত-সঞ্চয়ের লক্ষণ :—  
একন, \* আর্ণ, চিন, লাইকো,  
\* ময়, \* ওপি, ফস, সিপি,  
সলক ।  
ক্রান্তিপানের ইচ্ছা :—নক্স, পলস ।  
কুটাম্বে অরুচি :—বেল, কোন,  
সাইক্রে, ইগে, কালী-কা, লাইকো,  
ভাট-মিউ, নাইট-এসি, নক্স, ফস-  
এসি, ফস, পলস, রস ।  
শ্বাসে, দুর্গন্ধ :—জেলস, \* পডো ।  
শ্বাস, বিরক্তিকর :—\* পডো ।  
শ্বাসের দুর্গন্ধ স্বয়ং বুঝা যায় :—  
হিগ, পডো ।  
শ্বাসের হ্রাস :—\* ক্যাক ।  
শ্বাসে হৃদয়ের, য় গন্ধ :—গ্রাফ ।  
শ্বাসে অগ্নিগন্ধ :—\* আর্গিকা ।  
শ্বস্তবৎ অনুভব :—\* আর্ণ ।  
কোলে উঠিয়া বেড়াইবার ইচ্ছা  
:—\* ক্যাম ।  
মস্তকে রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণ :—  
\* ওপি । ( মস্তিষ্কজ্জেরা ) ।  
বক্ষঃস্থলে আকুঞ্জন অনুভব :—  
আর্স, ক্যাপ্স, কার্কো-ভে, কক,  
ইগে, কালী-কা, ভাট-মিউ, পলস,

ভাবাড, ভাবু, স্পিজি, ষ্টান, ট্রাম,  
সলক, ভিরাট ।  
বক্ষঃস্থলে বেদনা :—ভাবাড ।  
বক্ষঃস্থলে চাপ সহ্য হয়না :—ল্যাক  
সর্বদা শীত শীত অনুভব :—এ-  
নাক, \* আর্স, ব্রাই ক্যাপ্স, কক,  
ডাক, ডিজি, \* হিগ, লেড, ভাট-  
মিউ, পলস, ভাবাড, রাণ, সিলি,  
ভিরাট ।  
বিরাম, পরিষ্কার :—ক্যাপ্স, ড্রস,  
ইগে, সাবাড, চিন-সল ।  
বিবাম, পরিষ্কার নহে :—\* একন,  
\* ক্যাক, কার্কো-এ, চেলিড, \*  
সিনা, \* ইউপ-পার্কো, \* জেলস,  
ইপি, \* ভাট-মিউ ।  
কফিসেবনে অরুচি :—নক্স ।  
সহজে শব্দমালাগে :—\* ব্যারা-কা, \*  
ক্যাক, কষ্ট, ডলক, নোর ।  
চক্ষুর শুরমগুলের পাণ্ডুবর্ণ :—\*  
ইউপ-পার্কো, ফের, লাইকো,  
ভাবাড ।  
টঙ্কার :—এলম, আর্স, বেল, ক্যাক,  
ক্যাক্স, কষ্ট, \* ক্যাম, সিনা, ডিজি,  
ড্রস, হাইওস, ইগে, মার্ক, নক্স,  
\* ওপি, ফস-এসি, ষ্টান, ট্রাম,  
ভেলার, ভিরাট ।  
কোষ্ঠবদ্ধ :—এলম, এনাক, এন্ট,

\*ব্রাই, ক্যাক, কার্কেঁ, চিন, কক,  
কোন, ফের, গ্রাক, ইয়ে, লেড,  
লাইকো, ম্যাগ্নি-মিউ, \* ছাট-  
মিউ, \* নক্স, \* ওপি, \* ফস,  
পলিপ, সাবড, সিলি, ট্রাক, ট্রাম,  
\* সলফ, ভিরাট ।

কাস :—এন্ট-টার্ট, এপিস, আর্গ,  
আর্স, বেল, ব্রাই, চিন, \* সিনা,  
কক, কোন, \* ড্রস, \* ইউপ-  
পার্কো, হিগ, হাইওস, ইয়ে, ইপি,  
লাইকো, মার্ক, ছাট-মিউ, নক্স-ম,  
নক্স, ওপি, ফস, \* পলস, সিপি,  
সিলি, স্পঞ্জ, ট্রান, সলফ ।

মুখাকৃতি, মলিন :—\* আইওড,  
লাইকো, \* ছাট-মিউ ।

আবৃত থাকার প্রয়োজন :—\*হিপ  
আবৃত থাকিতে বিরক্তি :—ক্যাক,  
\* সিকেল ।

অতিসার :—এন্ট-টার্ট, এন্ট, \*আর্স,  
ক্যাক, ক্যাক্স, ক্যাম, চিন, সিনা,  
করণ-ফ, ডিজি, ড্রস, \* জেলস,  
ইয়ে, \*\* আইওড, মার্ক, ম্যাগ্নি-  
কা, নাইট-এসি, নক্স, ফস, ফস-  
এসি, পলস, রস, স্তাবিন, সিলি,  
\* সলফ, ভেলার, ভিরাট ।

অতিসার, অতি প্রত্যাধে :—\*সলফ

শীতল পানীয় পানের আকাঙ্ক্ষা :

—ডলক ।

শোথ :—চিন, ফের, ইউপ-পার্কো ।

কর্ণ-নাদ :—\* চিন ।

জীর্ণতা :—আর্স, কার্কেঁ, চিন, ফের,  
আইওড, মার্ক, \* ছাট-মিউ,  
নক্স, ওপি, ফস-এসি ।

উল্গার :—\* এলম, এন্ট-টার্ট, \*  
আর্গ, চিন, লাইকো, পলস, সাবড ।  
অক্ষিপুট, সংযোজিত :—কালী কা  
অক্ষিপুট, অন্ধনির্মীলিত :—\*পডো,  
ট্রাম, \* সলফ ।

উপরের অক্ষিপুটের স্ফীততা :—  
এপিস, \* কালী-কা ।

অক্ষি-তারার প্রসারিত :—ট্রাম ।

মুখমণ্ডল, স্ফীত :—\* আর্স, ফের ।

মুখমণ্ডল, কর্দ্ধমবর্ণ :—\* আর্স ।

মুখমণ্ডল, প্রমাত্তে আরক্ত :—\*ফের

মুখমণ্ডল, পাণ্ডুবর্ণ :—এনাক, \*আর্স,

\* ক্যাক, কার্কেঁ, চিন, সিনা,  
ডাক, ফের, ইয়ে, লাইকো, মেজ,  
নক্স, পেট্রো, ফস, পলস, \*সিকেল,  
স্পঞ্জ, ট্রান, সলফ, ভিরাট ।

মুখমণ্ডল, পীতবর্ণ :—\*আর্গ, \*আর্স,  
ক্যাক্স, চিন, \* ইউপ-পার্কো,  
ফের, \*ছাট-মিউ, \*নক্স, পেট্রো,  
রস, সিপি ।

মুখমণ্ডলে পীতবর্ণ চিহ্ন :—ফের ।

মূচ্ছা :—আর্গ, \*আর্স, ব্রাই, ক্যাক,

কার্কো, কষ্ট, চিন, সিনা, কক,  
কোন, ডিজি, ইয়ে, ইপি, লাই-  
কো, জাট-মিউ, নাইট-এসি,  
নল্ল, ওপি, পলস, তিরাট, সাবাড,  
সলফ ।

বসাদ্রব্যে অরুচি :—কার্কো-এ,  
কার্কো-ভে, হেল, হিগ, জাট-মিউ,  
পেট্রো, পলস, সিকেল ।

বসাদ্রব্যের আকাজ্জা :—নাইট-  
এসি, নল্ল ।

পদের শীতলতা :—কার্কো ভে, গ্রাফ,  
হাইওস, লাইকো, রস, সিপি, সিলি ।

পদের আর্জতা :—\* কাক ।

পদের গুরুতা :—ক্যাছ ।

পদের ক্ষীততা :—ব্রাই, ক্যাপ্স,  
কষ্ট, চিন, ফের, লাইকো, নল্ল,  
পলস, সিপি, সিলি । [ পলিপ ।

উদরাগ্নান :—\*\* কালী-কা, লাইকো,  
আহারে অরুচি :—\* এণ্ট, আর্স,  
ইপি, কালী-কা ।

শীতল আহারে স্পৃহা :—ভিবাট ।

সরস দ্রব্য আহারে স্পৃহা :—ফস-  
এসি, তিরাট ।

নানাবিধ আহারে স্পৃহা :—ব্রাই ।

তরল আহারে স্পৃহা :—ষ্টাক ।

অত্যন্ত আহারে পরিতৃপ্তি :—  
লাইকো ।

আহারে হৃদশূন্যতা :—এণ্ট-টার্ট,  
ক্যাছ, \* ডুস, প্রান্ট-মেজ, সিলি ।  
রন্ধন করা ও উষ্ণ আহারে অরুচি  
:—পেট্রো, সিকেল ।

ফলে স্পৃহা :—এলম, \* কস-এসি,  
ভিবাট ।

বরফে স্পৃহা :—ইউপ-পার্কো ।

আমায়িক লক্ষণ :—\* এণ্ট, এণ্ট-  
টার্ট, ব্রাই, \* কার্কো, ডুস, ইপি,  
পলস ।

আমায়িক লক্ষণের প্রাবল্য :—  
একন, \* এণ্ট, এণ্ট-টার্ট, বেল,  
ব্রাই, \* কার্কো-ভে, ক্যাম, কফি,  
ডিজি, ইয়ে, ইপি, \* নল্ল, পলস, রস ।

গ্রন্থির পীড়া :—\* ব্যারা-কা, বেল,  
\* কাক, সিনা, কক, কোন,  
স্পঞ্জ, ষ্টাক, \* সলফ ।

দন্ত-মূল, স্পর্শে রক্তস্রাব :—ষ্টাক ।

দন্তমূল, কলসিয়া যাওয়ার স্থায়  
অমুভব :—নাইম ।

দন্তমূল, শীতাদ্রব্য অবস্থা :—\*  
নাইট-এসি ।

দন্তমূল, সান্তর :—ষ্টাক ।

দন্তমূল, শুভ্র :—ষ্টাক ।

মস্তকের শিখরদেশে জ্বালাকর  
উত্তাপ :—সলফ । [:—চিন ।

মস্তকের শিখরদেশে অশিথিলতা

মস্তক-বেদনা :—আর্স, বেল,

ব্রাই, ক্যান্স, কার্কো-ভে, চিন,

কক, ড্রস, কের, জেলস, ইয়ে,

মেজ, \* ন্যাট-মিউ, \* নল্ল, \*

ওপি, কস-এসি, পলিপ, পলস,

রস, সিপি, ল্পজ, ষ্টান, ভেলের।

হৃৎকম্প :—একন, চিন, ইয়ে, ল্যাক,

মার্ক, \* ন্যাট-মিউ, সিপি, স্পিজি,

সলফ, ভিরাট। [মিউ।

হৃদস্পন্দনে শরীর নড়ে :—\* ভাট-

উত্তাপে অপ্রবৃত্তি :—সিকেল।

নিদ্রাবস্থায় উত্তাপ :—\* ভাষ্।

কুখা :—এন্ট, আর্গ, ব্যাবা-কা, \*

কার্কো-এ, কার্কো-ভে, \* সিনা,

চিন, ডিজি, গ্রাক, ইয়ে, \* আই-

ওভ, লাইকো, \* যেনি, নল্ল,

পেট্রো, রস, সিপি, ষ্টাক, ষ্টাগ,

সলফ, ভিরাট।

কুখা, অথচ খাইতে পারা যায় না

:—ব্যারা-কা, ইয়ে।

কুখা, কিন্তু আহারে শাস্তি জন্মে

না :—এন্ট।

স্ক্রিগ কুক্ষিতে স্পর্শ-দেব :—\*

ইউপ-পার্কো, \* কালী-কা, \* নল্ল।

উগ্রতা :—একন, \* এনাক, বেল,

ব্রাই, \* ক্যাম, চিন, সিনা, কফ,

জেলস, ইয়ে, মার্ক, \* নল্ল,

পলস, সিপি, ভেলের।

সন্ধিহলে বেদনা :—এপিস, আর্গ,

আর্স, ব্রাই, কষ্ট, ক্যাম, চিন,

কক, ইয়ে, ইপি, কস-এসি, \*

পডো, পলস, রস, স্তাবিন, সলফ।

সন্ধিহলে স্পর্শ-দেব :—এপিস।

ভগাধরে ক্রত :—\* ভাট-মিউ।

দ্বৈতপ্রদর, কাপড়ে পীতবর্ণ দাগ

:—\* কার্কো-এ।

উজ্জল জ্যোতিতে বিরক্তি :—নল্ল।

অঙ্গে খস্মী :—ভিরাট।

অঙ্গে বেদনা :—ক্যাক, ক্যান্স,

কার্কো-ভে, কষ্ট, চিন, ড্রস, \*

ইউপ-পার্কো, গ্রাক, লাইকো,

নাইট-এসি, ভাট-মিউ, নল্ল,

পলস, স্তাবিন। [ক্যাহ।

অঙ্গের পক্ষাঘাতবৎ আটুঠতা :—

অঙ্গের স্পর্শ-দেব :—এপিস।

অঙ্গের দুর্বলতা :—ব্যারা-কা, নল্ল।

ওঠে জ্বালা :—এপিস।

ওঠে বিদারিত :—গ্রাক, ইয়ে।

ওষ্ঠ শুক :—ব্রাই, \* কোন, ইয়ে,

\* নল্ল-ম, রস।

ওষ্ঠে উদ্বেদ :—ইয়ে, \*\* ভাট-মিউ,

\*\* নল্ল, রস।

যক্ৰতে বেদনা :—আর্স, বেল, ব্রাই,

ক্যাম, ডলক, চেগিড, চিন, \*

কালী-কা, লাইকো, মার্ক, \* ভাট-

মিউ, \* নল্ল, পলিপ, পডো, পলস।

দক্ষতের ক্ষীণতা :—চিন ।

মাংসে অরুচি :—এলম, \* আর্গ.

আর্স, বেল, ক্যাক, কার্কো-ভে,  
ক্যাম, ডাক, ফের, গ্রাক, ইয়ে,  
লাইকো, মার্ক, নাইট-এসি, ওপি,  
পেট্রো, পলস, রস, ভাবাড,  
সিকেল, সিপি, সিলি, সলফ ।

মাংসে স্পৃহা :—\* ম্যাথি-কা, \*\*  
মেনি ।

রজঃ, বিলোপ :—আর্স, ক্যাক,  
ক্যাম, চিন, কোন, ফের, গ্রাক,  
কালী-কা, লাইকো, মার্ক, নক্স  
পলস, সিপি, সিলি, সলফ ।

রজঃ, অতি সত্ত্বর প্রত্যাবৃত্ত :—এ-  
কন, এলম, আরেণ, আর্স, ব্যারা-  
কা, বেল, ব্রাই, \* ক্যাক, কার্কো-  
ভে, ক্যাম, কক, ফেব, হাইওস,  
ইয়ে, কালী-কা, লেড, লাইকো,  
মার্ক, নক্স, পেট্রো, ফস, রস,  
ভাবিন, সিপি, স্পঞ্জ, টাক, সলফ,  
ভিরাট ।

রজঃ, অতি বিলম্বে প্রত্যাবৃত্ত :—  
বেথ, কট, চিন, কোন, ফের,  
গ্রাক, হাইওস, ইয়ে, ইপি, কালী-  
কা, লাইকো, স্কাট-মিউ, পলস,  
ভাবাড, সিলি, সলফ ।

রজঃ, অতি প্রভূত :—একন, আ-  
রেণ, আর্স, ব্যারা-কা, বেল, \*

ক্যাক, ক্যাম, চিন, সিনা, ফের,  
হাইওস, ইয়ে, ইপি, লেড, লা-  
ইকো, মার্ক, স্কাট-মিউ, নক্স,  
ওপি, ফস, ভাবিন, সিপি, সিলি,  
স্পঞ্জ, টান, ট্রাম, সলফ ।

রজঃ, অতি অল্প :—এলম, কোন  
গ্রাক, লাইকো, স্কাট-মিউ, ফস,  
\* পলস, ভাবাড, সিলি, সলফ,  
ভিরাট ।

দুগ্ধে অরুচি :—পলস ।

দুগ্ধে স্পৃহা :—এপিল, চেলিড ।

মুখের কোণে উদ্বেদ :—ইয়ে, \*\*  
স্কাট-মিউ, \*\* নক্স, রস ।

মুখের কোণে স্পর্শ-দ্রব ও কতঃ-  
নাইট-এসি ।

মুখ ধুইবার ইচ্ছা :—\*\* নক্স, গুজা ।

মুখের স্নায়িককিবিলীর পাণ্ডুবর্ণ :—  
\* ইউপ-পার্কো, \* ফের ।

মুখের অবদারণ :—কার্কো-এ ।

পেশীঘৃষ্টবৎ অমুভবঃ—কার্কো-এ ।

বিবমিষা :—এন্ট-টাই, এন্ট, আর্গ,  
আর্স, ক্যাম্প, ড্রস, ইউপ-পার্কো,  
গ্রাক, হিপ, হাইওস, ইপি, \*  
নক্স, রস; ভাবাড, সিলি ।

গ্রীবাব পৃষ্ঠে বেদনা :—ফের ।

স্নায়বীয়তা :—সিড, \* ক্যাক, চিন,  
কক, \* জেলস, ইয়ে, নক্স, পলস,

রস, ভেলেব । [মিউ ।  
 নৈশঘর্ষ :—\* চিন, কালী-কা, ভাট-  
 জলপূর্ণ স্ফীততা :—এপিস, চিন,  
 ফের, ইউপ-পার্কো ।  
 তালু বলসানবৎ অমুভবঃ—সাইম ।  
 ঘর্ষ :—আস, চিন, ল্যাক, সলফ ।  
 আচার ভক্ষণের স্পৃহা :—\*এন্ট ।  
 নাড়ী, নড়িলে চড়িলে বিবদ্ধিত  
 গত :—এন্ট-টাট, \* ডিজি,  
 জেলস ।  
 নাড়ী, পূর্ণ :—একন, বেল, ব্রাই,  
 ডিজি, ফের, জেলস, হাইওস,  
 ল্যাক, ওপি, ট্রাম ।  
 নাড়ী, দ্রুত, পরে মৃদু :—এন্ট ।  
 নাড়ী, মৃদু :—চোলড, চিন, \* ডিজি,  
 সিকেল, \* ভিবাট ।  
 নাড়ী, তৃতীয়, পক্ষম বা সপ্তম  
 স্পন্দন বিরামশীল :—\* ডিজি  
 নাড়ী, সূত্রবৎসূক্ষ্ম :—একন, জে-  
 লস, ল্যাক ।  
 নাড়ী, দুর্বল :—\* একম, আস, \*  
 কার্কো-ভে, চিন, \* কুপ, ফের,  
 জেলস, \* গোয়াজ, ল্যাক, \*  
 লরো, \* ওপি, \* সিলি, \* ট্রানো,  
 \* ভিরাট ।  
 বিরাম, ঈষৎ :—\* ইউপ-পার্কো ।  
 ( অস্পষ্ট দ্রষ্টব্য ) ।

অস্থিরতা :—এপিস, সিত, আইওড, রস  
 বাত :—\* একন, এন্ট-টাট, আর্গ,  
 \* বেল, \* ব্রাই, কার্কো-ভে, \* কপ,  
 ক্যাম, নক্স, \* পলস, \* রস,  
 থুজা, ভেলাব, ভিবাট ।  
 লাল, তীব্র :—নাইট-এসি ।  
 লাল, তিক্ত :—চেলিড ।  
 লাল, রক্তাক্ত :—জেলস ।  
 লাল, লবণাক্ত :—এন্ট, আইওড ।  
 লাল, আঠাআঠা :—\* নক্স-ম ।  
 লাল, এতৃত :—ইপি, পডো ।  
 লাল, অম্ল :—ইগে । [ বা ।  
 লাল, সূত্রবৎ :—কোন, \* কালী-  
 লালাস্রাব :—আইওড, পডো ।  
 দক্ষিণ স্বাদ্ধাত্ত্বি বিন্ম কোণেব  
 নীচে বেদনা :—চেলিড ।  
 ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে উপশমানুভব  
 :—\* ব্রাই ।  
 বাম পার্শ্বে বেদনা :—এপিস ।  
 দীর্ঘ শাস্ত্যাগ :—ভিবাট ।  
 নিমগ্নতা ( সিংকিং ) :—\* ক্যাম্ফ,  
 \* কার্কো ।  
 ত্বক, নীলবর্ণ :—\* ভিরাট ।  
 ত্বক, কণ্ডূয়ন :—হিপাব, ইগে, বস ।  
 ত্বক, শীতবর্ণ :—একন, আর্গ, আস,  
 বেল, ক্যাম, চিন, ডিজি, \* ইউপ-



পার্কো, ফেব,\* জাট-মিউ, \*নক্স,  
 পলিপ, পলস, রস, মলফ ।  
 নিদ্রা, স্বপ্নসংযুক্ত :—একন, ইগে,  
 ট্রাম ।  
 নিদ্রা, অস্থির :—একন, এপিস,  
 সিনা, ফেব, ইগে, বস, ট্রাম ।  
 নিদ্রা, নাক-ডাকা সংযুক্ত :—ইগে,  
 \* ওপি ।  
 নিদ্রালুতা :—একন, আর্গ,বেল,ব্রাই,  
 ক্যাক, কার্কো, হাইওস, মার্ক,  
 ওপি, সাবড, স্পিজি, ষ্টাণ, ট্রাম,  
 মলফ, ভেলেব ।  
 নিদ্রাহীনতা :—আর্স, বেল, ব্রাই,  
 কার্কো, চিন, সিনা, কফ, হাই-  
 ওস, ইপি, লেড, মার্ক, জাট-মিউ,  
 নাইট-এসি, ওপি, পলস, রাণ-ব,  
 রস, সিলি, স্পিজি ।  
 তন্দ্রালুতা :—এন্ট-টার্ট,বেল, কাগ,  
 কক, হাইওস, \*ওপি, পলস,বস ।  
 অল্পদ্রব্যে অকুচি :—কক ।  
 অল্পদ্রব্যে স্পৃহা :—আর্গ, আর্স,  
 কক, ডিজি, ইউপ-পাপু, কালী-  
 বা, পলিপ, পলস, সিকেল ।  
 পৃষ্ঠবংশের উপদাহ :—\* এগার, \*  
 জিক ।  
 প্রীহা, বিবর্দ্ধিত :—আরেগিরা,আর্স,  
 বেল, চিন, ফের, \* আইওড,

মার্ক, মেল, নাইট-এসি, পলস ।  
 প্রীহা প্রদেশে বেদনা :—এপিস,  
 আর্স, চেলিড, চিন, ফের, \*জাট-  
 মিউ, \*\* নক্স, টার ।  
 নিষ্ঠীবন, রক্তাক্ত :—নক্স ম ।  
 আমাশয়ের খল্লী :—ভিরাট ।  
 আমাশয়ের প্রসারণ :—নক্স,সাবড  
 আমাশয়ে পূর্ণতানুভব :—লাইকো,  
 \* জাট-মিউ, রস ।  
 আমাশয়ে বেদনা :—একন, আর্গ,  
 আর্স, ক্যাক, কষ্ট, \* চেসিড,  
 কক, কোন, ফেব, ইগে, লা-  
 ইকো, জাট-মিউ, নক্স, পলস,  
 রস, সাবড, সিপি, সিলি, ষ্টাণ,  
 ভিরাট । [ রস ।  
 আমাশয় প্রদেশে চাপ :—এন্ট,  
 আমাশয়ে আক্ষেপ :—আর্স, বেল,  
 ব্রাই, কার্কো, ক্যাম, কক, ফের,  
 ইগে, জাট-মিউ, নক্স,পলস, সিলি,  
 ষ্টান, মলফ, ভেগের, ভিরাট ।  
 ঘর্ম্ম, দুর্বলকর :—\* চিন ।  
 ঘর্ম্ম, দুর্বলকর নয় :—\* জাছু ।  
 ঘর্ম্ম, আগ্রতাবস্থায় অধিক :—  
 \* জাছু । [ ভিরাট ।  
 ঘর্ম্মস্রাব :—\* চিন, \* জাছু, সিলি,  
 স্বাদ, তীব্র :—চিন ।  
 স্বাদ, তিক্ত :—এন্ট, আরেগ, \*আর্গ,

আর্স, ব্রাই, ক্যাক, কার্কো, ক্যাম, চেলিড, * চিন, চিন-সল, কোন, ড্রুস, ডলক, ইউপ-পার্কো, ফের, জেলস, গ্রাক, হিপ, ইপি, লাক, লাইকো, ম্যাগ-কা, মার্ক, ঝাট- মিউ, নাইট-এসি, * নক্স, ফস- এসি, পলিপ, সোর, পলস, রস, আবিন, ঠাক, সলফ, থুজা ।	নক্স, পেট্রো, * পডো, প্লাট, রস, সিলি, সোব, ঠাক ।
হাদ, তিক্ত, ধূমপানাস্তে :—এনাক, পলস ।	হাদ, লবণাক্ত :—আর্স, কার্কো, চিন, মার্ক, ঝাট-মিউ, সিপি ।
হাদ, তিক্ত, জল ব, তীত, অজ্ঞাত দ্রব্যের :—একন ।	হাদ, সাবানেব ন্যায় :—কাইট ।
হাদ, তিক্ত, মিঠ :—মেনি ।	হাদ, অম্ল :—ক্যাক, ক্যাপ্স, ক্যাম, গ্রাক, ইথ, আইওড, লাক, * লাইকো, ম্যাগ-কা, * নক্স, পেট্রো, ফস, পডো, সিপি, থুজা ।
হাদ, তিক্ত, তামাকের :—কক, পলস ।	প্রার্থিতবস্ত্র দিলে দূব করিয়া দেওয়া :—* ক্যাম ।
হাদ, তাঁবাটে :—কালী-বা ।	পিপাসা :—ক্যাছ, চিন, সিক, সাইম, * ডলক, সলফ, ভিরাট ।
হাদ, বসাবৎ :—লাইকো ।	গলায়, ক্ষত প্রবণতা :—* বার্বা-কা ।
হাদ, লবণাক্ত মৎস্তের শ্যাব :— এনাক ।	তামাকে অরুচি :—এলম, আর্গ, বেল, ক্যাক, চিন, ডাক, ইথে, লেড, ঝাট-মিউ, নক্স, ফস, রস, সিপি, স্পিজি, ঠাগ ।
হাদ, লোহার শ্যাব :—সাইম ।	তামাকের হাদহীনতা :—এন্ট-টার্ট ।
হাদ, ধাতব :—কক, মার্ক, নক্স, পলিপ, রস ।	জিহ্বার কৃষ্ণবর্ণ :—ইলাপস ।
হাদ, পচা তৈলের শ্যাব :—ইপি ।	জিহ্বার রক্তস্রাব :—কিউর ।
হাদ, পচা :—* আর্গ, বেল, ক্যাপ্স, ক্যাম, ফেব, গ্রাক, হিপ, হাইওস, মার্ক, ঝাট-মিউ, নাইট-এসি, *	জিহ্বায় ফোকা :—ক্যাপ্স, কার্কো- এ, ক্যাম, * ঝাট-মিউ, থুজা ।
	জিহ্বার বিস্তীর্ণতা ও প্রান্তভাগের বিদীর্ণতা :—কালী-বা ।
	জিহ্বা, কপিশবর্ণ :—আর্স, ইলাট,

হাইওস, আইওড, লাইকো,  
কস, ভিরাট।  
জিহ্বাব মধ্যস্থল কপিশবর্ণ, প্রান্ত  
ভাগ হুত্র :- আইওড।  
জিহ্বার মধ্যভাগে কপিশবর্ণ  
বেধা :- আর্ণ, ইউপ-পার্পু,  
আইওড, ল্যাক, কস।  
জিহ্বায় জ্বালা :- কার্কো-এ, সাইস।  
জিহ্বায় দক্ষনঃ অনুভব :- সোব।  
জিহ্বা দন্তের পশ্চাতে আটকিয়া  
যায় :- ল্যাক।  
জিহ্বা পবিকাব :- এসম, এগিস,  
ক্যাক্ট, কষ্ট, চিন-সম, \*\* সিনা,  
ডিজি, ডুন, ইল্যাম, জেলস, ইগে,  
ইপি, লাইকো, ম্যাথ-কা, পলস,  
সিকেল, ট্রাম, সলফ, \* গুজা।  
জিহ্বা গাঢ় লেপাবৃত :- \* এণ্ট,  
আর্ণ, ব্যান-কা, ব্রাই, ক্যাহ  
চেলিড, চিন, আইওড, কালী-বা,  
মেজ, \* নয়, দস, পলিপ।  
জিহ্বা শীতল :- \* ক্যাম্ফ, ক্যামো-  
ভে, \* ভিরাট।  
জিহ্বা আকুপ্ত :- কার্কো-ভে।  
জিহ্বা বিদাবিত :- কিউব, লাইকো।  
জিহ্বা শুষ্ক :- আর্ণ, \* বেল ক্যাক,  
কার্কো-ভে, কষ্ট, ডলক, লাইকো,  
জাট-মিউ, + নল-ম, প-ডা, পলস,

ট্রাম।  
জিহ্বা, শুষ্ক, পৃষ্ঠভাগে :- হিপাব।  
জিহ্বা, শুষ্ক, প্রান্তভাগে :- কক  
জিহ্বাব প্রান্তভাগ আরক্ত :- \*\*  
এণ্ট-টার্ট, বেল, ক্যাহ, জেলস,  
কস, সিকেল, \* ভিরাট।  
জিহ্বার প্রান্তভাগ আবদ্ধ, মধ্য-  
ভাগ হুত্র :- বেল। [ভে।  
জিহ্বা অল্প অল্প ফাটা :- কার্কো-  
জিহ্বা, মলারূত ও মধ্যভাগেব  
নিম্ন হইতে লাল বেধাক্রিত  
:- \* আর্স।  
জিহ্বায় চুল থাকায় নয় অনুভব  
:- \* গিলি।  
জিহ্বা কণ্ডুবন :- সিড।  
জিহ্বা বৃহত্তর :- পলস, ট্রামো।  
জিহ্বা, সীস-বর্ণ :- + কার্কো-ভে।  
জিহ্বা, চিত্রবিচিত্র :- ল্যাক, জাট-  
মিউ, \* টাব।  
জিহ্বা শ্লেষ্মাবৃত :- \* পলস।  
জিহ্বায়, শীতাত শ্লেষ্মা :- ক্যাম্ফ।  
জিহ্বায় বেদনা :- কোন, গ্রাট,  
হিপ।  
জিহ্বা পাণ্ডুবর্ণ :- \* ইউপ-পার্কো,  
কেব, ইপি, কালী-কা, \* সিকেল।  
জিহ্বা-কণ্টক সমুন্নত :- একন, \*

এন্ট-টার্ট, বেল, মেজ, নক্স-ম।  
 জিহ্বা-কটক আরক্ত :—\*একন,  
 এপিস, বেল, মেজ, নক্স, ট্রাম।  
 জিহ্বা বাহির করিতে পারা যায়  
 না :—এপিস, ল্যাক, ট্রাম।  
 জিহ্বা, আকম্পিত :—\*ওপি।  
 জিহ্বা, অবদীর্ণ :—\*এপিস।  
 জিহ্বা, লোহিত :—\*এন্ট-টার্ট, \*  
 এপিস, \*বেল, কিউব, ইলাপ্স,  
 হাইওস, লাইকো, সলফ, \*থুজা।  
 জিহ্বা লোহিত ও শুভ্র রেখা  
 যুক্ত —\*\* এন্ট-টার্ট।  
 জিহ্বা-কেন্দ্রে লোহিত বেখা :—  
 কস-এসি।  
 জিহ্বা, খবম্পর্শ :—এনাক।  
 জিহ্বাব মধ্যভাগে লাল :—সাইম।  
 জিহ্বায় স্পর্শ-দ্রব :—\*এপিস,  
 ট্যাবাক্স।  
 জিহ্বায় মলিন, আবক্ত, অশুভবা-  
 ধিকাবিশিষ্ট চিহ্ন :—টাব।  
 জিহ্বা, অ্যুচফ্ট :—কোন, ডলক,  
 লাইকো।  
 জিহ্বা, লক্সামরিচের গুডিক।  
 বিক্ষিপ্তবৎ :—একন, এন্ট-  
 টার্ট, এপিস, \*বেল।  
 জিহ্বার স্ফীততা :—ডলক, সিক,  
 ইলাপ্স, \*থুজা, তিরিট।

জিহ্বার অগ্রভাগ নীলবর্ণ :—  
 আব্রাদ।  
 জিহ্বার অগ্রভাগ রক্তবর্ণ :—আর্স,  
 ল্যাক, নক্স, পলিপ, \*রস, তিরিট,  
 সিকেল। [সিকেল, সোর।  
 জিহ্বার অগ্রভাগ শুক :—\*রস,  
 জিহ্বার অগ্রভাগে স্পর্শ-দ্রব :—  
 \*হিপ, কালী-কা, \*থুজা, সাবাবড  
 জিহ্বার অগ্রভাগে ত্রিভুজাকার  
 চিহ্ন :—\*বস।  
 জিহ্বা, দন্তেব চিহ্নে চিহ্নিত :—  
 চেলিড, \*মার্ক, \*পডো।  
 জিহ্বা, বিকম্পিত :—ক্যাক্স, ক্যাঙ্ক,  
 ল্যাক, লাইকো, \*ওপি।  
 জিহ্বায় ক্ষত :—ক্যাক্স।  
 জিহ্বার পার্শ্বে ও অগ্রভাগে ফোকা  
 কষ্ট, লাইকো, সিপি, থুজা।  
 জিহ্বা, শুভ্র :—এনাক, \*\* এন্ট,  
 আর্গ, আর্স, ব্যারা কা, ক্যাক্স,  
 কার্কো, চেলিড, চিল, সিনা, কক,  
 ডিজি, ইউপ-পার্কো, ফের, গ্রাফ,  
 ইপি, কালী-কা, ল্যাক, ম্যাগ্নি-কা,  
 মেজ, ঝাট-মিউ, নাইট-এসি, নক্স-  
 য, নক্স, ফস, প্লাস্ট, পডো, পলিপ,  
 \*পলস, বস, সাবাবড, সারাক্স,  
 সিপি, সোর, সলফ, ষ্টাফ, ট্রাম,  
 তিরিট।

জিহ্বা, শুভ্র কেল্লহানে, মলিন  
রেখা পার্শ্বদ্বয়ে :—পেট্রো । [ টাট ।

জিহ্বা, দুগ্ধবৎ শুভ্র :—\*\* এণ্ট-  
জিহ্বা, শুভ্র পার্শ্বদ্বয়ে, লাল মধ্য-  
ভাগে :—ক্যাম ।

জিহ্বা, কেল্লহানে শুভ্র বা পীত-  
বর্ণ, প্রাস্তভাগে পাণ্ডুবর্ণ :—  
চিন-সল ।

জিহ্বা; কেল্লহানে শুভ্র বা পীত  
বর্ণ; প্রাস্তভাগে লোহিতবর্ণ :  
—চেলিড, জেলস ।

জিহ্বা পীতবর্ণ :—আর্গ, আর্স,  
বোভ, ব্রাই, ক্যাহ, কার্কো,  
সিড, ক্যাম, চেলিড, চিন, ইউপ-  
পার্কো, ফের, জেলস, ইপি, কালী-  
বা, জাট-মিউ, নাইট-এসি, \*নক্স,  
ওপি, \* পডো, পলিপ, \*পলস  
সিকেল, সলফ, সোর ।

তালুনুলের কঠিনতা :—\*ব্যারা-কা

মূত্রযন্ত্রের উপদাহ :—ক্যাহ ।

মূত্রস্রাবে কষ্ট :—\*ক্যাহ ।

মূত্রস্রাব, বারংবার :—ক্যাহ, ক্যাম,  
\*ইউপ-পাপু, ফস-এসি, প্লাট ।

মূত্রস্রাব, বারংবার রাত্রিতে :—  
\*ফস-এসি । [ পাপু ।

মূত্রস্রাবে বেদনা :—ক্যাহ, ইউপ-

মূত্রস্রাব, প্রভূত :—ক্যাহ, \* ইউপ-  
পাপু, \*ফস-এসি ।

মূত্র, ক্লষ্ণবর্ণ :—ক্যাহ ।

মূত্র, কপিশবর্ণ :—ক্যাম্ফ, সাইম ।

মূত্র, বসাময় :—চিন-সল ।

মূত্র, হরিদ্বর্ণ :—ক্যাম্ফ, প্লাট ।

মূত্র, পাণ্ডুবর্ণ :—ক্যাম, \* ইউপ-  
পাপু, খুজা, \* ফস এসি ।

মূত্র, লোহিতবর্ণ :—ব্রাই, ক্যাম্ফ,  
\*লাইকো, নক্স । [কা ।

মূত্র, লোহিত ও পীতবর্ণ :—কালী-

মূত্র, পীতান্ত :—ক্যাম্ফ ।

মূত্র, ঘোলা :—এণ্ট-টাট, ক্যাম,  
চিন, সিনা, ডলক, গ্রাফ, ইপি, \*  
লাইকো, মার্ক, \* জাট-মিউ \*\*  
নাইট-এসি । [ নক্স ।

মূত্র, দুর্গন্ধময় :—\* নাইট-এসি,

মূত্র, স্থল :—\* এপিস, ব্রাই, চিন,  
লাইকো, জাট-মিউ ।

মূত্র, বিলুপ্ত :—ষ্ট্রাম ।

মূত্র, উত্তপ্ত :—সাইম \*

মূত্র, ক্রিয়াকালপরে দুগ্ধাকার  
ধারণ :—সিনা ।

মূত্র, ইষ্টক চূর্ণের ন্যায় অধঃক্ষেপ  
:—চিন, চিন-সল, \*লাইকো, \*  
জাট-মিউ ।

মূত্রে, শুভ্রবর্ণ অধঃক্ষেপ (তলানি)  
:—গ্রাক ।

মূত্রে, অশ্বমূত্রের ন্যায় গন্ধ :— \*  
নাইট-এসি ।

শীতপিত্ত :—\*এপিস, \*হিপার, \*রস ।

ধীরেধীরে হাঁটিতে ইচ্ছা :—\*ফের ।

উদ্ভিজ্জ আহারে স্পৃহা :—এলম ।

শিরার ক্ষীততা :—ফের ।

শিরোগ্রন :—একন, আর্গ, আর্স,

বেল, ক্যাক, কট, ক্যাম, কক,

কোন, ডাক, \*ইউপ-পাপু; ফের,

হাইওস, লাইকো, নাইট-এসি,

নক্স, ওপি, পেট্রো, ফস, পলিপ,

পলস, রাণ-ব, সিগি, সিলি ।

শিরোগ্রন, বামদিকে পতনানুভব

সহ :—\* ইউপ-পাপু ।

বমন :—এণ্ট, এণ্ট-টার্ট, চিন, সিনা,

\* ইউপ-পার্কো, \* ফের, হাইওস,

ইপি, \* লাইকো, মার্ক, নক্স,

সিপি, সিলি, ভিরাট ।

বমন, তিত্ত :—চিন ।

বমন, পিত্ত :—আর্স, \*ইউপ-পার্কো,

ইপি, মার্ক, নক্স, ভিরাট, ট্রাম ।

বমন, ভুক্তদ্রব্য :—আর্স, ক্যাম, \*

ইউপ-পার্কো, \* ফের, ইপি, নক্স,

পলস ।

বমন, শ্লেষ্মা :—মার্ক, নক্স, \*পলস ।

বমন, অম্ল :—\* লাইকো ।

দুর্বলতা :—একন, \* এলম, এপিস,

আর্গ, \* আর্স, ব্যারা-কা, ক্যাক,

ক্যাম্ফ, \* কার্কো-এ, \* কার্কো-

ভে, সিড, \* চিন, চিন-সল, ডিজি,

ইউপ-পার্কু, \* ফের, \* জেলস,

ইয়ে, আইওড, ইপি, লাইকো,

\* ভাট-মিউ, নাইট-এসি, নক্স,

পলিপ, ভিরাট, সলফ ।

বিলাপ-প্রবৃত্তি :—সিনা, নক্স ।

কুমির লক্ষণ :—সিনা ।

## সন্নিপাত জ্বর ।

অক্ষি, নিমগ্ন, ও পাণ্ডু প্রান্তপরি-  
বেষ্টিত : আর্স, ভিরাট ।

" প্রসন্ন ও প্রদীপ্ত : বেল, ওপি ।

" অলস ও দীপ্তিশূন্য : কার্কো-ভেজি ।

" তিথ্যগ্ দৃষ্টি : হাইওস ।

" দৃষ্টি-ক্ষাণতা : হাইওস, ট্রাম, জিক ।

অজ্ঞে, বেদনা : ক্যান্ফ, রস ।

" পক্ষাঘাতবৎ অমৃতব : কক, রস ।

" আক্ষেপিক সঞ্চালন : বেল, হাই-  
ওস, ইগ্রে, মক্, \* জিক ।

অবসন্নতা, অত্যন্ত : এপিস, আর্স,  
ব্রাই, (মার্ক), ফস, \* ফস-এসি, রস ।

অবস্থিতি, ঘন ঘন পরিবর্তিত :  
আর্গ, ব্রাই ।

" অস্থিরতা : ব্রাই, ট্রাম, রস ।

" শব্যাক নিম্নভাগে সায়মা বাওয়া :  
এপিস, মিউব এসি, জিক ।

আমাশায়িক উপসর্গ, বিবমিষা,  
বমন : আর্স, \* ব্রাই, হাইওস,  
ভিরাট ।

" আমাশয়-গহ্বরে বেদনা : আর্স,  
\* ব্রাই, রস, ভিরাট ।

উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, ও পলায়ন-  
প্রবৃত্তি : আর্স, \* বেল, ব্রাই,  
\* হাইওস, মার্ক, ট্রাম ।

উদর, বেদনা : আর্স, \* মার্ক, ফস-  
এসি, রস, ভিরাট ।

" কুজন ( ডাকা ) : আর্স, \* কার্কো-  
ভেজি, \* ফস, \* ফস-এসি, রস,  
টেবেব ।

উদরাময় : এপিস, আর্স, ( ব্রাই ),  
কার্কো-ভেজি, ইপিকাক, ফস-  
এসি, রস ।

" অনৈচ্ছিক : এপিস, \* আর্গ,  
আর্স, কার্কো-ভেজি, ফস-এসি,  
রস, জিক । [ এর্সি, রস ।

" রক্তমব : মিউর-এসি, ফস, নাইট-

" পূষ্ময় ( অল্পে কৃত ) : এপিস,  
আর্স, কার্কো-ভেজি, \* নাইট-  
এসি, ফস, রস, সলফ ।

" হ্রিত : এপিস, আর্স, কার্কো-  
ভেজি, ফস ।

ওষ্ঠ, কৃষ্ণ, কপিশ, বা বিদারিত :  
আর্স, ল্যাক, ফস-এসি, জিক ।

ঔদাস্য, সম্পূর্ণ : এপিস, \* আর্স \*  
কার্কো-ভেজি, কক, হাইওস, ওপি,  
ফস-এসি, ট্রাম । [ ভিন্ন ।

কর্ণ, বধিরতা : আর্গ, কস, ফস-এসি,

" ক্ষতিশক্তির স্বল্পতা : ব্রাই, কার্কো-  
ভেজি, ফস-এসি, রস ।

- কতিশক্তিৰ আতিশয়া : ব্রাই ।  
কর্ণ-মূলপ্রদাহ : একন, বেল,  
ক্যালক-কার্ক ।  
কথা, বলিতে অপ্রবৃতি : ফস-এসি ।  
" বলিতে অশক্তি : এপিস ।  
কাস, আরোগ্যোগ্রাণ অবস্থায় :  
ইপিক, সলফ । [লাইকো, ব্রাই ।  
কোপনতা ও বিবাদপ্রবণতা : বেল  
কোষ্ঠবদ্ধ : এপিস, \* ব্রাই, কক ।  
জিহ্বা, পক্ষাঘাতগ্রস্ত : হাইওস,  
মিউব-এসি ।  
" শুক : আর্স, \* রস, মিউব-এসি ।  
" গাঢ়লপারিত : ব্রাই, কার্কো-  
ভেজি, বস ।  
" প্রায় পবিচ্ছন্ন : ককিউ ।  
" উপকৃত সংযুক্ত : মিউব-এসি, সলফ  
তালুমূলপ্রদাহ, মলিন আবৃত্ততা :  
একন, বেল ।  
" পাণ্ডুর আবৃত্ততা ও তালুমূলে ক্ষুদ্র  
ক্ষুদ্র শুভ্রকৃত : ব্রাই ।  
নাসিকা, রক্তশ্রাব : ব্রাই, কার্কো-  
ভেজি, হেম, ফস-এসি ; মার্ক  
( রাত্রিতে ) ।  
" রক্তে কাল মামড়ি : হাইওস, জিহ্বা ।  
নিদ্রালুতা, এপিস, আর্স, কার্কো-  
ভেজি, কক, ল্যাক, ওপি ।  
পীড়কা, আশঙ্কিত : ব্রাই, কাক,  
লাইকো ।
- " শোহিত : ফস-এসি, রস, ট্রাম ।  
" শুভ্র : এপিস, ব্রাই, মিউব-এসি,  
ভেলার ।  
" নীলাভ : কার্কো-ভেজি, তিরাট ।  
" বার্তাকুবর্ণ, কালশিরা : আর্স, ব্রাই,  
কার্কো-ভেজি, ফস-এসি, জিহ্বা ।  
পেরিটোনাইটিস : আর্স, বেল,  
কার্কো-ভেজি, ইপি, ওপি ।  
প্রলাপ, প্রচণ্ড : বেল, ওপি, ট্রাম ।  
" অবাস্তব বস্তু দর্শন : বেল, হাই-  
ওস, বস ।  
প্লীহা, ক্ষীত : আর্স, \* ককিউ, \*  
ফস-এসি, রস ।  
ফুসফুসের, বোগ : এপিস, আর্স,  
\* ব্রাই, কার্কো-ভেজি, ইপি,  
ল্যাক, মস্ক, নাইট-এসি, \* ফস,  
\* রস, সেনেগা ।  
" যকৃতের আকৃতি ধারণ : ল্যাক,  
নাইট-এসি, \* ফস, রস ।  
" কাস, নিঃশ্বাস সংযুক্ত : আর্স,  
ল্যাক, ফস, রস, সেনেগা ।  
" বক্তাক্ত নিঃশ্বাস : ল্যাক, ফস, রস ।  
" শোথ : কার্কো-ভেজি, এন্ট-টাট ।  
বিষাদ, ও যাতনা : বেল, পলস ।  
মুখমণ্ডল, আরক্ত : বেল, নক্স-ভম,  
ওপি, রস ।  
" পাণ্ডুর ও নিষগ্ন : আর্স, ফস-এসি,  
তিরাট, জিহ্বা ।



মুত্র, অণ্ডলালময় : ফস-এসি, ব্রস।

" কপিশ-আরক্ত : ব্রাই, তিরিট।

" জলবৎ : ব্রাই, মিউর-এসি।

" অনৈচ্ছিক : এপিস, আর্গ, আর্স।

যক্কদ্রোগ : মার্ক।

রক্তস্রাব, অজ হইতে : \* নাইট-

এসি, ফস-এসি, আর্স কার্কো,

ইপি, ফস।

শয্যা-কৃত : আর্স, ফস-এসি, জিক,

ব্রোর-এসি।

শোথ, অধঃশাখার : আর্স, চায়না,  
লাইকো, সলফ।

স্ফোটক : আর্স, বেল, লাইকো,  
সিলি, সলফ।

স্মৃতিহীনতা : এনাকার্ড।

হনু, নিয়ন্ত্রণ বুলিয়া পড়া (মস্তিষ্কের  
পক্ষাঘাতের আশঙ্কার লক্ষণ) :

আর্স, কার্কো-ভেজি, ল্যাক, লা-  
ইকো, \* ওপি, \* জিক।

# জ্বর-রোগে ব্যবস্থেয়

প্রধান প্রধান ঔষধের

প্রয়োগ-লক্ষণ ।

---

## আইওডিন ।

পাণ্ডুবর্ণ, যাতনাব্যঞ্জক মুখাকৃতি; অধিক লালাস্রাব; অতিবিক্ত ক্ষুধা, কিছুতেই ক্ষুধাব নিবৃত্তি জন্মে না; আহারে বিলম্ব হইলে বোঁগী অবসন্ন হইয়া পড়ে । অধিক আহার সত্ত্বেও রোগীব দিন দিন শীর্ণতা জন্মে । বাম কুক্ষি প্রদেশ টিপিলে শক্ত ও ব্যথিত বোধ হয় । দুই দিন অন্তর জ্বরে বিরামের দুইদিন উদরাময় অথবা ত্র্যাহিক জ্বরে কেবল শীত ও তাপ; অবসহকারে যকৃত বা ক্রোমেব রোগ অথবা জ্বান্তে উদরী বা শোথ থাকিলে; বিশেষতঃ প্লীহার রোগ থাকিলে আইওডিন ব্যবহৃত হয় । গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্তা নারীগণেব পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী হয় । আইওডিনেব লক্ষণ সন্ধ্যাকালে, আহারের পূর্বে, উপবাসে, ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে, উত্তাপে, মস্তকানবণে ও দ্রুত গমনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, এবং শীতল বাতাসে বা শীতল জল প্রয়োগে, মস্তক অনাবৃত্ত করিলে, আহাবাস্তে, ও শয্যা হইতে উত্থানে হ্রাস পড়ে ।

---

## আজুফুরা ।

জ্বরে পৃষ্ঠ, হস্ত, ও হস্তাঙ্গুলী এবং পায়েব পাতা ঠাণ্ডা থাকিলে এবং কণ্ঠে হাঁটু ও পায়ের আজুলে খাল ধরিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । জজ্বা

ঘরে অভ্যস্ত ক্লান্তি অনুভব, এবং সামান্য পরিহাসেও অসহ্যতা ইহাব বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—অপসাহ তিনটার সময় শীত। তৎপরে অল্প অল্প তাপ । কম্প ও অতিশয় পিপাসা, তৎপরে তাপাবস্থার অভাব । শীতের পূর্বে পিপাসা । তাপাবস্থায় কেবল মাথা উষ্ণ থাকে, দেহ ও গাল শীতল থাকে, কপাল ও শঙ্খস্থল কামড়ায, তৃষ্ণা থাকে । শেষ রাত্রিতে ও কেবল কপালে ঘর্ষ হয় ।

## আরেনিয়া ডায়েডিয়া ।

আরেনিয়া প্রযুক্ত্য জবে প্রায়ই উদ্ভাপ বা ঘর্ষাবস্থা বিদ্যমান থাকে না, কেবল শীতাবস্থাই বর্তমান থাকে । এই শীত অনেকক্ষণ থাকে এবং কিছুতেই কম পড়ে না । এই ঔষধ জ্ঞাপক জবে পিপাসাও থাকে না । যদি কখনও অল্প তৃষ্ণা জন্মে তবে তাপাবস্থায়ই জন্মিয়া থাকে । হিম লাগিয়া, জলে ভিজিয়া, অনেকক্ষণ জলে থাকিয়া কাজ কবিয়া অথবা সেন্টসেন্টে ঘরে বাস কবিয়া জ্বর হইলে আরেনিয়া উপযোগী ।

**বিশেষ লক্ষণ ।**—শিরঃপীড়া ও মস্তকে নিশ্জালা অনুভব; ভ্রাম্যকের ধূম পানে ও অনাবৃত বায়ুতে উপশম, রাত্রিতে উপবেশ ও নীচেল দস্ত শ্রেণীতে সহসা বেদনা । হাসবুদ্ধি ।—শীত ও বর্ষাকালে; অনুপস্থলে, ও শীতল জলে স্নানে বৃদ্ধি । ভ্রাম্যকেব ধূমপানে ও অনাবৃত বায়ু দেননে উপশম । জ্বরের সময় ।—প্রতিদিন বা এক দিন পব একদিন ঠিক একই সময়ে জ্বরের প্রকাশ (সিড্রন) । জ্বরের প্রকৃতি ।—প্রাথমিক বা দ্ব্যাহিক জ্বর ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সন্নিবাস জ্বর ।—অনেকক্ষণ স্থায়ী তৃষ্ণাশূন্য শীতাবস্থা; দাহ ও ঘর্ষাবস্থাব প্রায়ই অবিদ্যমানতা; প্রতিদিন বা এক দিন পর একদিন ঠিক একই সময়ে জ্বরের উপস্থিতি; সর্বদা শীতানুভব, বৃষ্টি ও শীতল দিনে উহার অতিশয়া (বস); শিরোবেদনা, অনাবৃত বায়ুতে উহাব উপশম; রাত্রিতে দস্ত-বেদনা; অল্প অল্প লেপাবৃত্ত জিহ্বা, মুখে তিক্ত আশ্বাদ,

তামাক খাইলে উষ্ণতা শক্তি, আহারে অরুচি ; আমাশয়-প্রদেশে প্রস্তর চাপের জায় ভারবোধ ( ব্রাই, অর্স, পলস ), শ্রীহাব বিবুদ্ধি ; ক্রীলোকদিগের নিয়মিত সময়ের অনেক পূর্বে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব ; হস্তপদাদির অতিশয় গুরুত্ব, বোধ হয় যেন হাত পা নাড়িতে পারা যাইবে না । প্রত্যহ একই সময়ে শীতসহ কাস, অনিদ্রা, ও দুর্বলতা ; প্রত্যহ একই সময়ে নীচের কর্তন-দৃষ্টে কষ্টপ্রদ শীতলতা অনুভব, জ্বাষু ও ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব ।

## আর্জেন্টম নাইট্রিকম ।

যেন শবীৰ, বিশেষতঃ মস্তক ও মুখমণ্ডল বৃহত্তর হইতেছে এমন অনুভব ; গলা যেন স্নীত হইয়াছে অথবা উহা অত্যন্তর যেন একখণ্ড কাষ্ঠের চটা রহিয়াছে এপ্রকার বোধ, উদবানয় । প্রতিনিয়ত বা থাকিয়া থাকিয়া শীত ও সর্বদা বিবসিয়া । এইগুলি এই ঔষধ প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ । সবিস্ময়ভাবে ফুসফুস হইতে বক্তপাতেও ইহা ব্যবহৃত হয় । ডাঃ সালজার বলেন যে ম্যালেরিয়া দোষে ও তন্দ্রানিত্য যকৃতের নিবোমিস রোগে আর্জেন্টম নাইট্রিকম প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

## আর্থিক মণ্টেনা ।

বিশেষ লক্ষণগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সবিধান ও সন্নিগাত্তরে আর্থিক ব্যবহৃত হয় । লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য থাকিলে কুইনাইন আটকান আরে এই ঔষধ ব্যবহার কবিলে সুন্দর উপকার দর্শে । দীর্ঘকাল পূর্বের উপঘাতের বেদনা অবকালীন উপস্থিত বা বিবদ্ধিত হইলে আর্থিক সেবনে বেদনা ও অর উভয়েবই প্রতিকার জন্মে ।

বিশেষ লক্ষণ ।—স্নায়ু-প্রধান ধাতু, অনুবেদনা অধিক করিয়া অনুভব । পেশীর বেদনা, অতি দৌর্বল্যবশতঃ সর্বদা শয়নের প্রবৃত্তি, অথচ শয্যা শক্ত বোধ হওয়াতে সতত এপাশ ওপাশ করা । শরীরের উর্দ্ধাংশ উষ্ণ, নিম্নাংশ শীতল, যথা, মস্তক ও মুখ উষ্ণ, কিন্তু দেহ শীতল । অচৈতন্য, কিছু

জিজ্ঞাসা করিলে প্রকৃত উত্তর দান, কিন্তু পরক্ষণেই আবার জ্ঞানশূন্যতা ও প্রলাপ । স্পর্শ-বিষেয । আঘাত বা পতনজনিত রোগ । হ্রাস-বৃদ্ধি ।—  
বিশ্রামে, শয়নে ও সুরাপানে বৃদ্ধি । সংস্পর্শে ও সঞ্চালনে উপশম ।  
জ্বরের সময় ।—প্রায়ই রাত্রি চারিটার সময় বা প্রত্যুষে ; অথবা বৈকালে  
বা সন্ধ্যাকালে অব্যব উপস্থিতি । জ্বরের প্রকৃতি ।—একদিন বা দুইদিন  
অন্তর অব । রক্তসঞ্চয়বিশিষ্ট ( কন্সেট্রিভ ) জ্বর ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরামজ্বর ।—সন্ধ্যাকালে শীত । শীতের  
পূর্বে ও শীতাবস্থায় পিপাসা । জরকালীন অবিবত অবস্থান পরিবর্তনের প্রবৃত্তি ।  
অঙ্গগ্রহ, বোগীর বোধ হয় যেন তাহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে । শয্যা বা  
খট্টা অতিশয় কঠিন বোধ হয় । পচা ডিম্বের তায় আশ্বাদবিশিষ্ট : উদ্যাব  
( সিপি, সলক ) । সন্নিপাতজ্বর ।—হতবুদ্ধিতা ও অতিশয় উদাসীনতা  
( কস-এসি ) । শুষ্ক জিহ্বা ও তাহার মধ্যভাগে কণিশবর্ণ রেখা । মনোজ্ঞাবের  
বিশৃঙ্খলা, কিছু বলিবার সময় বক্তব্য কথা বিন্মবণ ( বাক্য শেষ না হইতে  
হইতে নিদ্রাবেশ \* ব্যাপ্ট ) । \* সর্কাক্সে বেদনা ও দ্বিষ্টতা অমুভব এবং শুষ্ক  
বারংবার পার্শ্বপরিবর্তন । চেতনাবস্থায় বোগীব নিকট শয্যা শব্দ অমুভূত  
হয় ( ব্যাপ্ট ) ; অজ্ঞাতসারে মল-মূত্র নিঃসবণ ।

**আর্গিকা ও ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটেমে প্রভেদ ।**—  
কম্পকালে দুই ঔষধেই তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে কিন্তু জলপান করিলে আর্গি-  
কার বমন ও ইউপেটোরিয়মে বিবনিষা জন্মে । উত্তাপাবস্থায় দুই ঔষধেই  
গাত্র-বেদনা বৃদ্ধি পায় ; ঋশ্মান্তে ইউপেটোরিয়মের শিরোবেদনা ভিন্ন অজ্ঞাত  
বেদনা অন্তর্ভূত হয় , ( যর্শেব সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বেদনার বিলোপ জাট-মিউ ) ।  
বিরামাবস্থায় কোন প্রকার বেদনাই থাকে না । আর্গিকার বিরামাবস্থায়  
শিরঃপীড়া ও পেশীববেদনা অবশিষ্ট থাকে ।

## আর্সেনিকম ।

সামান্য তরুণ জরে একোনাইট বেরুপ উপকারী, উৎকট জরে আর্সেনিক  
সেইরূপ কলপ্রদ । সন্ততজ্বর, ফেটিজর, বা সন্নিপাতজ্বর, ইহার যে কোন

জ্বরে, সন্নিপাত, লক্ষণ, " বিশেষতঃ শুষ্ক জিহ্বা ও উদরাময় ( সচরাচর অজ্ঞাত-সারে মলস্রাব ) প্রকাশ পাইলেই আর্সেনিক ব্যবহের । মধ্যাজ্ঞ-ক্ষয় রোগ ও যক্ষ্মাজনিত বিলেপীজ্বরেও ইহা উপযোগী । পুরাতন বিষমজ্বরেও এই ঔষধি অতিশয় উপকারী । জ্বরের অবস্থাত্রয়ের কোন এক অবস্থার অবিধ্যমানতা, জ্বালাকর দাহ, দ্রুত অবসাদন, নিশ্বেজতা, দুর্বলতা, শোথ, পুতিবাম্পজ ধাতু-বিকৃতি, অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনজনিত ধাতু-দোষ, আর্সেনিক প্রয়োগ করিবার লক্ষণ । আর্সেনিক জ্ঞাপক জ্বরে শীত ও তাপাবস্থার প্রায়ই পিপাসা থাকে না । শীতাবস্থায় উষ্ণ পানীয় দ্রব্য ভিন্ন শীতল জলের পিপাসা থাকিলে আর্সেনিক অব্যবহের । আর্সেনিক প্রযুক্তাজ্বরে জ্বরের অবস্থাত্রয় বিদ্যমান থাকে না । প্রায়ই শীতাবস্থার অভাব দেখা যায় । শীতাবস্থা প্রকাশিত না হইলে তাপাবস্থার আধিক্য ও দীর্ঘস্থায়িত্ব দৃষ্ট হয় এবং অতিশয় গাত্র-দাহ ও দুর্নিবার পিপাসা জন্মে । মাালেরিয়া জ্বর ; অধিক কুইনাইন দ্বারা আবদ্ধ জ্বর ; ম্রীহা, বক্কৎ, শোথ, উদরাময়, মুত্র-রোগাদি উপসর্গ সংযুক্ত পুরাতনজ্বর ; ছদ্মজ্বর অর্থাৎ এক পালায় জ্বর, অপর পালায় ঠিক জ্বরের সময় জ্বর না আসিয়া তৎপরিবর্তে উদরাময়, আময়ক্ক, ঝাশুল, বা হিকা ; কুইনাইন অপব্যবহৃত, শীত ও তাপের আতিশয়াবিশিষ্ট, ঘর্ষপরিশৃঙ্খ জব প্রভৃতিতে সচরাচর আর্সেনিক ব্যবহৃত হয় । উত্তপাবস্থার ষতই আধিক্য, পিপাসার ষতই অনিবার্যতা, এবং গাত্র-দাহের ষতই প্রাবল্য থাকে ততই আর্সেনিক অধিক উপযোগী হয় ।

বিশেষ লক্ষণ ।—অতিশয় দুর্বলতা, শীঘ্র শীঘ্র জীবনীশক্তির অবসাদন ; মোহ ; বিমর্ষ, হঃখিত, নিরাশ, অস্থির, উদ্বিগ্ন, ভয়াকুলিত, অস্থচ্ছন্দ, সহজে বিরক্ত, ক্ষণে ক্ষণে প্রকুণ্ড, এবং মৃত্যুভয়ে সন্ত্রস্ত চিত্ত ; অগ্নি-দাহের জ্বায় জ্বালা ও বেদনা ; দুর্নিবার পিপাসা ও বারংবার অল্প অল্প জলপান ; আহার বা পানাস্তে উদরাময়,—মলিনবর্ণ, দুর্গন্ধময়, অল্প মল নিঃসরণ ; মল নিঃসরণের পর অবদলতা ; অস্থিরতা, একস্থানে বা একভাবে স্থির থাকিতে না পারা ; অল্প পরিশ্রমে অধিক শ্রান্তি ; অতীব শীর্ণতা এবং তৎসঙ্গে সঞ্চে শীতল ঘর্ষ ও দুর্বলতা । ক্রাসবৃদ্ধি ।—রাত্রি হই প্রহরেরপর, শীতলতায়, শীতল পানাহারে ও স্তম্ভিততায় বৃদ্ধি । উত্তাপে ও সঞ্চলনে উপশম । জ্বরের সময় ।—সকল সময়, প্রায়শঃ অপরাহ্ন একটা হইতে হইটা

পৰ্য্যন্ত ; ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ; রাত্রি ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত ।  
জ্বরের প্রকৃতি ।—ঐক্যিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থিক, পাক্ষিক,  
বার্ষিক, অগ্রগামী, বা অনিশ্চিত জ্বর ; কুটনাইন অপসেবিত জ্বরবিরাম বা  
অবিরাম জ্বর ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—প্রত্যহ অপবাহু তিনটার  
সময় শীত, (এপিস, চায়না, নল্ল-ভম, পলস, \* শ্রাবা) । \* কেবল দাহাব-  
স্থায় পিপাসা, বারংবার অল্প অল্প জলপান (চায়না) । জ্বরকালীন অতিশয়  
অস্থিরতা, অস্থিতে কটিতে, ও কপালে বেদনা । নিদ্রার প্রারম্ভে শীতল,  
আঠাবৎ অল্প-গন্ধ ঘর্ম্ম । \* জ্বরের আব্রোশাস্তে অত্যন্ত দুর্বলতা । সন্নিপাত  
জ্বর ।—পাণ্ডুবর্ণ, কুঞ্চিত, অন্তঃপ্রবিষ্ট, শ্রাব বা জ্বেষ পীতবর্ণ, অথবা নীলাভ  
সীসবর্ণ মুখমণ্ডল । কপালে শীতল ঘর্ম্ম । অবিরত ওষ্ঠ লেহন, ওষ্ঠ মলিন,  
শুক ও বিদারিত, দন্তে দন্ত-শর্কবা । শুষ্ক, কুঞ্চিত, নীলাভ বা কৃষ্ণবর্ণ জিহ্বা  
ও উহা বহির্গত করিতে অসমর্থতা । \* দুর্নিবাব পিপাসা, বারংবার অল্প অল্প  
করিয়া জলপান । অচেতন্ত বা মূহগ্রলপ, ও অজ্ঞকম্প । \* অত্যন্ত দুর্বলতা  
বা সম্পূর্ণ অবসন্নতা । \* অতিশয় মানসিক যন্ত্রণা, অত্যন্ত অস্থিরতা, এবং  
মূর্ত্তা-ভয় ।

আর্সেনিক ও সিল্কোনায়ে প্রভেদ ।—আর্সেনিক ও সিল্কোনায়ে  
সংক্ষিপ্ত প্রভেদ এই :—আর্সেনিকে জ্বরের (১) আক্রমণের পূর্বরাত্রিতে  
নিদ্রালুতা, (২) জ্বরের পূর্বে পিপাসাহীনতা ; (৩) বাহ্যিক উত্তাপে শীতের  
উপশম ; (৪) শীতাবস্থায় বারংবার অল্প অল্প উষ্ণ জলপান ; (৫) শীত ও তাপ  
বিস্মিত, অথবা একবার শীত, একবার তাপ ; (৬) তাপাবস্থায় অনাবৃত  
হইতে ইচ্ছা ও তাহাতে উপশম ; এবং দুর্নিবাব পিপাসা ; (৭) প্রায়ই  
ঘর্ম্মাভাব, অথবা অল্প ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা ; (৮) জ্বরের বিচ্ছেদাবস্থায়  
অত্যন্ত দুর্বলতা ; ও জলবৎ অতিসাব বিদ্যমান থাকে । সিল্কোনায়ে (১) জ্বরের  
আক্রমণের পূর্বে রাত্রিতে অস্থির নিদ্রা ; (২) জ্বর আসিবার পূর্বে অতিশয়  
পিপাসা ; (৩) বাহ্যিক উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি ; (৪) শীতাবস্থায় পিপাসা-  
হীনতা ও জলপানে বিবতি ; (৫) অধিককালস্থায়ী উত্তাপ ও নিদ্রা ; মস্তকে  
রক্তাধিক্য বশতঃ শিবঃপীড়া ও আবল্য, (৬) তাপাবস্থায় অনাবৃত হইতে

## ইউপেটোরিয়ম পাপুরিয়ম ।

৬

ইচ্ছা, কিন্তু অনাবৃত্ত হইলে শীতাত্তব (জরের সকল অবস্থায়ই অনাবৃত্ত হইলে শীতাত্তব, মল্ল); তাপাবস্থায় প্রায়ই তৃষ্ণার অভাব, কিন্তু ক্ষুধার উদ্রেক; (৭) দুর্বলকর প্রভূত ঘর্ম (প্রভূত ঘর্ম অথচ দুর্বলকর নহে, গাখ); ঘর্মাবস্থায় অত্যন্ত পিপাসা; (৮) বিরামকালে সহজেই ঘর্মের উদ্রেক, অথবা রাত্রিতে ঘর্ম; উদবেগ উভয় পার্শ্বে বেদনা, ও সম্পূর্ণ ক্ষুধাহীনতা; এই সকল লক্ষণ অবস্থিতি কবে।

## আর্সেনিয়েট অব কুইনাইন ।

একদিন সবিরামজব অন্তদিন জব না হইয়া জরের পরিবর্তে স্নায়ুশূল, উদরাময়, অজীর্ণ, রক্তাতিসার প্রভৃতি উপস্থিত হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ম্যা। লেরিয়া জনিত কুচিকিৎসিত বিমিশ্র প্রকৃতির সবিরাম জরে ও দুর্বল প্রচ্ছন্ন জরে আর্সেনিক ও চাযনা, এই দুই ঔষধ জ্যাকক লক্ষণই প্রকাশ পাইলে ডাঃ হেন। আর্সেনিয়েট অব কুইনাইন ব্যবহারের বিধি দেন। জ্বর জবে লক্ষণানুসারে ঔষধ নির্বাচন করিতে গেলে আলস্যের অনুসরণের শ্রায় প্রায়ই প্রতিনিয়ত ঔষধ পরিবর্তন করিতে হয় অথচ তাহাতে কোন ফল দর্শন। এজন্য, বোগেব মূলে আঘাত করিতে হইলে প্রথমে রোগেব মূল কারণ বা বিশেষ প্রকৃতি অনুসারে ঔষধ নির্দ্ধাষিত করিয়া তৎপরে উহার লক্ষণগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ঔষধ ব্যবহা করিতে হয়। তাহা হইলেই রোগ নিমূল হয়।

## ইউপেটোরিয়ম পাপুরিয়ম ।

বিশেষ লক্ষণ ।—পৃষ্ঠে শীতের আবস্ত। জ্বরের সময় ।—অপরাক্র তিনটা হইতে পাঁচটা। দিবসের ভিন্ন ভিন্ন সময়। জ্বরের প্রকৃতি ।—প্রাত্যহিক; ১। ২ দিন অন্তর; একদিন কম অন্তদিন বেশি জ্বর, দুইদিন জ্বর একদিন বিরাম।



**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—পৃষ্ঠে শীত আরম্ভ হইয়া সর্বশরীরে বিস্তার (ক্যাপ) । \* অপেক্ষাকৃত অল্প শীত সহকারে অধিক কম্প ; শীত ও উত্তপ্ত অবস্থায় পিপাসা ; শীত ও উত্তপ্ত অবস্থায় অস্থিতে তীব্র বেদনা ; মস্তক লঘু অম্লভূত হয় এবং বোধ হয় যেন উহা বায়ুপার্শ্বে পতিত হইবে । বাব বাব অধিক পরিমাণে উষ্ণ প্রস্রাব ত্যাগ, ও তৎপরে অতিশয় দুর্বলতা, উত্তাপ-বস্থায় অশ্রুস্রাব । মূত্রাশয়ে অল্প অল্প বেদনা । জ্বরের পূর্বে ও অবকালীন থাকিয়া থাকিয়া শুষ্ক কাস । উত্তাপাবস্থায় অবসানে অতিশয় কৃদা ( সিনা, সিনোনা ) ।

**ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটম ও ইউপেটোরিয়ম পার্ফুরিয়মে প্রভেদ ।**—ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটেমে জ্বরের পূর্বে তৃষ্ণা এবং পৃষ্ঠে ও অস্থিতে বেদনা , কম্পকালে শীতল জল পানের তৃষ্ণা ; উত্তাপ-বস্থায় নিদ্রা ও পিপাসাব অভাব, ও বিবামাবস্থায় শিরোলক্ষণের অভাব থাকে । ইউপেটোরিয়ম পার্ফুরিয়মে জ্বরের পূর্বে হস্তপদের অস্থিতে বেদনা ও থাকি য থাকিয়া শুষ্ককাস ; কম্পকালে পিপাসা-পবিশ্রুতা বা অল্প পানীয়ে প্রবৃত্তি ; উত্তাপাবস্থায় তৃষ্ণা ; বিরামকালে শিবোষুর্গন ও মাথা যেন বামদিকে পড়িয়া যাইবে এক্রূপ অম্লভব ; এবং বারবার জ্বালাকর মূত্রত্যাগ লক্ষণ থাকে ।

## ইউপেটোরিয়ম পার্ফোলিয়েটম ।

রুদ্ধ ও ভগ্নস্বাস্থ্য বিশেষতঃ অপরিমিত সুরাপান জন্ত ভগ্ন-স্বাস্থ্য ব্যক্তিদ্বি-গের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী । সবিরাম ও স্বল্প-বিরাম উভয় প্রকার জ্বরেই ইহার উপযোগিতা দৃষ্ট হয় । সবিরাম অবস্থায় দুই-বিরাম জ্বরে পরিণত হইবাব সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, অথবা সবিরাম জ্বর আবদ্ধ হইয়া বিলেপী জ্বরে পরিণত হইলেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । অস্থি-বেদনা ইহার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষণ । অস্থি-বেদনাব যতই প্রাবল্য ও সর্বশরীরে পরিব্যাপ্তি থাকে ততই ইউপেটোরিয়ম বিশেষ উপযোগী হয় । ডেঙ্কু জ্বরের অস্থি-বেদনাও এতদ্বারা নিবারিত হয় । ইহার পবে ট্রাট্রিম মিউরিগেটিকম ও সিপিয়া ভাল খাটে ।

**বিশেষ লক্ষণ ।**—পৃষ্ঠ, হস্ত-পদ, মণিবন্ধ, বন্ধঃস্থল, অক্ষি-গোলক, ও হৃৎকের অস্থিতে বেদনা । অস্থি-বেদনা সহকারে ব্রাইওনিয়ার লক্ষণের জ্ঞান

শিরঃপীড়া ; কোষ্ঠবদ্ধ, ও বক্রদেশে বেদনা । ( রাইওনিয়া ও ইউপেটোরিয়মে প্রভেদ এই যে, রাইওনিয়ার ঘর্ষের প্রাচুর্য, বেদনা জন্ত রোগীর স্থিরতা ; ইউপেটোরিয়মে ঘর্ষের অল্পতা বা অভাব, ও বেদনা বশতঃ রোগীর অস্থিরতা থাকে ) । ক্রাস-রুদ্ধি ।—নড়িলে চড়িলে ও শরীর অনাবৃত করিলে বৃদ্ধি । জ্বরের সময় ।—পূর্নাক্ষ ৭টা, অথবা একদিন ৭টা বা ৯টা ( প্রবল ), অল্পদিন ১২টা ( অপ্রবল ) ; অপরাক্ষ ২টা হইতে ৫টা । জ্বরের প্রকৃতি । প্রাত্যহিক, ১।২ দিন অন্তর, সর্ববিধ, একঘণ্টা অগ্রগামী জ্বর ; বর্ষাকালের ও জলাস্থানের জ্বর; ম্যাগেরিয়া জ্বর; কুইনাইন, আর্সেনিক প্রভৃতি ঔষধ চাপা জ্বর ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—শীতের কতিপয় ঘটক। পূর্বে পিপাসা, শীত ও উষ্ণাবস্থার পিপাসা ; শীতাবস্থায় অঙ্গুলীর অনম্যতা ; সাধাবণতঃ পূর্নাক্ষ ৭টা বা ৯টার সময় জ্বরের উপস্থিতি ( পূর্নাক্ষ ১০টার সময় জ্বরে ভাট-মিউ ) । শীতাবস্থায় পৃষ্ঠে ও অঙ্গে তীব্র বেদনা, বোধহয় যেন অগ্নিশূলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । ঘর্ষের অল্পতা বা অভাব । শীতাবস্থায় অঙ্গুলীতে পিত্ত বমন । স্বল্পবিরাম জ্বর ।—শৈত্যিক লক্ষণগণ ও অস্থি-বেদনাবিশিষ্ট স্বল্পবিরাম জ্বর । মস্তকেব পশ্চাত্তানে বেদনা, জিহ্বায় গাঢ় পীতবর্ণ লেপ, জলপানান্তে বমন, বক্রদেশে পূর্ণত্ব ও বেদনা অসুভব, সঞ্চলনে বক্রতে হটী-বেধ, প্রস্রাবের অল্পতা ও গাঢ়তা ইউপেটোরিয়মের লক্ষণ ।

## ইউফরবিয়ম ।

সর্কাক্সে অবিরত শীত, শীতলহ ঘর্ম, সর্কদা বিবসিষা, হাত শীতল ; তাপের আভিপ্রায, উত্তাপাবস্থায় শবীর ও পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত ভারবোধ ; প্রাতে সর্কাক্সে ধাম, ও অল্প অল্প তৃষ্ণা, ঘর্ষে দুর্গন্ধ । আহায়ে, বিশেষতঃ বসাদ্রব্যে অরুচি । এই ঙ্গলি ইউফরবিয়ম জ্ঞাপক জ্বরের লক্ষণ ।

## ইয়েশিয়া ।

শো ক, দুঃখ, বিবছাদি জনিত জ্বর ; একপ্রকৃতির জ্বর পরিবর্তিত হইয়া অল্প প্রকৃতি ধারণ ; দ্ব্যাহিক জ্বরেব ত্র্যাহিক পরিণতি, জ্বরের সময়ের

পশ্চাৎদিক; ও কুইনাইন অপপ্রয়োজিত সবিরাম অর প্রভৃতিতে ইয়েশিয়া ব্যব-  
হৃত হয়। এই ঔষধ জাপক জরে সুস্পষ্ট বিরাম থাকে এবং বিরামকালে  
রোগী সহজ শরীরের দ্বারা কাজ কর্ষ করে। হানিমান বলেন যে শীতাবস্থায়  
পিপাসা ও তাপাবস্থায় পিপাসার অভাব থাকিলে ইয়েশিয়া বিশেষ ফলপ্রদ।  
এই ঔষধ প্রয়োগোপযোগী জবে বাহ্য উত্তাপে সহজে শীত নিবারিত হয় এবং  
দাহাবস্থায় পিপাসা থাকে না। ইয়েশিয়া দ্রাব্য-প্রধান ব্যক্তিদিগেব পক্ষে  
বিশেষ উপকারী।

বিশেষ লক্ষণ ।—একবার আচ্ছাদ, একবার বিবাদ; লক্ষণগুলির  
দীর্ঘ শীঘ্র বিপবীতভাবে পবিবর্তন; কেবলমাত্র শীতাবস্থায় পিপাসা; ওষ্ঠে ও  
মুখের কোণে “জর-চুঁটা”; বসিয়া থাকিলে শীতের উপশম; বাহ্য উত্তাপে  
আকাঙ্ক্ষা। হ্রাস-বৃদ্ধি ।—তামাক, কাফী, ও ব্রাণ্ডীপানে, স্পর্শে, সঞ্চালনে,  
তীব্র গন্ধে ও শোকাদি মনোবিকানে বৃদ্ধি। উত্তাপে, কথিয়া চাপিয়া ধরিলে,  
ও চিং হইয়া শয়নে হ্রাস। জ্বরের সময় ।—অপবাহে বা সন্ধ্যাকালে  
জ্বরের উপস্থিতি ও প্রায় সাবরাত্রি তাপের অবস্থিতি। জ্বরের প্রকৃতি ।—  
প্রাত্যহিক, দ্ব্যহিক, ত্র্যাহিক জ্ব, পশ্চাৎগতী জ্বর, সাপ্তাহিক জ্বর; কুই-  
নাইন আটকান জ্বর।

জ্বরের লক্ষণ ।—সবিরাম জ্বর ।—নীতের পূর্বে হাই  
তোলা ও আডামোডা ভাঙ্গা; বাহ্যদে শীতের আবৃত্ত; কম্প; বাহ্যিক উত্তাপে  
নীতের উপশম, কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা, জ্বকালীন সর্ষাঙ্গে শীতপিত্ত।  
মুখমণ্ডলের একপার্শ্বে জ্বলাকব উত্তাপ। অতি অল্প ঘর্ষ, অথবা কেবল  
মুখমণ্ডলে ঘর্ষ। আমাশয়-গহববে বেদনা ও শিবঃপীড়া। বাহিরে তাপ,  
অন্তরে উত্তাপ অনুভূত হয় না। সন্নিপাত জ্বর ।—সহসা উত্তাপাবেশ  
বিশিষ্ট জ্বর। মস্তকেব সম্মুখাংশে বেদনা, সেই বেদনাবশতঃ কৌণীর চক্ষু  
মেলিতে অপারগতা। আমাশয় হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত ঝাস রোধ অনুভব,  
ও কক্ষঃস্থলে চাপ। \* বিমর্ষতা ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ এবং তৎসহকারে  
আমাশয়ে শূন্যতা ও দুর্বলতা অনুভব। \* পদ, জজ্বা ও সময়ে সময়ে  
নিশ্বাসের অবশতা।

ইয়েশিয়া ও জেলসিমিয়মে প্রভেদ ।—(১) ইয়েশিয়ার জ্বরেব  
পূর্বে অঙ্গুর্দ ও জ্বরণ, শীত ও কম্পকালে অতিশয় পিপাসা, ঘর্ষ অল্প

প্রায়ই অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বা মুখমণ্ডলে; জিহ্বা পরিকার, লাল লবণাশ্মান; বিরাম-  
কাল হুস্পষ্ট; এবং এক প্রকৃতির জ্বরের অন্ত প্রকৃতিতে পরিণতি লক্ষণ  
থাকে। (২) জেলসিমিয়মে পূর্বলক্ষণ প্রায়ই থাকে না, শীত ও কম্পাবস্থায়  
পিপাসা জন্মে না, ঘর্ষ অধিক হয় ও ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায়; জিহ্বা খেত  
ও পীতমিশ্রিত ও লাল রক্তবর্ণ হয়, জ্বরের বিচ্ছেদ হয় না অথবা অতি অল্প  
বিচ্ছেদ হইয়া থাকে, সবিবাহ জ্বর অবিবাহে পরিবর্তিত হয়।

## ইথুসা ।

ক্ষুদ্র, দ্রুত, কঠিন, অপ্রাপ্যপ্রায় নাড়া, এবং নাড়ী ও হৃৎস্পন্দনের  
বৈষম্য লক্ষণে ইথুসাব প্রয়োগ হয়। শিশুদিগের দাঁত উত্তিবার সময় জ্বরে,  
অবসাদ, প্রলাপ ও তন্দ্রা লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ছুগ্পানাস্তে সংঘত  
জ্বরবমন ও তৎপবন্ধে অবসন্ন হইবা পড়া ও নিদ্রা বাওয়া, মাথা তুলিতে না  
পারা, ও আক্ষেপ এই সকলও ইথুসাব লক্ষণ।

## ইপিকাকুয়ানহা ।

সবিবাহ জ্বরে অধিক পরিমাণে কুইনাইন বা আর্সেনিক ব্যবহারেও অব  
সম্যকরূপে আবোগ্য না হইলে, আহাবেব অনিয়মে অর্থাৎ অতিরিক্ত না  
ওরু ভোজনে বোগী পুনঃ পুনঃ জ্বাক্রান্ত হইয়া পড়িলে ইপিকাক ব্যবহৃত  
হয়। জ্ববে শীত, উত্তাপ, ও বম্বাবস্থা বথানিয়মে পবপব উপস্থিত না হইলে;  
কিঞ্চা রোগ ভালরূপে বুঝা না গেলে প্রথমে ইপিকাক ব্যবস্থা কবা যাইতে  
পাবে। জ্বরকালীন নাসিকা বা অন্ত কোন দ্বার দিয়া রক্তপাতেও এই ঔষ-  
ধের প্রয়োগ হয়। জ্বরের সহিত হরিদ্রণ, ফেগিল অতিসারও ইপিকাক  
জ্ঞাপক। সাধারণতঃ আমাশায়ক উপদ্রব, ও জ্বরকালীন বিবাহা ও বমন  
লক্ষণে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ডাঃ জ্বাব অন্ত কোন বিশেষ ঔষধ  
জ্ঞাপক লক্ষণ বিদ্যমান না থাকিলে বিষমজ্বরে সর্বপ্রথমেই ইপিকাক ব্যব-  
হার করেন। তিনি বলেন যে অনেক সময় কেবল একজ্বাবাই জ্বব আরোগ্য  
হয়, সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও জ্ববেব এককাল পরিবর্তন জন্মে যে তৎপরে

আর্গিকা, আর্সেনিক, ইয়েশিয়া, নর-ভমিকা প্রভৃতি ঔষধ উপযোগী হইয়া উঠে। ডাঃ বার বলেন যে বহুভাগী বিষয় জ্বরে যদি ইপিকাকে প্রথম রোগী আরোগ্য লাভ করে তবে অন্যান্য রোগীও এই ঔষধে রোগ-মুক্ত হয়। জ্বরের সকল অবস্থায় বিবিম্বার বিদ্যমানতা ইপিকাকের বিশেষ আরোগ-লক্ষণ। কিন্তু প্রথমতঃ বিবিম্বা বর্তমান থাকিয়া, কুইনাইন সেবনে উহা বন্ধ হইয়া পুনরায় জ্বর প্রত্যাবৃত্ত হইলে বিবিম্বা না থাকিলেও ইপিকাকে উপকার দর্শে। বসন্ত, গ্রীষ্ম, ও বর্ষাকালের জ্বর এবং সঞ্চল স্থলের জ্বর ইপিকাক সমধিক উপযোগী।

বিশেষ লক্ষণ।—জ্বরের সকল অবস্থায়ই বিবিম্বা। আহারের অনিয়মে পুনঃ পুনঃ জ্বরের আক্রমণ। শীতাবস্থায় সর্কোপেকা অধিক হ্রস্ব-লতা। বাহ্যিক উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি; জলপানে শীতের হ্রাস। জ্বরের অনস্পর্শ বিচ্ছেদ। হ্রাস-বৃদ্ধি।—উষ্ণগৃহে, বাহ্যিক উত্তাপে, ও বর্ষাকালে বৃদ্ধি। জলপানে, অনাবৃত বায়ুতে ও ঘর্ষান্তে উপশম। জ্বরের সময়।—পূর্বাঙ্ক ৯।১০।১১টা; অপরাহ্ন ১২টা; শীতশূন্য অর অপরাহ্ন ৪টা। জ্বরের প্রকৃতি।—প্রাত্যহিক জ্বর, প্রত্যাহ ২।৩ বার জ্বর; ২।৩ দিন অন্তর বসন্ত ও বর্ষাকালীষ জ্বর; পঞ্চাদশমী জ্বর, কখন অগ্রগামী, কতিক এক-সময়ে আগত জ্বর।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরামজ্বর।—জ্বষ্ণ, অসমর্দ, ও মুখে ললাসকর সহকারে জ্বরের প্রকাশ। অধিক শীত, অল্প উত্তাপ, অথবা অধিক উত্তাপ, অল্পশীত। বাহ্যিক উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি, জলপানে শীতের হ্রাস। (বাহ্যিক উত্তাপে শীতের হ্রাস, ইথে)। শীতাবস্থায় পিপাসা হীনতা, কিন্তু উষ্ণাবস্থায় অতিশয় পিপাসা। শীতাবস্থায় অতিশয় দুর্বলতা। তাপাবস্থায় বিবিম্বা, বমন, ও শুষ্ক কাস। মুখমণ্ডলের পর্যায়ক্রমে শীতলতা ও রক্তহীনতা। অল্প ঘর্ষ, ঘর্ষে বস্ত্রে শীতবর্ণ দাগ লাগে। ঘোলা হ্রদ। ঘর্ষাবস্থায় সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি। বিবিম্বা ও বমনের আবল্য। বিরাম-কালে অস্বাভিক পাকাশয়িক উপসর্গ (এন্ট্রজুড. গলস)।

ইপিকাক ও আর্সেনিকে প্রভেদ।—আর্সেনিকের সহিত ইপি-কাকের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রভেদ এই যে

ইলিকাকের দৌর্জল্যের শীতাবস্থার ও আর্সেনিকের দৌর্জল্যের উতাপাবস্থার সর্বাপেক্ষা আধিক্য থাকে ।

## ইলাপ্স ।

অপরাক্ষ ৭টার সময় শীত, অনন্তর অতিশয় তাপ, পরিশেষে অন্ন অন্ন ঘর্ষ, সমস্ত রাত্রি শ্বাস-কষ্ট ও নিদ্রাবস্থার মৃতব্যক্তিদিগকে স্বপ্নে দেখা এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ । শিরোধূর্নন, সমুদ্রদিকে মস্তকের পতনোপক্রম, আহাৰ্ম্মাজে আমাশয়ের গোবব, কুকুরবৎ ঘন ঘন কুধা, অথচ আহায়ে আশক্তি আমাশয়ে ; ফল ও পানীয় দ্রব্যের বরফবৎ অবস্থান ইহার অন্ত্যস্ত লক্ষণ ।

## ইলেটেরিয়ম ।

সবিরাম অন্ন বন্ধ হইয়া গাত্রে শীতপিত্ত ( আমবাত ) বাহির হইলে, এবং চুলকাইলে চুলকানি নিবৃত্ত হইলে ইলেটেরিয়ম বিশেষ ফলপ্রসূ । জরের বিরামকালে প্রকাশিত শীতপিত্তেই এই ঔষধ উপযোজ্য । শীতাবস্থার পূর্বে ও শীতাবস্থার প্রকাশিত শীতপিত্তে হিপার ; তাপাবস্থার এপিস, ইগেশিয়া, ও রসটক্স ; ঘর্ষাবস্থার এপিস, ও রসটক্স ব্যবহৃত হয় । অরকালীন পিচকারীর ভ্রাস বেগে প্রভূত বমন ও বিরেচন নিঃসৃত হইলেও এই ঔষধে প্রথমে বমন-বিবেচন অবরুদ্ধ ও তৎপরে জ্বর দূরীকৃত হয় ।

## একোনাইটম ।

তৃষ্ণ, শীতল পশ্চিম দিকের বায়ু, দমকা বা সজল পূর্বদিকের বাতাস, হিমলাগা, জলে ভেজা, বক্ষঃস্থলে শীতল বাতাস লাগা, ঘর্ষাবরোধ, সহসা ভয় প্রাপ্তি, দাঁত উঠা, ও ক্রমি প্রভৃতি কারণে উৎপন্ন জরে একোনাইট ব্যবহৃত হয় । প্রাদাহিক জ্বর ও সর্দি জরেই ইহা বিশেষ উপকারী । জরে আত্যন্তরিক যন্ত্রের রক্তসঞ্চয় থাকিলে এতদ্বারা অতিশয় উপকার ঘর্ষে । নবজরেই একোনাইট ব্যবহৃত হয়, পুরাতন জরে প্রায়ই ইহার প্রয়োগ হয় না । তবে মৃত্যুভয়, উৎকর্ষা ও অস্থিরতা দি একোনাইটের

বিশেষ লক্ষণ বর্তমান থাকিলে অবশ্যই ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। পূর্ণরক্ত ব্যক্তিদিগের নবজ্বরে ও শীতাতপ প্রভৃতি বায়বীয় পরিবর্তনে জ্বরের পুনরুৎপত্তিতে একোনাইট উপকারী। কেহ কেহ জ্বর হ্রাস করিবার জন্ত জ্বরকালে একোনাইট ও জ্বর বন্ধ করিবার জন্ত বিবাম কালে অত্র ঔষধ ব্যবস্থা করেন। এরূপ করা স্মৃতিকিৎসা নহে। একোনাইট যে জ্বরের ঔষধ তাহা একোনাইটেই আরোগ্য হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বিপুল প্রাদাহিক জ্বরেই একোনাইট বিশেষ উপযোগী। কিন্তু প্রাদাহিক জ্ববে বিধান-ভঙ্গব বিনাশ আশঙ্ক্য হইলে একোনাইট ব্যবহার করা নিফল। এই ঔষধে ধামনিক উত্তেজনার শমতা জন্মে, কিন্তু প্রদাহ স্থান বিশেষে স্থায়ী হইয়া পড়িলে আর কোন উপকার দর্শে না। বক্তৃতা দৃষ্ট হইয়া যে সকল জ্বব জন্মে, যথা, টাইফস জ্বর, টাইফয়েড জ্বব ও ম্যাগেবিয়া জনিত সবিবাম জ্বব প্রভৃতিতেও একোনাইট ফলপ্রদ নহে। একোনাইট ব্যবহারের পূর্বে শবীর ঘর্ষাভিনিবৃত্ত হইলে আব ইহা ব্যবহার কবা আবশ্যক কবে না।

বিশেষ লক্ষণ ।—শীত অবস্থায় মুখমণ্ডলের উজ্জলতা ও উষ্ণতা বাসিলে মলিনতা; শিবোৎপন্ন ও মুচ্ছার উপক্রম; মধ্যে মধ্যে দৃষ্টিহীনতা ও জ্ঞানশূন্যতা; উত্তেজনা, মৃত্যু ভয় ও উদ্বেগ, এবং অস্থিরতা। হ্রাস-বৃদ্ধি ।—সন্ধ্যাকালে ও বাত্মিতে; উষ্ণগৃহে, ও উত্থান কালে বৃদ্ধি। দিবসে বাতাসে, স্থিতি থাকিলে, ও ঘর্ম্ম হইলে উপশম। জ্বরের সময় ।—প্রায়ই সন্ধ্যাকালে জ্বর, প্রাতে জ্বব হইলে জ্বন্তণ, অপরাহ্ন ২।৩ টার সময় জ্বর আসিলে শীত না হইয়া কেবল উত্তাপাবস্থার প্রকাশ। জ্বরের প্রকৃতি ।—নবজ্বব; দুইদিন অন্তর পুনরাতন সবিবাম জ্বর; পর্য্যায় জ্বরের একজ্ববে পরিণতি ও তৎসহ মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে রক্তসঞ্চয়।

জ্বরের লক্ষণ । সবিবাম জ্বর ।—হঠাৎ পুষ্টি যুবকদিগের তরুণ জ্বর। অতিশয় শীত ও উত্তাপ, মস্তক ও মুখমণ্ডলে বিশেষ উত্তাপ; জ্বরকালীন কাস। অত্যন্ত অস্থিরতা; উদ্বেগ, ও স্নায়বীয় উত্তেজনা। জ্বরের বর্ধিত অবস্থায় প্রবল তৃষ্ণা; শীতাবস্থায় নাড়ীর স্পন্দন স্বাভাবিক এবং উত্তাপাবস্থায় নাড়ীর পূর্ণতা, দ্রুততা, ও কঠিনতা। ঘর্ম্মপ্রাবে উপশম অস্থ

ভব । সন্নিপাতজ্বর ।—পূর্ণ ও উল্লসিত শীত নাক্তী বিশিষ্ট প্রাণাহিক জ্বর, অতিশয় উত্তাপ, ঘর্ম্মশূন্য দাহ ও প্রবল পিপাসা ; \* ভয়, ব্যাকুলতা ও স্নায়বীয় উত্তেজনা । \* শিরঃপীড়া, বোধ হয় যেন কপাল দিয়া মস্তিষ্ক চাপিয়া বাহির হইবে, উত্থান করিলে শিরোগ্রন্থন । (একোনাইট প্রধানতঃ সন্নিপাত জ্বরে প্রথম অবস্থায় প্রযুক্ত) ।

একোনাইট ও বেলেডোনা প্রভেদ ।—যে স্থলে একোনাইট ও বেলেডোনা নিশ্চিত প্রভেদ করিতে পারা যাব না সে স্থলে ঘর্ম্মভাবে একোনাইট ও ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে বেলেডোনা ব্যবহৃত ।

## এগেরিকস ।

শিথিল রক্তসঞ্চলন বিশিষ্ট বৃদ্ধদিগেব পক্ষেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী । শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে জ্বালা, কণ্ঠদগ্ধ ও আরক্ততা ; বরফ স্পৃষ্ট বা বরফেব সূচী বিদ্ধবৎ অসুভব ; স্তম্ভিৎ থাকিলে বদন ও চরণে ছিঁড়ে পড়ার ভ্রায় যাতনা, নড়িলে চড়িলে উহার শাস্তি ; নিম্নাঙ্গ ও উর্দ্ধাঙ্গের বিপরীত দিকে বথা বাম পদে ও দক্ষিণ হস্তে উপসর্গেব প্রকাশ এগেরিকস ব্যবহারেব লক্ষণ । সবিরামজ্বর ।—অতিশয় শীত, উষ্ণ হইতে নিম্নাভিমুখে শীতের গতি, নড়িলে চড়িলে বা গাত্রবস্ত্র খুলিলে শীতের বৃদ্ধি, হেলান দিয়া বসিলে পৃষ্ঠদিয়া জল গড়াইয়া নীচে পড়িতেছে এরূপ অসুভব । উত্তাপের অভাব বা কেবল উর্দ্ধাঙ্গে সুষ্যসামান্য উত্তাপ । নিম্নাঙ্গালীন, সারাবাত্রি, তৈলাক্ত ঘর্ম্ম ; প্রায়ই শরীরের সঙ্গুখভাগে ঘর্ম্মের প্রকাশ, রাগিতে পদদ্বয়ে ঘর্ম্ম ; ঘর্ম্মাবস্থায় মেরুদণ্ডেব দুর্বলতা, উপদাহ, ও স্পর্শ-দেহ । দুগ্ধপোষ্য শিশুেব অপরাধ চারিটার সময় জ্বর । বাহিরে শীত, অন্তরে তাপ ; সর্কাক্ষে, বিশেষতঃ মস্তকে শীতল ঘর্ম্ম ; তৃষ্ণা, শ্বাস হ্রস্বতা, উদব ও জাহ্নুর দুর্বলতা, উত্তাপবিস্তার বিবমিষা, গাত্র-গোরব জন্ত শয়ন করিতে বাধ্যতা । সন্নিপাতজ্বর ।—প্রমের উত্তর দিতে অপ্রবৃত্তি (ফস-এসি) ; মদ্যপানের স্পৃহা ; আত্মাণ শক্তির আতিশয়া (কলচি) ; জিহ্বা ও মুখগহ্বরেব পবিত্রতা ; অস্ত্র-কূজন ও গন্ধহীন বায়ুনিঃসরণ ; হৃৎ কম্প, মেরুদণ্ড ও হস্তপাদাদি কামড়ান ; নিতম্ব-পেশী



## এপিসি ।

দর্শনপবিশ্রুত পুরাতন জবে এপিসি বিশেষ উপযোগী । গাত্রের মধুমক্ষিকার হল-বেধের স্থায় যাতনা এপিসের একটি বিশেষ লক্ষণ । বসন্তকালের জরে এই লক্ষণটী বর্তমান থাকিলে এই ঔষধে বোগী নিশ্চয়ই রোগ-মুক্ত হইয়া থাকে । চর্ম-রোগ অবরুদ্ধ হইবার পক্ষে পর্যায় জব উপর হইলে ; অথবা দীর্ঘকালের জর কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধ সেবনে দূর্বীভূত না হইলে এপিস বা এপিস ও উচ্চক্রমের চায়না পর্যায়ক্রমে, ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে । ফোট-জবের পরবর্ত্তী তরুণ ও পুরাতন জবেও এপিস ফলপ্রদ । জরের তিন অবস্থারই সুস্পষ্ট বিদ্যমানতা ; বক্ষঃস্থলে বা জাম্বুতে শীতের আরম্ভ ; অগ্নির তাপে ও নড়িলে চড়িলে শীতের আবির্ভাব ; কেবল শীতাবস্থার পিপাসা ; এবং শীতান্তে নিদ্রা এই ঔষধের সাধারণ লক্ষণ । ডাঃ উল্ক বলেন যে সর্ক্স প্রকার সবিরাম জরেই এপিস অমোঘ । তিনি তিন হইতে দুইশত ক্রমে এপিস ব্যবহার করিয়া সকল প্রকার বিষম জরেই সুন্দর ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন । কিন্তু ডাঃ নিকেল ম্যাগেলিয়া অনিত বিষমজবে ইহার উপকারিতা স্বীকার করেন না । হিম-ভোগ বা রাত্রিকালে অনাবৃত স্থানে বাস বশতঃ জব জন্মিলে এপিস ফলপ্রদ । পিত্ত বা বায়ু প্রধান খাড়া ; স্ত্রী-লোক, বিশেষতঃ বিধবা ; এবং সাবধান থাকিলেও যে সকল বালক বালিকাদিগের হস্ত হইতে দ্রব্যাদি পড়িয়া যায় তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী ।

বিশেষ লক্ষণ ।—নৈবাস্ত ; চক্ষুর নিম্নে ক্ষীভতা ; স্পর্শ-বিষেধ ; হলবেধবৎ জ্বালাকর বেদনা ; থাকিয়া থাকিয়া সহসা বেদনার অতিশয় বৃদ্ধি, ও সহসা একস্থান হইতে স্থানান্তরে গতি ; নিদ্রিতাবস্থার বা জাগ্রত হইবার সময় হঠাৎ হৃৎস্বরে চিংকার করিয়া উঠা ; \* ভ্রমশূন্যতা ; শোথ ; উদরী ; মূত্র-বেগ ধাবণে অক্ষমতা ও মূত্রত্যাগান্তে জ্বালা ; বারম্বার আরম্ভ ও জ্বালাকর মূত্রত্যাগ ; পীড়াক্রান্তস্থলে মধুমক্ষিকার হল-বেধের স্থায় যজ্ঞা ; নিদ্রানুভূতি হ্রাস-বৃদ্ধি ।—সাধারণতঃ উষ্ণতায় বৃদ্ধি, শীতলতায় হ্রাস ; নিদ্রান্তে বৃদ্ধি ।

জ্বরের সময় ।—প্রাতঃকাল ; অপরাহ্ন দুইটা হইতে পাঁচটা, বিশেষতঃ তিনটা ; শীতশুষ্কতার অপরাহ্ন চারিটা । জ্বরের প্রকৃতি ।—প্রাত্যহিক, বৌকালিন, দ্ব্যাহিক, সপ্তাহে দুইবার, ঠিক নির্ধারিত সময়ে জ্বর, অগ্রগামী জ্বর ; রক্তসঞ্চয়িত জ্বর ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—অপরাহ্ন ৩টা বা ৪টার সময় জ্বর ; শীতাবস্থায় শিথিলতা ( ইমে, কার্কো-ভেজি, ক্যান্স ) ; উষ্ণ গৃহে ও অগ্নির উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি, ( বাহ্য উত্তাপ প্রদানে শীতের হ্রাস আস কোরাল, \* ইমে ।—বাহ্য উত্তাপে শীতের বৃদ্ধি ইপিক, এপিগ্ল ) । অন্নমাত্র নড়িলে চড়িলেই শীতের বৃদ্ধি । শীতাবস্থায় পদদ্বয় ও অঙ্গুলী ওলির অতিশয় শীতলতা ; হস্ত ও মুখমণ্ডলেব উত্তপ্ততা, এবং নিশ্বাস প্রবাহে অত্যন্ত কষ্ট, বোধহয় যেন শ্বাস কষ্ট হইয়া পড়িবে । শীতান্তে নিদ্রা । শীতাবস্থানে গাত্র শীতপিত্তেব ( আঘাত ) প্রকাশ ও উহাতে অতিশয় কণ্ডুয়ন । ( শীতাবস্থায় বা শীতের পূর্বে শীতপিত্তের প্রকাশ,—হিয়ার ; তাপও ঘর্ম্মাবস্থায় প্রকাশ, রসটক্স ; কেবল তাপাবস্থায় প্রকাশ,—ইমে ) । উত্তাপাবস্থায় প্রায়ই তৃষ্ণাপরিশূভতা ; নিশ্বাস প্রবাহে কষ্ট ও শ্বাস-রোধশূভব ; গৃহের উত্তাপে অসহ্যতা । ঘর্ম্মাবস্থায় তৃষ্ণাভাব ; পর্যায়ক্রমে গাত্রের ঘর্ম্মাক্ততা ও ককতা ( ছাট-কা ) । পুৰাতন জ্বরে ঘর্ম্মাভাব । বিরামকালে দ্রীহাপ্রদেশে বেদনা ; সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও সন্ধিহুলে অত্যন্ত বেদনা, পায়ের পাতার ক্ষীণতা ; প্রস্রাবের অন্নতা ; অস্থিরতা, নিদ্রাশূভতা ; হৃর্কলতা ; ও শীতপিত্তের বিদ্যমানতা । সন্নিপাত জ্বর ।—অচৈতন্য ও মূঢ় প্রলাপ ; নিদ্রাশূভতা ও থাকিয়া থাকিয়া চিৎকার করিয়া উঠা ; কথা বলিতে বা জিহ্বা বাহির করিতে অক্ষমতা, বিদারিত, ক্ষতসংস্কৃত ও ফোটারত জিহ্বা, ( নক্স, পলস ) ; গলাধঃকরণে কষ্ট, এবং মুখশোষ ও গল-শোষ । \* আমাশয়-গহ্বরে ও নিয়োধরে বেদনা ( ব্রাইও ) ; উদরেব ক্ষীণতা ও স্পর্শ-দেহ ( ল্যাক ) কোষ্ঠ-রোধ, অথবা বারংবার, প্রত্যেকবার শরীর সঞ্চালনে, হৃর্গন্ধি, রক্ত মিশ্রিত আমাশয় অনৈচ্ছিক মলপ্রাব ( ফস ) ; প্রস্রাব-রোধ ( হাইওস ) বন্ধহুল ও উদরের উপরে শুভ্রবর্ণ পীড়কা ; অত্যন্ত হৃর্কলতা ■ শয্যাপ্রাণে সরিয়া সরিয়া যাওয়া ( \* এসিড-মিউর ) ।

এপিস ও ব্রাইওনিয়াম প্রভেদ।—(১) এপিসের জ্বর সাধারণতঃ অপরাহ্ন ৩।৪টার সময় হইয়া থাকে, ব্রাইওনিয়াম জ্বর সকল সময়ই হয়। (২) এপিসে কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা থাকে, ব্রাইওনিয়াম শীত, তাপ, ঘর্ম তিন অবস্থায়ই পিপাসা থাকে। (৩) এপিসের শীত বুক, উদর, ও হাঁটুর সমুখ হইতে আরম্ভ হয়; ব্রাইওনিয়াম শীত হস্ত-পদের অঙ্গুলীর অগ্রভাগে ও ওঠে আরম্ভ হয়। (৪) এপিসে বক্ষঃস্থলে চাপ ও তজ্জন্ত শ্বাস-রোধ অনুভব থাকে; ব্রাইওনিয়াম কষ্টকর শুককাস সহকারে বক্ষঃস্থলে বেদনা থাকে। (৫) এপিসে হয় প্রায় ঘর্মীভাব নয় পর্যায়ক্রমে গাত্রের ঘর্মীকৃতা ও রুদ্ধতা থাকে, এবং ঘর্মাবস্থায় পিপাসা থাকে না; ব্রাইওনিয়াম ঘর্ম থাকে, সামান্য পরিমাণে ঘর্মের উদ্রেক হয় এবং ঘর্মাবস্থায়ও পিপাসা থাকে।

## এমোনিয়ম কার্বনিকম।

ত্রীলোকের রক্তশলাবস্থায় জবে একবার শীত একবার তাপ, কপালে হ্রিৎসং বেদনা, মস্তকের জড়তা, গণ্ডস্থলের কখনও আবদ্ধতা কখনওবা পাণ্ডুরতা, বিবমিষা, পিপাসা, আমাশয়ে চাপ, উল্কার, বক্ষঃস্থলে ভারবোধ ও উহার বামদিকে স্ফীতি-বেধ, এবং তৎসঙ্গে অত্যন্ত শর্দি ও হুনিদ্রার অভাব লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

জ্বরের লক্ষণ।—সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিকালে শীত; গৃহেব বাহিরে শীতের বৃষ্টি, অভ্যস্তবে হ্রাস; ঘুমাইলে শীত জাগিলে তাপ, রাত্রি ৯টা হইতে ১২টা পর্যন্ত পরপর শীত ও তাপ; রক্তের আবেগে রক্তবহানাদী ও মস্তক যেন বিদীর্ণ হইবে এরূপ অনুভব। পূর্বাঙ্কে সর্বাঙ্গে, বিশেষতঃ উদরে তাপ; সন্ধ্যাকালে পায়ের পাতার শীতলতা সহ মুখমণ্ডলের তাপ; তাপাবস্থায় শিরঃপীড়া। প্রাতে ঘর্ম; নিম্নাঙ্গের ঘর্ম; গাত্রের উত্তাপ সহকারে দিবসে বা রাত্রিতে ঘর্ম।

## এমোনিয়ম মিউরিরেটিকম ।

শ্বেদা-প্রধান, গণ্ডমালাগ্রস্ত স্কুলকার অলস ব্যক্তিদিগের পক্ষে এমন-মিউর বিশেষ উপযোগী। কুইনাইন সেবনে অবরুদ্ধ, অতি সপ্তম দিবসে সিক্কো-নার লক্ষণের স্থায় শীত, তাপ, ও প্রভূত ঘর্ষ সহকারে আবির্ভূত হইলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অর্দ্ধঘণ্টা পর পর পর্যায়ক্রমে শীতোত্তাপের প্রকাশ; স্কুইনে বিনির্গত, কঠিন, খণ্ড খণ্ড মল, মল সহকারে বায়ু নিঃসরণ; শীত, সহকারে বা শীতের পূর্বে পিপাসা, তৎপবে ঘর্ষ; রাত্রি, শয়নে মুখমণ্ডলে, এবং হস্ত ও পদতলে তাপ, ও তৎসহ তৃষ্ণা এমন মিউরের সাধারণ লক্ষণ। জ্বরের লক্ষণ।—সন্ধ্যাকালে শরীরের শীতলতা। পৃষ্ঠ দিরা উর্দ্ধদিকে শীতের গতি; অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর পর্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ; উত্তাপ সহকারে, বিশেষতঃ উষ্ণগৃহে ও শারীরিক পরিশ্রমে মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও ক্ষীণ-ভাব (ফুল ফুল দেখান); ঘন ঘন ঝলকে ঝলকে উত্তাপের উদ্বেক ও তৎপরে ঘর্ষ, করতলে ও পদতলে ঘর্ষের আধিক্য। উত্তাপান্তে দিবারাত্রি ঘর্ষ; দুইপ্রহর রাত্রির পব ও প্রত্যয়ে প্রচুর ঘর্ষ।

## এম্‌ব্রা গ্রিসিয়া ।

জ্বরের লক্ষণ।—আলস্য ও নিদ্রানুতা সহ পূর্বাঙ্কে শীত-হ্রতব; আহারান্তে তাহার শান্তি। মুখমণ্ডলের উষ্ণতা সহ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে শীতানুভব। হৃৎপিণ্ডের উৎকর্ষ সহকারে ঝলকে ঝলকে উত্তাপ অনুভব, সন্ধ্যাকালে উহার আতিশয্য। রাত্রিতে অধিক ঘর্ষ, দুইপ্রহর রাত্রির পর ঘর্ষের বৃদ্ধি, ব্যথিত পাখে উহার আধিক্য; কিন্তু শরীর উত্তপ্ত। হ্রাস-বৃদ্ধি।—উষ্ণ পানীয়ে, উষ্ণগৃহে, শয়নে, রাত্রিতে, অন্ননিদ্রার বৃদ্ধি। আহারান্তে, শীতলবায়ু সেবনে, শীতলজব্য পানাহারে হ্রাস। জ্বরের সময়।—পূর্বাঙ্ক ও রাত্রি; শীতশূন্য অর অপরাহ্ন ৭টা হইতে ৮টা। জ্বরের প্রকৃতি।—অনির্দিষ্ট পর্যায়শীল অর।

## এলষ্টোনিয়া ।

এলষ্টোনিয়া দুর্বলতা, মৃদুজ্ব, ও সচরাচর তৎসহকারে উদবাস্য জন্মায়, এবং তৎপরেও ইহা সেবন কবিলে কম্প, ও ঘর্ম্মাদি এবং বিবেচন, খন্নি ও শিরোধূর্ণন জন্মে । একত্র ম্যালেরিয়ায় লক্ষণ জবে ও অতিসারে চায়নার ভায় এই ঔষধও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । শীতের পূর্বে ও উত্তাপাবস্থায় পিপাসা থাকিলে এলষ্টোনিয়া, এবং শীতেব পূর্বে ও ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা লক্ষণে চায়না ব্যবহৃত হয় । অপব, এলষ্টোনিয়ায় চায়না জ্ঞাপক উপদাহিতা বিদ্যমান থাকে না । কুইনাইন সেবনে আবদ্ধ পুণাতন জবে, সবিবাম জব সহকারে উদবাস্য থাকিলে ; অথবা একদিন জব ও তৎপবদিন ঠিক সেই সময় জর না হইয়া আম-রক্ত বিরেচিত হইলে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য । সম্পূর্ণ লক্ষণাহুয়ারী না হইলেও পুণাতন জরে এই ঔষধ ব্যবহার কবিলে রোগ রূপান্তরিত ও পরি-বর্তিত হয় । সন্নিপাত জবের আরোগ্যোন্মুখ অবস্থায়ও অতিশয় অবসন্নতা, দুর্বলতা, মৃদুজ্বর, ও অতিসাবাদি লক্ষণে এলষ্টোনিয়াব ব্যবহার আঃছ ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—পূর্নাক্ষ নয়টা হইতে ১১টার মধ্যে শীত, শীতের পূর্বে, এবং শীত ও তাপে পিপাসা । তাপাবস্থায় শিবঃপীড়া, পিঠ কামড়ান, অতিশয় জলপিপাসা ; কখন কখন জল আমাশয়ে উপস্থিত হইবা-মাত্র বমন হইয়া পড়ে ( আর্স, অ্যট্রিম, ফস ) ; ঘর্ম্মাবস্থা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় না ।

## এলুমিনা ।

এলুমিনা জরে অধিক ব্যবহৃত হয়না, তবে পুণাতন জরে ও ষাণ্ডুদোষ সংশোধনার্থে ইহা কখন কখন প্রয়োজিত হইয়া থাকে । ব্রাইওনিয়া ব্যব-হারে রোগের সমস্ত লক্ষণ দূরীভূত না হইলে তৎপরে এলুমিনা ব্যবহার করিলে অবশিষ্ট লক্ষণ অন্তর্হিত হয় । দ্যাহিক জরে শীত ও কম্পের পৃষ্ঠে ও পায়ের পাতার আরম্ভ, মুখমণ্ডল উষ্ণ ; পর্য্যায়ক্রমে শীত ও তাপ অথবা শীতান্তে তাঁপ ও মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম ; বোগী সমস্ত ও হতাশচিত্ত ; বিরামকালে

শূন্যোদ্গার, অবসন্নতা, ও শয়ন-প্রবৃত্তি;—এই সকল লক্ষণে এলুমিনার প্রয়োগ হয়।" সরলাস্থের নিশ্চেষ্টতা, এমনকি নরম মলও অতিশয় বেগ না দিলে বাহির না হওয়া; অধিক মল সঞ্চিত না হইলে মলতাগের প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য না জন্মা; এই ঔষধের একটা প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ।

## এসাফিটিড।

প্লেগ্মা-প্রধান গণ্ডমালা-দাতু, শিশুদিগের জ্বরে; উপদংশ বা পারদ-দোষ জন্ম জবে; প্লীহা-যকৃতে রক্ত-সঞ্চয় জনিত জবে; এবং প্রচুর জ্বরে, অর্থাৎ জ্বরের সময় জ্বর প্রকাশিত না হইয়া আমরকমর ভেদ হইলে এসাফিটিড বাবস্থত হয়। পৃষ্ঠে ও কটিতে শীতের আরম্ভ; মস্তকে অসহ্য বেধনবৎ যাতনা, মুখে অধিক ছেপ উঠা ও উদগারে রস্মুনেব গন্ধ; তাপাবস্থায় মুখ-মণ্ডলে উত্তাপ, হাত পায়ের পাতা শীতল, এবং অনিদ্রা ও উষেগ; ঘর্ষাবস্থায় একেবারেই অভাব, অথবা কখন কখন কপালে ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শীতল; ঘর্ষের প্রকাশ এই ঔষধেব ব্যবহার-লক্ষণ।

## এসেরম।

**জ্বরের লক্ষণ।**—সমস্তদিন তাপ। অপরাহ্নে শীত, প্লাজ আবৃত কবিলেও শীত হ্রাস পড়েনা, অন্তরে শীত, বাহ্যিক তাপ, এবং তৃষ্ণা; অল্প-গন্ধ প্রচুর ঘর্ম্ম; অবসাদ ও সর্বশরীর ঘূষ্টবৎ অনুভব।

## ওপিয়ম।

ওপিয়ম বালক ও বৃদ্ধদিগেব পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জ্বরের সকল অবস্থায়ই নিদ্রালুতা; শ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ; মুখমণ্ডলের ক্ষীণতা ও শুষ্কতা আরক্ততা; হস্তপদাদির কম্প; ও কোষ্ঠবদ্ধ এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। যথাবিহিত ঔষধ ব্যবহার করিলেও যদি জ্বরের জ্বলন্ত প্রকৃতি

প্রকাশিত না হয় তাহাইলেও ওপিয়ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তরুণ জন্মে  
নিদ্রার পরে প্রলাপ, মধ্যে মধ্যে বিবমিষা ও অরাস্তে অবসন্নতা লক্ষণে  
ওপিয়ম ব্যবহৃত করা যায়। অহিকেশের বিষ-ক্রিয়ায় সংজ্ঞালুপ্তপ্রায় নিদ্রা  
মুখ্যবাদান পূর্বক নাসারব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেব উৎক্ষেপ, ঘর্ম্মাক্ত শরীরে জ্বালাকর  
উত্তাপ, ও গাত্রতাপের দুই তিন ডিগ্রী বৃদ্ধি ;—এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত  
হয়, এজন্ত হানিমান পূর্বোক্ত লক্ষণাপন্ন বিবিধ তরুণ জবে ওপিয়ম অমোষ  
মনে করেন। কুইনাইন সেবনে অবরুদ্ধ জবে শেষ বাত্মিতে শীত, পিপাসা,  
রাত্রি-বেদনা, ও নিদ্রা, উত্তাপানন্তায় শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডলের পাণ্ডুরতা,  
কমিনীকার সংকোচ, পিত্তবমন ; রক্তবর্ণ মূত্র ; তাপেব অনেক ক্ষণ পরে উষ্ণ  
ঘর্ম্ম ( প্রায়ই পদে ) ঘর্ম্মে গাত্র ভাসিয়া যাওয়া ও নাক ডাকাইয়া নিদ্রা ;—  
এই সকল লক্ষণে এই ঔষধ প্রয়োজিত হয়। অহিকেশেব অর ঠিক নিয়মিত  
সময়ে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু উহাব তিন অবস্থা সমান থাকে না। অতিরিক্ত  
রক্তাধিক্য বশতঃ মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের আশঙ্কায় অর্থাৎ তন্দ্রালুতা, ইন্দ্রিয়ের  
হ্রাস, ও সশঙ্ক শ্বাস লক্ষণে সন্নিপাত জবে উহাব ব্যবহার হয়।

**বিশেষ লক্ষণ ।**—অতিশয় নিদ্রালুতা ; শয্যা অতিশয় উত্তপ্ত অনুভব,  
ঘর্ম্ম হইবার সময় মন্দাবস্থা প্রাপ্তি, নিদ্রাকালে ও নিদ্রান্তে বৃদ্ধি। হ্রাস-  
বৃদ্ধি —উত্তাপে, শ্বিৎ থাকিলে, ঘর্ম্ম, নিদ্রায়, সুরাপানে, বাত্মিতে ও প্রাতঃ-  
কালে বৃদ্ধি। শীতলতায়, নড়াচড়ায়, দিনাতাগে, ও সাযাক্সে উপশম।  
জ্বরের সময় ।—পূর্বাঙ্ক ১১টা, অপরাহ্ন, সায়াক্স, রাত্রি, কখনওবা রাত্রি,  
১২ টার পর। জ্বরের প্রকৃতি ।—প্রাত্যহিক, ও দ্ব্যাহিক।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরামজ্বর ।—শীত ও উত্তাপানন্তায়  
সঙ্গী-রব সহকারে তন্দ্রা বা প্রগ'চ নিদ্রা ।\* বিকসিত মুখ ও নিশ্বাসের ঘড় ঘড়  
শব্দ । মুখমণ্ডলের মলিন আবৃত্ততা ও ক্ষীণতা সহকারে মস্তকে রক্তসঞ্চয় ।  
সন্নিপাত জ্বর ।—মুখমণ্ডলের ক্ষীণতা ও ঈষৎ বেজবর্ণী রং ।\* অত্যন্ত  
তন্দ্রাদোষ ও অচেতনতায় নিদ্রা সহকারে সশঙ্ক নিশ্বাস প্রবাস। অক্টোম্বীলিত  
চক্ষু ও প্রলাপ বাক্য, (নিমৌলিত চক্ষু ও প্রলাপ বাক্য, হাইওস)। নাড়ী পূর্ব  
ও আয়াদিতগতি, অথবা মন্দগতি ও ক্ষীণ। মস্তিষ্কেব ক্রিয়ার বিলোপেক্স  
আশঙ্ক। অজ্ঞাতসারে মলজাব, এবং মূত্রান্ত (বেল, হাইওস)।

## ককিউলস ।

অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট স্নায়বীয় জীব হানিমান এই উষ্ম ব্যবহার করিতে বিদ্যে দেন । হাটম্যান বলেন যে বাব-বাব ক্রোধানৈশ বশতঃ উৎপন্ন অথবা ক্রোধানৈশৈকৈব অতিশয় প্রাবল্য সম্পূর্ণ জবে ককিউলস বিশেষ উপযোগী । শুষ্ক বায়ুগুণাদিগণের জলেও উহা বাবলত হয় ; অবকাণীন মর্কাসে অক্ষেপ বা আমাশবে খরী ( খাদ্যদ্রব্য ) ইত্যাদি লক্ষণ । ককিউলসের লক্ষণ জাহানে বা ধমপানে, আলাপনে, শবটামোচনে, ও শীতল বাতাসে বিবর্তিত, এবং বাত্মিবাগে, ও ঘামাস্তে উপশান্ত হয় । হ্রাসোক্তি ও বর্গকদিগের বোগেই ককিউলস বিশেষ উপযোগী । অক্ষেপ, শ্রুতাবল্য পেটকামচনি, অম্মে অবচি; কোটবদ্ধ, বাসুক বাস ( কি শীতল কি উষ্ণ ) সন্ধ্যা কর্তব্য না পাবা, ও পানোচনে বোম বক্ষসেব দানি এত প্রবণেব বিশেষ লক্ষণ ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—মণিবান জ্বর ।—একবার শীত একবার তাপ । অনায়ে ও সাবাস্তে আভ্যন্তরিক শীত, তৎসহ বসন্তক্ষে, প্রধানতঃ পৃষ্ঠে ও চক্ষায় বস্ম, উদ্যোগ প্রনোণে দেহে স্বস্তব অকুণ্ঠশম, ( উদ্যোগে উপশম, ইন্দ্রে ) । উত্তপ্ত পান, অথচ অবদগ শীতান্ত্রভব, উত্তপ্ত পান্য ও শীতল পদ লক্ষ্যাবে উত্তাপাবল্য অথবা পান্যক বলাই তাহা । অক্ষেপিক ও স্নায়বিক উপশম অথবা খনা, শিরোক্ষণ, শিরোপৌড়া, অকুণ্ঠা বিনামষা, নৈবাশ্ত, ও সর্বাঙ্গীন হ্রসবতা । মণিপাত্ত্রব ।—স্বাস্থ্য ও শেব অবসন্নতা । আগন্তু, সামান্ত্রাশ্রম পসিগ্রাহি, স্ববালীনতা, অতিশয় নিদ্রাস্ততা, বৃদ্ধিবাব শক্তির লানতা, যথাযোগ্য শল্যপাশ্রমে অবসন্নতা । যে সকল ঘটনা ঘটে তাহা স্বলক্ষ কবিয়া প্রাথমে অবসন্নতা ও মৃদু পান্য শিরোক্ষণ, শবাব উষ্ণতা বস্মিগে বিনামষা ( লাইট ), মৃদু স্নাতক ( জাবা ) অস্বাদ, বাণে জলস্রোতেব জাষ শব্দ, উদ্যোগ স্বস্ততা ও আটোপ, মচ্ছাপ্রবণতা, জলপানকালে শব্দ কবিয়া জলেন অবতবণ, গ্রাহ্য পেশাব চক্ষুতা, জাগ্রত তন্ত্রা :

## কফিয়া ক্রুড়া ।

মৃদুস্নেহে অধিবিক্ত স্নায়বীয় উত্তেজনা প্রাক্রিণে ও বৈদ্যন্য অসহ্য হইলে;



যন যন একবার শীত একবার উত্তাপ, বোমাঝ, পেট-বেদনা, অস্থিরতা, উত্তাপাবস্থায় অতিশয় মানসিক উত্তেজনা - এবং ঘণ্টাব্যবস্থায় তৃষ্ণা ও তৈদ্র্য, এক অঙ্গের উষ্ণতা অঙ্গান্তের শীতলতা, শিবঃপীড়া, শিবোদ্দীর্ণন, ক্ষণিক ও চক্ষুর গুরুত্ব, উদয়-বেদনা, উত্তপ্ত নিশ্বাস, এটা ওটা চাওয়া, বাচালতা ও প্রলাপ লক্ষণে প্রসারিতক অবস্থায় বাবদ্ধত হয়। ত্রাহিক অবস্থায় অতিশয় অস্থিরতা, প্রায় সার্ববাদি আনন্দ ও প্রাণে ওগাণ কবা লক্ষণেও এই ঔষধ উপযোগী। ইহা সেবনে প্রথমে স্নানাদি ও পরিশেষে আবোধ্যা হয়।

## কর্ণস ফ্লোরিডা ।

ম্যানোবিষাধনিত জঃসাধ্য সাবধান করে অবাক্রমণে বয়েকদিন পরে হইতে নিদ্রানুত, শিবঃপীড়া, বিবনিষা, বমন, কৃপাহীনতা, ঠৈশ্বিক, বা জঃ-ময় উদয়ময় প্রভৃতি পূর্বলক্ষণ অবস্থায় শীতাবস্থায় শীতের প্রাণনা এবং তৎসহ গাত্রের শীতলতা ও আঠা আঠা বস্ম, বিবনিষা, বমন ও প্রচুর উদয়-বেদনা, তাপাবস্থায় তৃষ্ণা, দাদপকব প্রায় শিবঃপীড়া, গাত্র ঝকক উষ্ণতা ও আদ্রতা, তন্ত্রা; মস্তিষ্কে পৃথতা, নাড়ীর দ্রুততা ও কঠিনতা, ঘণ্টাবস্থায় প্রায়ই অবিদ্যমানতা, যখন তহিলে অতিশয় চক্ষুদকব বস্ম, বিবনিষা, বমন, লতা, কৃপামান্দা, ও বেদনাবিশিষ্ট জনবৎ বা ঠৈশ্বিক উদয়ময়, — এই সকল লক্ষণে কর্ণস ফ্লোরিডা ব্যবহৃত হয়।

## কলচিকম ।

বন্যাক্রমের বক্তৃতিমাণে ও সংক্রামক অবস্থায় বিশেষতঃ আহাৰ্য্য-দ্রব্যের দশনে বা আঘাতে অতিশয় বিবক্তি লক্ষণে কলচিকম ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হলি কেবল এই আহাবে অকচি লক্ষণান্তরবে কলচিকম ব্যবহার করিয়া একজন সপিরাম অবস্থায় বোগী আঃরাগ্য করিয়াছিলেন। ডাঃ ডনহাম বলেন যে কর্ণাচিকমের জ্বরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভ্যন্তর দিয়া বা পৃষ্ঠে নিম্নদেশে শীতলতা, এবং কখন কখন বিশেষতঃ ব্রাহ্মতে ঘণ্টাবস্থায়

উদ্ভাপ জন্ম প্রভূত অব দশ্য হয় ! কিন্তু সাধারণতঃ লক্ষণগুলির তত তীব্রতা  
বা আবির্ভাব থাকে না ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরামজ্বর ।—সর্বশরীরে কম্প, গঠে  
শীতের কারন্ত ও নিশাভিমুখে গাঁত, গাত্র শীতল । সাবানদ্বি উদ্ভাপ ও চূর্ণি-  
বাব পিপাসা, অন্ত্রবে হস্তপাদ অধিক উদ্ভাপ, অথবা হাত পা শীতল ও  
প্রবণ রুদ্ধকম্প । ঘনানন্দাব একেবারে অভাব, কিন্তু বাতগ্রস্ত বোগীর  
প্রচুর অন্ন-গন্ধ দশ্য । বিচ্ছেদাবস্থা স্মৃষ্টি নহে ও তখন উদবেব উপসর্গের  
বিদ্যমানতা এই ঔদবেব বাবতাব লক্ষণ । ইহা লক্ষণ বাবিত্তে, বিশেষতঃ  
সামান্যে, এবং উদ্বিগ্ন ও মানসিক গাণ্ডগমে বদ্ধিত ও স্তম্ভিত থাকিলে উপ-  
শমিত হয় । **মলিপাতজ্বর ।**—অতিশয় সাবণী অসাদ ; এমাণ্ডিক  
চর্ম্মলতাব জ্বাব দোর্দণ্ড, বেশীকৈ তুণিয়া দমাইবে মস্তক পশ্চাদিকৈ  
গতিত, ও নূন অতিশয় বিকসিত হইবা পড়ে, মধ্যমা গতিজন, ও তক্ষু  
কথা বমিতে বা হাঁটিতে অগতি, মূতবৎ মূগাকৃতি ও অত্যন্ত অবসন্নতা ;  
শীর্ণ-চৰ্ম্মটি, ঐটেবা গড়িয়া থাকে, তল-দোষ, অধিকসিত চক্ষু ; উত্তপ্ত-  
দেহ ও শীতলা হস্তপাদ, অথবা ঘনাদ্র গাত্র, শীতল বর্ষ্মাক্ত কণাল ;  
ক্ষুদ্র, ঘাত, স্তম্ভবৎ, বা অগাধ নাড়ী ; অটোত্তর, শব্দা বহু শূন, প্রমাণিত  
কনৌনিক । ও উতাব আঘোব জ্বানেব অগামতা, শিবঃপীড়া সংযুক্ত  
প্রলাপ, বুদ্ধিত অপবিচ্ছন্নতা, অথচ জিজ্ঞাসিত কণাব প্রকৃত উত্তব প্রদান ;  
অথো না জিজ্ঞাসা করিলে নিজেব জ্ঞান বিপন্ন অবস্থা সম্বন্ধ  
জ্ঞানশূন্যতা ; নিমগ্ন, কেটিব-গত, একদৃষ্টি বিশিষ্ট চক্ষু, নিমগ্ন ও  
মূতবৎ মূগাকৃতি ; শুষ্ক ও মৃণবৎ নাসা বন্ধ, গাত্রকপিণ গোপাবৃত ওষ্ঠ,  
দন্ত, ও জিহ্বা, দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ, শুষ্ক, শুষ্ক, ও অগাধ জিহ্বা, তুণিবাব  
পিপাসা, \* আত্মান, ও উদবোধদেবে প্রচায়েব অপ্রত্যাখিকা, শবীরেব  
অজ্ঞাত হান হইতে উদবেব আনক উত্তপ্ততা, অজ্ঞাত্যারে ও বেদনা সহ-  
কাবে চূর্ণকম্প, তবল, শাবা শাদা মল সংযুক্ত মণানিসেবণ, বতসংখ্যক ওবল,  
মলিন, চূর্ণকম্প, তীব্র বেদনা সংযুক্ত মল, মলনাশ বা অনিচ্ছা প্রভৃ  
মূত্রাব অমিশ্রিত বা সর্ববাস শাস ।

କଳେ । ସିଂହ ।

বিবক্তি বা শোক জনিত স্নেহ, বিশেষতঃ পৈত্রিক উপসর্গের আনন্দ থাকিলে কলোমিত্ত ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সর্গশরীরে শীতালুভ, লতিবঙ্গে দম্ব পবিশ্রুত উদ্ভাপ, ও মৃদু-গান নৈশবায় ইহাৰ প্রদান প্রমোদ-লক্ষণ। অপব, স্মৃতিকাজ্ঞেও প্রসবাত্তিক স্নেহের অববোধ, প্রাণাপ, তন্না, প্রবল উদব বেদনা, ও তত্বেতা দিউসবৎ অবশ্যই হইয়া থাকি; এবং মন-দেগ অণ্ড নানমাত্রি নানান,সবণ লক্ষণে এই লক্ষ উপকারী। কলোমিত্তেব লক্ষণ দ্বাযাজে, বিশ্রামে, সঞ্চালনে পানিহাৰেব স্নেহ ও দোদেব উদ্বেকে পিসিক্তিত এবং বায়ুনিদেবণে, কটিক সেবনে মনপানে, অবশ্যই হইয়া থাকিলে, ও কটিক চাপ প্রদানে উপশান্ত হইবে।

କଟିକର ।

পূবাতন অধে বা বাহু বিচার সা কানন বটিকন ব্যবসত হয়। শ্রেণীদি  
বেদনাদি অত্ৰ কোন পাঠ্য পাঠ্যকৰ্ম এবং কবিতা-এবং অবেল বিগাদ সময়ে  
ভাষা বিবদ্ধিত উত্তরে এত এবং বাবাহয়। টোপে ও স্বাধীনতা অপেক্ষা  
শীতাবস্থার প্রাচীন অসম শীতের পথে উভাপারে প্রকাশিত না হইয়া যায়।  
বস্ত্র প্রকাশ এবং বর্ণদিকে শীত উত্তর। শিশু প্রকাশ বক্ষণ। অবস্থ-  
কাথে পাশ-দেশের মাশুল। এবং স্বাধীনতা অস্তবে শীত, শীতের পদ  
বস্তু, পরিবেশে পাশ বক্ষণ, ও বটিকন উত্তরে। দৃষ্টবস্ত্র বক্ষণ শীত  
লাভানে ও স্বাধীনতা বটিকন এবং স্বাধীন উত্তরে ও টোপাতমে উপস্থিত হয়।

কালনাথুর।

[illegible]

## কার্বো ভেজিটেবিলিস ।

মৃণমণ্ডল, হৃত ও ওঠেব শীতলতা, জরব বিবান কালে অতিবিক্ত ফুবা; কোষ্ঠবদ্ধ, ও কঠিন, শুষ্ক, শুটলে শুটলে মল নিঃসরণ;—এই সমস্ত লক্ষণে সবিসম জবে কাঞ্চালাগুণা বাবজত হয়। বসন্তকালব জবেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী (ছেলস, ব্যাক, মলক)।

## কার্বোএনিমালিস ।

অল্প কোন পোচোব পদ বা তৎসদকাবে জব শুটল কখন কখন এই ঔষধ বাবজত হইয়া থাকে। শীত ও উত্তাপাবস্থা অপেক্ষা ঘম্মাবস্থাব অতিশয়, প্রাবলা ও অবসন্নকবতা লক্ষণ ইহা ব্যবস্থায়। অগ্নিবাক্ত ও আত্মবাক্তে শীত, সাবাহে শীতাত্তে ঘম্ম, প্রাতঃকালব পাকালে ও বসন্তামাঞ্জে পবিশেষে ঘাম্মব উদ্বেক, বানিকাল ছন্দাকাবাক, ভগ্নকম্ব ও বস্ত্রে চিহ্নকন ঘম্ম কাপো। এনিমালিসেব লক্ষণ।

## কার্বো ভেজিটেবিলিস ।

পূবাতন বা 'সোবা'-দেবতা জব, অথবা অধিক পিণামাণে কুতনান, কি 'আসেনিক সেবনে' অবকক জবে কানো ভেজিটেবিলিস মলপ্রদ। ঘোহকাব, পাটক প্রভৃতি অগ্নিসমীদিগেব বোণে এবা পাবদ, দাবণ, লবণাক্ত বা গচা মংস্ত মাংস; ও বদা সেবন জনিত বোগেও কানো বিশেষ উপযোগী। ডাঃ গবেল্লি বলেন যে শীতাবস্থাব অধিক পিণাসা, উত্তাপস্তাব পিণাসাব অভাব বা স্বল্পতা, এবা অবিবত বাব সেবনেব ইচ্ছা বিবন জবে এই ঔষধেব প্রবান প্রযোগ-লক্ষণ। ডাঃ বিবিয়ান-ফাল বলেন যে টাইফয়েড জরেব অপ্রবন্ধিত অবস্থায়ই কখন কখন মদ্যপানাদি গব দিবা বাত্রি যাত্র-কণ্ডূয়েব অতিবোগ, অম্বে জ্বাণা ও তত্তত্ত পাখা কবিত ও জ্ঞানাল। পুণিসা দিতে বদা, এই সকল লক্ষণ সহকাবে কানো ভেজিটেবিলিস আপক পতনাবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে।

বিশেষ লক্ষণ।—শিবাব বোগেব প্রাবলা, দীর্ঘদীর্ঘকাল গাঁবতা; অবিলত বাব সেবনেব ইচ্ছা; পিণাকাক্রমাব ক্ষণতা, আমাশয় ও জন্তে

বায়ুসঞ্চয়; পানীহাবাস্তে পাকস্থলী যেন ফাটিয়া বাইবে এপ্ৰকাৰ অনুভব : উদগারে অধিক উপশম, কৈশিকপ্ৰবক্ত-সঞ্চয়নের হাস বশতঃ অনেক বক্ত-শূন্যতা, নীলাকৃত্য। এবং হস্তপদাদিব শীতলতা; শবাব শুইৰ থাকিলেও হাঁটু, বাম বাহু ■ পদেব অতিশয় শীতলতা। ছাস-বুদ্ধি ।—প্ৰাতে, গ্ৰীষ্ম কালের ওচণ্ড উত্তাপে, উত্তাপেব আকস্মিক পৰিৱৰ্তনে, বসাত্ৰব্য ভোজনে, ও অধিক কুঠনাইন সেবনে বুদ্ধি, এবং ছাত-পাখাব বাতাসে, শীতল বায়ুতে, উদগারে ও সাযাফ্ৰে উপশম। জ্বরের সময় ।—প্ৰায়েই সাযাফ্ৰে, বাক্ৰি ১০টা। ১১টাব সময়, কখন কখন প্ৰাতঃকালে জ্বৰ। জ্বরের প্ৰকৃতি ।—প্ৰাতঃহিক জ্বৰ, ১।২দিন অন্তৰ জ্বৰ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বৰ ।—জ্বৰাক্রমণেব পক্ষে বা জ্বৰকালীন পায়ের শীতলতা, দন্ত-বেদনা ও গাত্ৰ-বেদনা। কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা (ইচ্ছা)। , একপাৰ্শ্বিক শীত; বামবাহ ও পা হঠতে শীতের আগ্ৰস্ত (দক্ষিণ বাহু হঠতে, নাক)। শবাব ও নিশ্বাসেব অতিশয় শীতলতা। আগ্ৰসাহিক শীত প্ৰায়েই বামদিক প্ৰকাশিত (বহু, দক্ষিণদিকে, প্ৰায়ে)। হাঁটু; বামবাহ ও পদেব অত্যন্ত শীতলতা, হস্তপদেব শীতলতা; নখেব নীলবণ। কখন কখন জ্বৰেব অনিৰামিত আক্ৰমণ অথবা প্ৰথমে ঘৰ্ম তৎপরে শীতের প্ৰকাশ। উত্তাপবহান তৃষ্ণাব বিদ্যমানতা। উদ্বেগ ও জ্বালাকৰ উত্তাপ অনুভব, শিবঃপীড়া, শিবঃবণন, বিবৰিষা, মুখমণ্ডলেব উজ্জলতা, দাহনহাল পদেব শিবঃপীড়াব বিদ্যমানতা। উত্তাপবহান বহুভাষিতা (লাক, শীত ও উত্তাপাবহান বাচালতা, প্ৰায়ে)। মস্তক পায়ু সেবনেব ইচ্ছা, নিশ্বাস প্ৰস্থাসে কষ্ট। প্ৰকৃত জ্বৰ ঘৰ্ম, আহাব বাণেও ঘৰ্ম; প্ৰায়েই শবাবেব উদ্ধাৰণ ঘৰ্ম, মহাঘৰ্ম ঘৰ্মজাব ও শীতাত্তব। প্ৰাচীন ক্ষীণতা ও বেদনা, স্বাসে দুগন্ধ। বিবামকালে তৰ্পণতা, বিনৰ্বতা, ও স্মৃতি ক্ষীণতা। + আতাব বা পান বাণে উদৰ যেন বিদীৰ্ণ হইবে একপ অন্তৰব। উদবে বায়ুসঞ্চয়। সন্নিপাতজ্বৰ ।—স্বপ্নমণ্ডল পাণ্ডুৰণ অস্থঃপ্ৰবিষ্ট, ও শীতল (হাস, কণস)। চক্ষ অস্থঃপ্ৰায়ে, প্ৰেতাশয়, ও জ্যোতিঃজ্ঞানহীন। জিহ্বা শুষ্ক, মণিন, ও বস্পনশীল, অথবা সময়ে সময়ে আদ ও অশোণ। তন্দ্রা পোষ বা অনিদ্ৰা ও তত বনাগ। + জীৱনী বিবাব সম্পূৰ্ণ শুষ্কতা,

ঈষৎ কপিশ, ঈষৎ ধূসর, বা রক্তময় অতি তুর্গাক্তি, অনৈচ্ছিক, তর্কালকর আত্মসাব (আর্স) । \* অতিশয় অবসন্নতা, অভ্যন্তরে জ্বালা, তচ্ছত্র বাতাস প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা । নাসিকা হইতে বাবংবাব বক্তপাত । হস্তপদ শীতল ও শীতল ঘর্ষাল, নিশ্বাস শীতল । নাড়ী সূত্রবৎ ও প্রায় অপ্রাপ্য । আশ্বান ; পুনঃ পুনঃ প্রবল উদগাধ । বক্ষঃস্থলে ঘেয়াব ঘড়ঘড় শব্দ ; আঠা আঠা শোয়া নিঃসরণ । শারীরিক নিঃস্রবেব তুর্গাক্তি । সুখমণ্ডল, ওষ্ঠ, ও জিহ্বাব নীলবর্ণ সহ কুসকুসের পক্ষাঘাত । স্তম্ভি, উচ্চ হইতে কেবল গগনকালের জন্ত বোগীকৈ জাগবিত কবিতে পাবা যাব, কিঞ্চ তখন তাহার দৃষ্টিশক্তি পাকে না ও সেই অস্পষ্ট কাতরোক্তি ধবে ।

## কালীডিয়ম ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—শীত ।—উদন হইতে শীতের আবস্ত এবং পায়ের দাতা ও হাতেব অঙ্গুলী পম্যন্ত উহাব বিস্তৃতি । উত্তাপ ।—তুইগ্রহণ বাহির পূর্বে । দাকালে শব্দেব উত্তপ্ততা ও হস্তেব শীতলতা ; তুইগ্রহণ বাহির পবে শব্দেব শীতলতা ও পদেব উত্তপ্ততা, অন্তরে তাপ, উদন দপদপ, অতিশয় বদঙ্গন । ঘর্ষণ ।—জ্বর, তজ্জা, ও তর্কলতা, ঘর্ষে মক্ষিকা পতন, বস্মে জবেব উপসর্গেব শাস্তি । বিরাম ।—দিবসে নিদ্রাস্তে তাপ, তাপে তৃষ্ণা, তাপান্তে বস্ম, বাহিরেব বাতাসে শীত, বর্গে স্ততার বেদনা, গল-গ্রাণ্ডিল দীততা, ও কাষ্ঠবন্ধ ।

## কালী আইণ্ডেটম ।

গুণমালাগ্রস্ত বোগীনিগেদ মণিমান জলে মুখ শোষ, পিপাসা, ও পদে ফোততা লক্ষণে এই ঔষব ব্যবহার করা দাইতে পাবে ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—শীত ।—গুট ও নিম্নাঙ্গে শীতের আশ্রস্ত ও সঙ্গশরীবে ব্যাপ্তি, অগ্নি উদ্বাপে শীতের অমুগশম, কিন্তু গাত্রাবরণে উপশান্তি, বাহিতে এক সংযতবৎ অনুভব ; তৃষ্ণা ; তজ্জা, বাবংবাব জাগরণ ; গ্নি কখনও গুট, কখনওবা প্রচুর ঘর্ষণ । উত্তাপ ।—উত্তাপবস্থায়

অলঙ্কে ঝলকে তাপাদেশ, অতিশয় ভৃষ্ণা, সময়ে সময়ে তৎসহ শীত, কখনওবা  
প্রচুর ঘন্থ, মস্তকে উত্তপ্ততা, অবসন্নতা এবং একবার উত্তাপ একবার ঘন্থ ।  
ঘন্থ ।—অত্যন্ত বা উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে ঘন্থ ।

## কালী কার্বনিকম ।

কালী-কাল্প নীচত্বা কথায় । স্ততঃ শীতত্বা জ্বিত্বদোষীয়া ; এবং  
বক্তৃদোষ ও অস্বাভাবিকতায় এবং এই উৎপাদন বলা যাইতে পারে ।  
কালী বাল্য জ্ঞাপক বোগ্যে অস্বাভাবিকতায় এবং, এজন্ত নাড়ীর বৈষম্য  
বা সপর্মান দেয় ক্ষতি হইবে, অথবা নাড়ীর দ্রুততা ও অতিশয় দ্রুততায়  
থাকে । এই প্রকার নাড়া কালী-বাল্য প্রয়োগের বিশেষ লক্ষণ । এই  
বিশেষ লক্ষণ হইবে সমস্ত লক্ষণের মূল । নাড়ীর পূর্ণতা ও গোলায় থাকিলে  
এই উৎপাদন একেবারেই বাতিল হইবে । কালী-বাল্য কালো ভেজিটেবিটিমের  
অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ একটাবাণী সমাক উপকার না দাননে অপবটী উপকারক ও  
আবশ্যক । কালিদান যেন যে মানাছে বৈদ্যে মিনিট অতিশয় শীত  
তজ্জন্ত শীতলা পার্শ্বাব আবশ্যকতা, তৎপরে বিবর্নিবা ও বমন এবং মস্ত  
বাহি বস্তুতলে আক্ষেপিক বেদনা, শ্বাসবৃদ্ধতা, আভ্যন্তরিক উদ্বিগ্ন ও  
অতিশয় ঘন্থ ; এবং এই উৎপাদন প্রয়োগ-লক্ষণ । ৮ঃ লিঙ্গিয়ানথান শীত  
ও তাপাবহায শ্বাস বহু, বস্তুতলে আকুঞ্চন, মাস্তপ প্রদেশে বেদনা, শীত  
পিপাসাদ আদিকা, প্রবানতঃ উচ্চাচ্ছ ঘন্থ । ও প্রমে মস্ত্রে ঘন্থন উদ্বিগ্ন  
লক্ষণে মনিমান এবং কালী কাল্প বানবাবের বৈব দেন ।

**জ্বরের লক্ষণ ।—**শীত ।—অজকালস্থায়ী প্রবল শীত, শীত  
মহাকাষে ধূমপিপাসা, অগ্নির উত্তাপ ও শব্দে শীতের উপশম, নড়িলে  
চড়িলে ও মৃদল বাহিরে গেলে শীতের বন্ধি, সন্ধ্যাকালে ও আহ্নাস্ত্রে  
শীতের অতিশয়, বেদনামূলকতায় শীত, শ্বাসতঃ শীতোত্তাপ, পর্যায়ক্রমে  
শীতোত্তাপ, অস্ত্রের উত্তাপ ও তজ্জন্ত প্রবল পিপাসা, শীতাবহায বিবর্নিবা,  
বমন, বস্তুতলে বেদনা, বস্তুতলে বেদনা, শ্বাসবৃদ্ধতা, হস্তের উত্তাপ,  
আভ্যন্তরিক অপ্রসুতি, শীতস্ত্রে পিত্ত মেন । **তাপ ।—**অস্ত্রের তাপ বাহিরে  
শীত, শীত ও উত্তাপে শ্বাস বহু, বদন আকুঞ্চন ও উত্তপ্ত, চবণ বদনবৎ

শীতল (দিপি)। ঘর্ম্ম।—রাত্রিতে, প্রাতে, নড়িলে চড়িলে, ও মানসিক  
 "প্রিশ্রমে ঘর্ম্মের নিঃসরণ, উদ্ধাঙ্গে ঘর্ম্মের আধিকা, উষ্ণ ও অন্ন-গন্ধ ঘর্ম্ম  
 ঘর্ম্মাভাব। বিরাম।—অক্ষিপুট সংযোজন; বক্ষঃস্থলে চাপাছুভব; বক্ষঃদেশে  
 বেদনা ও স্পর্শ-দেয়, আহ্বান, বিশেষতঃ কটিতে অপ্রবৃত্তি; অতিশয় তৃষ্ণা;  
 উদবেগ বায়ু-পূর্ণতা। হ্রাস-বুদ্ধি।—রাত্রি ছই তিনটার সময়ে, বিশ্রামে,  
 ও শীতলতাব বুদ্ধি। উত্তাপে, ক্রিয়াশীল, ও উদ্ধাঙ্গে হ্রাস।

## কালী বাইক্রমিকম।

কুলকাল ব্যক্তি, বিশেষতঃ যুব শিশুদিগের রোগে এই ওষধ বিশেষ  
 উপযোগী। দৈনন্দিন জীবনের দুঃখছাড়া, বক্ষু সদন প্রাণ, প্রত্যহ প্রাতঃকালে  
 একই সময়ে শিরঃপাতা, শান-বিকল্পণ বেদনা, এবং রোগ লক্ষণে  
 সহসা আদির্ভাব ও ত্রিসোভাব ইহা বিবেচ্য লক্ষণ।

জ্বরের লক্ষণ।—শীত।—শীতের পদে আশ্রয় ও তথা  
 হইতে উদ্ধে উত্থান, প্রক্ষাল্য পদে পুনঃ পুনঃ সংকোচন অসম্ভব, পূর্বে  
 শীতানুভব সহকারে নিদ্রাত্যাগ, জ্বর, ও অক্ষমতা, শিরোঘর্ষণ, বিবিধা  
 অনন্তর উত্তাপ সহকারে কম্প ও থাকিয়া থাকিয়া রণেব বেদনা। শীতের  
 একদণ্ডা পলে মূণ শোণ, তৎক্ষণ বাৎসব মূণ ভিজাইতে হয়। উত্তাপ।  
 —হাতে ও পায়ের পাতায় উত্তাপ, বিবামতা, উদবোধে বেদনা, থক থক  
 কাশ, অনিদ্রা; তৎক্ষণে উষ্ণ ও পায়ের পাতায় ঘর্ম্ম হইয়া যাতনার উপশম;  
 দুইঘণ্টা পলে আদ্য পূর্ণরূপ উগমগ, কোপনতা, উদ্ধাঙ্গে জ্বালা, ও তাপ,  
 অন্তরে শীত, অতিশয় পিপাসা। তাপের পদ ঘর্ম্ম।—একবার ঘর্ম্ম  
 একবার উত্তাপ, কচিং ঘর্ম্মাভাব। রাত্রি প্রথমভাগে, বা বাজিতে, অথবা  
 প্রাতে জ্বরের আধিকা। হ্রাস-বুদ্ধি।—প্রাতে, শীতলতাব, ও আহ্বায়ে  
 বুদ্ধি। উত্তাপে, ও সন্ধ্যায় প্রাণে হ্রাসপ্রাপ্তি।

## কিউরেয়ার।

অপরূহ ২৩টার সময় সমাগত প্রাত্যহিক জবে রোগী রাত্রিতে ভাঙ্গ



খাৎকলে ; এবং আংশিক বা ক্ষণিক শীত সহকারে দাহকর উত্তাপ , অস-  
লম্ব বাক্য ; অতিশয় অবসন্নতা ; অনেক সময় দেহ-শাখার অর্থাৎ হস্তপদাদিয়  
পক্ষাঘাত ; শীতল ও বক্তাক্ত ঘর্ষ ( বিশেষতঃ রাত্রিতে ) ;—এই সকল লক্ষণে  
সবিরাম জ্বরে কিউরেয়ার ব্যবস্থা করা যায় । প্রতিদায়িত শীত সংযুক্ত দূষিত  
সবিরাম জ্বরেও ইহা ব্যবহৃত হয় ।

## কুপ্রম ।

প্রবল জ্বর , ফোট-জ্বর ; পদেব ঘর্ষাবোধ বশতঃ জ্বর , ও বিলেপী জ্বরে  
কুপ্রম ব্যবহৃত হয় । ফোট-জ্বরে উদ্ভেদ বসিয়া গিয়া আক্ষেপ, মুখ-বিকৃতি,  
অস্থিরতা ও প্রলাপাদি উপসর্গে কুপ্রম উপকারী । টাইফস জ্বরেও ইহার  
ব্যবহার আছে ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরামজ্বর ।—সর্বশরীরে, বিশেষতঃ  
হস্ত ও পদে শীত, অপস্মারের আবেশের পরে শীত, শরীরের বরফবৎ শীতলত।  
ও হস্তপদে থলী । অন্তবে ঝলকে ঝলকে দুর্বলকর উত্তাপাবেশ, পদতলে জ্বালা ।  
রাত্রিতে শীতল, আঠা আঠা প্রচুব ঘর্ষ । সন্নিপাতজ্বর ।—তীব্রজ্বর, ও  
অত্যন্ত দুর্বলতা সংযুক্ত টাইফস জ্বর ; রক্তের বিসমাসিত অবস্থা, নাসিকা  
হইতে রক্তপাত ও গাত্রে দংশ-পোড়কা ( পিটেকিয় ) ; স্নায়বীয় উত্তেজনা সহ  
অতিশয় অবসন্নতা ; অস্থিরতা ও পার্শ্ব-পরিবর্তন ; প্রতাপন, অপরিচ্ছন্ন  
( ঝাংসা ) চক্ষু , প্রতিক্ষীণতা ; কংপিণ্ডের পক্ষাঘাত ।

## কোনিয়ম ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—শীত ।—কম্প, রৌদ্র সেবনের ইচ্ছা  
( অগ্নি সেবনের ইচ্ছা, ল্যাক ) ; পূর্বাঙ্কে শীত, অপরাহ্নে কম্প, সর্বাঙ্গ  
বরফবৎ শীতল ; শিরোবেদনা, শিরোঘূর্ণন, মস্তিষ্কের আকুঞ্জন অল্পভর ;  
মুখমণ্ডলের উষ্ণতা, বিবমিষা, করতল ও পদতল শীতল ; নখের নীল বর্ণ ;  
চিহ্নের নৈরাশ্র ও ওদাশ্র । তাপ ।—অতিশয় স্নায়বীয়তা সহকারে দাহ ;  
অন্তরে ও বাহিরে অতিশয় তাপ ; তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রভূত ঘর্ষ । ঘর্ষ ।—

দিবাবাত্রি, বিশেষতঃ নিদ্রাকালে ঘর্ম, এমনকি চক্ষু বুজিলেই ঘর্মের উদ্বেক ।  
বিরাম ।—সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ।

## ক্যাঙ্কিস ।

প্রাত্যহিক সন্নিবাস অব পূর্নাক্ষ ১১টা, অথবা বাত্রি ১১টার সময় উপস্থিত  
হইলে, বিরামকাল অস্পষ্ট ও উপদ্রবপূর্ণ থাকিলে ; এবং দীর্ঘস্থায়ী শীত,  
পৃষ্ঠ ও হস্তদ্বয়ে শীতলতা, আবক্রিম বদন, প্রবল বমন, অস্থিভতা, মূত্রাশয়ে  
বেদনা, মূত্র রোধ, শীতের পল উত্তাপ, মস্তকে বক্রাধিক্য, শিরঃপীড়া, শ্বাসের  
খর্ব্বতা, শ্বাসকষ্ট, হৃৎপ্রদেশে বেদনা, উদলে অসহ্য উত্তাপ, অধিক তৃষ্ণা, ও  
প্রভূত ঘর্ম ( হৃৎযোত্তাপজনিত জবে ঘর্মভাব ) লক্ষণে ক্যাঙ্কিস ব্যবহৃত হয় ।  
\* হৃৎযোত্তাপ লাগিয়া অব হইলে অথবা পুনঃ পুনঃ অব প্রত্যাবর্তন করিলে  
এই ঔষধ উপযোগী । ঠিক একই সময়ে জ্বের উপস্থিতি, পৃষ্ঠ ও হস্তের  
শীতলতা, এবং মূত্রাবরোধ ইহাব বিশেষ লক্ষণ । ক্যাঙ্কিসের লক্ষণ নড়িলে  
চড়িলে ও স্পর্শে বদ্ধিত এবং বাহিরের বাতাসে উপশমিত হয় । ক্যাঙ্কিস জ্বরে  
বড় অধিক ব্যবহৃত হয় না । আবেগিয়া, সিড্রন, ও গিকোনা ইহার সমগুণ ।

## ক্যাংস্টেরিস ।

মূত্রত্যাগে জালাযন্ত্রণা ; শীতাবস্থাব অবসানে হস্তপদের শুষ্কতা ও অধিক-  
পিপাসা ; এবং জননেন্দ্রিয়ে মূত্র-বন্ধি ঘর্ম ক্যাংস্টেরিসের বিশেষ লক্ষণ । জ্বরে  
কেবল শীত ও কম্প, শীতান্তে পিপাসা, চক্ষু বেদনা ; অর সহকারে উপস্থের  
শীততা, মূত্রাশয় ও মূত্রমার্গে বাতনা, কষ্টে মলিনবর্ণ বিন্দু বিন্দু, অথবা  
রক্তমিশ্রিত মূত্রত্যাগ ; মূত্রত্যাগকালে এবং তৎপূর্বে ও পরে অতিশয় কুশন ;  
মুখ শোষ, তৃষ্ণা, গাত্রবেদনা, ও নড়িতে চড়িতে অশক্তি, বাত্রিতে জ্বালাকর  
উত্তাপ, কিন্তু বোগিণীর তাহা অনুভব ; পিপাসা সহ উত্তাপ, এই ত্রি এই  
ঔষধ ব্যবহারের প্রধান লক্ষণ । মূত্র-পথ অক্রান্ত হইলেই ইহা বিশেষ  
উপযোগী ।

## ক্যাপ্সিকম ।

দীর্ঘস্থায়ী শীতবিশিষ্ট বিষমজ্ববে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । উত্তাপাবস্থাব পরে ঘর্ম্মাবস্থা প্রকাশ না পাইয়া একই সময়ে তাপ ও ঘর্ম্ম প্রকাশিত হইলে ক্যাপ্সিকম ব্যবহৃত হয় । গ্রীষ্মকালে সন্নিবাম জ্ববে ইহা বিশেষ উপযোগী । পৃষ্ঠে, বাহুদেশের উর্দ্ধভাগে শীতের আকস্মিক ইহাব বিশেষ লক্ষণ । ক্যাপ্সিকমেব শীত, তাপ, ও ঘর্ম্ম সকলই নড়িলে চড়িলে উপশমিত হয় । পূর্ক্সাঙ্কে ১০।।০টার সময়, অথবা অপস্যাঙ্কে ৫।৬টার সময় ক্যাপ্সিকমেব অব প্রকাশিত হয় ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—শীতেব পূর্ক্সে ও শীতাবস্থায় পিপাসা, এবং পৃষ্ঠে ও অঙ্গে বেদনা (অস্থিতে বেদনা—ইউপ-পার্কো) । পৃষ্ঠে, স্কন্ধদেশেব মধ্য হইতে শীতেব আবস্ত ও সর্ম্ম শরীবে ব্যাপ্তি (ইউপ) । পিপাসাসংযুক্ত শীত, তদনন্তর পিপাসাশূন্য দাহ । জল পানে শীতের বৃদ্ধি (আর্স, চায়না, নম্ম, ভিরাট) এবং \* পৃষ্ঠদেশে উত্তপ্ত দ্রব্যাদি দ্বাৰা উত্তাপ প্রদানে উহাব হ্রাস । শীতান্তে ঘর্ম্ম । ঘর্ম্মেব সহিত মিশ্রিত, তৃক্ষাপবিশূন্য সামান্য উত্তাপ, উত্তাপাবস্থায় শিবঃপীড়া ও তন্দ্রা । ~~নাড়ী~~ বিষম ও পর্য্যাসশীল (ক্ষণ-বিলম্ব) ।

## ক্যাম্ফর ।

শীত প্রধান বিষম জ্ববে শীতাবস্থাব প্রাপনো, দূষিত বিষম জ্ববে; এবং শর্দি জ্ববেব প্রাবস্তে ক্যাম্ফর ব্যবহৃত হয় ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—তৃক্ষাশূন্য শীতাবস্থা, দীর্ঘস্থায়ী কক্ষ্ম; সমগ্র শরীরেব তুমানবৎ শীতলতা, বদনেব শ্রাবণ, অল্প মাত্র শীতল বাতাসও সহ্য কবিতে না পাৰা, গায়েব তুর্বাবেব ত্রায় শীতলতা সবেও বজ্রাবৃত হইতে অনিচ্ছা, তৃক্ষা পরিশূন্য উত্তাপাবস্থা; উত্তাপ সহকারে শিরার ক্ষীততা; নড়িলে চড়িলে উত্তাপেব বৃদ্ধি, তর্কণকর প্রভূত শীতল ঘর্ম্ম, অতিশয় উৎকর্ষা ও দুর্বলতা ক্যাম্ফরেব প্রধান লক্ষণ । সন্নিবাম জ্ববে বিস্থ-চিকাৰ পতনাবস্থাব লক্ষণেব ত্রায় লক্ষণ উপস্থিত হইলে ক্যাম্ফর ফলপ্রদ । এপিস, কার্কো, ছেলস, নম্ম, ভিরাট লক্ষ প্রভৃতি ঔষদও উপযোগী ।

ক্যাম্ফরের লক্ষণ শীতল বাতাসে, রাত্রিতে, ও নড়িল চড়িলে বৃদ্ধি পায় ; এবং উত্তাপে, উষ্ণ বাতাসে, ও শীতল জল পান হ্রাস পড়ে । সন্নিপাত জ্বর ।—আকস্মিক অবসন্নতা ; সর্ষপবীবেক তুষাববৎ শীতলতা, মুখমণ্ডলেব মৃতবৎ পাণ্ডুরতা, শীতল আঠা আঠা ঘর্ষ, অথচ আবৃত থাকিতে আঁনছা ; গলায় ঘড় ঘড় শব্দ ; উত্তপ্ত শ্বাস ; অনৈজিক অতিসার ; এই সকল লক্ষণে সন্নিপাতজ্বরে ক্যাম্ফর ব্যবহৃত হয় ।

## ক্যামোমিলা ।

ক্যামোমিলা জ্ঞাপক অব প্রাদাহিক নহে, কিন্তু ঔপদাহিক । অল্পে অজীর্ণদ্রব্যেব সংগ্রহ, অথবা দন্তোদ্বৈদ জনিত উপদাহ হইতে যে জ্বর উৎপন্ন হয় এবং বাহাতে স্নায়ুমণ্ডল অতিশয় উত্তেজিত হয়, কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃত হয়না, যন্ত্রণায় অতিশয় অধীবতা জন্মে এবং অনেকক্ষণ একভাবে থাকিতে পারা যাযনা, উত্তাপে সমগ্ন অগ্নি বিবর্জিত হয়, পেশীব শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে ; এবং কেবল কোমল পেশীব স্পন্দন ও উৎক্ষেপ, এবং অবশেষে সর্ষাপবীক আক্ষেপ উৎপন্ন হয়, তাহাতে অর্থাৎ শিশুদিগেব দন্তোদ্যম জ্বরে, শব্দ জ্বরে, ও অগ্নি প্রকাব জ্বরে, এবং ক্রোধ বা বিবর্জিত বশতঃ স্নায়ু ক্রিয়া বিকাব জন্মিয়া যে পিত্ত-জ্ব উৎপন্ন হয় তাহাতে ক্যামোমিলা বিশেষ উপযোগী । অনেক সময় ক্রোধ বা বিবর্জিত বশতঃ স্পষ্ট জ্বর না হইয়া তৎপরিবর্তে স্তম্ভিত উদব-বেদনা, পিত্ত-মিশ্রিত তিক্ত বমন বা কাঠবিমি ও উদরাময় জন্মিয়া থাকে ; সে স্থলেও ক্যামোমিলা উপকারী । প্রসূতিব স্মৃতিকা জ্ববে প্রসবাস্তিক আবাববোধ, স্তন-দুগ্ধ বিলোপ, দুগ্ধবৎ শুভ্র ভেদ, প্রসব-বেদনার জ্বায় কটি-বেদনা, শিরোবেদনা, ও বক্ষঃস্থলে স্বেদনাদি লক্ষণেও এই ঔষধ ফলপ্রদ ।

বিশেষ লক্ষণ ।—শিশুবি পিট খিটে স্বভাব । কোলে করিয়া বেড়াইলে শিব থাকা বা শাস্ত হওয়া (এতদ্বিপবীত, তাই) । এক গাল লাল, অথ গাল পাণ্ডুর । হ্রাস বৃদ্ধি ।—প্রাতে (নয়, তাই), দুইপ্রহর রাত্রিব পূর্বে, উত্তাপে ও ক্রোধেব উদ্বেকে বৃদ্ধি, সায়াহ্নে (বৃদ্ধি, পলস), অনাহারে. ও আর্জবায়ুতে হ্রাস । জ্বরের সময় ।—পূর্বাহ্ন ১২টা, অপরাহ্ন ৪টা হইতে

রাত্রি ১১টা পর্যন্ত ; শীত শূন্য জ্বর পূর্নাহ্ন ৯টা হইতে ১২টা । জ্বরের প্রকৃতি ।—প্রাত্যহিক ; ১১২ দিন অন্তর ; ও প্রত্যাহ দুই ঘণ্টা কবিরাজ অগ্রগামী জ্বর ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরামজ্বর ।—শীতাবস্থায় তঞ্চ্য অবিদ্যমানতা ( কেবল শীতাবস্থায় পিপাসা, কার্কো, ইয়ে ) ; উত্তাপ ও ঘর্ম্মাবস্থায় পিপাসা । শীতের অন্নতা, উত্তাপ ও ঘর্ম্মের আধিক্য । কোন কোন অঙ্গ শীতল, কোন কোন অঙ্গ উত্তপ্ত ; সর্কাজে শীত, মুখমণ্ডলে উত্তাপ এবং উত্তপ্ত নিশ্বাস । শরীরের সম্মুখভাগে শীত ও পশ্চাভাগে তাপ, অথবা সম্মুখভাগে তাপ, পশ্চাভাগে শীত । দাহাবস্থায় সময়ে সময়ে শীত । এক গণ্ড আরক্ত ও উত্তপ্ত অপব গণ্ড পাণ্ডুবর্ণ ( একন, নন্ড ) । জিহ্বায় হরিত্রাবর্ণ লেপ, জিহ্বাব পার্শ্বদ্বয় শুভ্র, মধ্যভাগ আরক্ত । বিবমিষা, পিত্ত-বমন, উদরাময় । \*নিম্নোদরে বেদনা । বারংবার অধিক পরিমাণে জলবৎ মূত্রত্যাগ । বস্ত্রাবৃত দেহাংশে অপরিণাপ্ত ঘর্ম্ম । মুখমণ্ডল ও মস্তকে উষ্ণ ঘর্ম্ম । বিচরণে ঘর্ম্মের বিলোপ, কিন্তু নিদ্রাবস্থায় পুনরুদ্ধার ( মাধু ) । অতিশয় অসহিষ্ণুতা, কেহ'কিছু গিজ্জাসা করিলে অশিষ্ট উত্তর প্রদান । সন্নিপাত জ্বর ।—<sup>ফিলীয়</sup> অবিদ্যমানতা, অপরাহ্নে মুখমণ্ডলে আবরুতা ও জ্বরের উত্তাপ, তৎসহকায়ে কর্ণ-মূলেব ক্ষীণতা ; মুণের প্লেথ্রিকফিলীয় আরক্ততা ও বসশূন্যতা ; বিদ্যাবিত ও লেপারত জিহ্বা ; মুখে পচা ও তিক্ত আশ্বাদ ; শ্বাসে দুর্গন্ধ ; প্রবল পিপাসা, বিমল জল পান্যে অতিশয় ইচ্ছা ; বিবমিষা, তিক্ত বমন ; আমাশয়ে ভারবোধ ; উদব-বেদনা ; প্রচাপনে উদবেব অতিশয় স্পর্শাহুতাবকতা ; হরিতাভ পীতবর্ণ, জলবৎ মল ; পীতাভ অধঃক্ষেপ বিশিষ্ট মূত্র ; শর্দিজনিত স্বরভঙ্গ ; বক্ষঃস্থলে প্লেথ্রাব শব্দ ; কণ্ঠনালা কণ্ঠ্যিত হইয়া কাসেব উদ্বেক ; বক্ষঃস্থলে ভার ; কর্তনবৎ বাতনা ; ও আলা ; নিদ্রাশূন্যতা ; গাত্র-স্পন্দনসহ নিদ্রিতাবস্থা ; প্রলাপ ; ঘর্ম্মশূন্য জ্ববেব উত্তাপ ; উৎকর্ষা ; শ্বাসবীয় উপদাহ ; দীর্ঘনিশ্বাস ও কোঁকানি ।

## ক্যালকেরিয়া কার্বনিকা ।

শ্লেষ্মা-প্রধান ধাতু ; গওমালা-ধাতু, দুর্বলতা, ডাংবে উঠিতে শিথোঘূর্ণন ও স্বাস্থ্যহতা ; স্থূলত্ব-প্রবণতা ; পদদ্বয় আর্দ্রবজ্রাবৃতবৎ অমৃতব ; শিশুগণের শিথিল পেশী ; অল্পেই অধিক ঘর্ম ; সহজেই শর্দিলাগা ; অস্থি জন্মিতে, দাঁত উঠিতে, ব্রহ্মরক্ষের অস্থি ছোড়া লাগিতে ও হাঁটতে শিথিতে কালবিলম্ব ; নিদ্রাবস্থায় মস্তকে ও ঘাড়ের প্রচুর ঘর্ম এবং তজ্জন্ত বালিশ ভিজিয়া যাওয়া ; মাথা ও পেটের বৃহৎ ; নাবীদিগের অল্প বয়সেই ঋতু আবস্ত হইয়া অধিক দিনব্যাপী ও অধিক পরিমাণ বজ্রাব ; অবশেষে ঋতুব লুপ্ততা বা স্থলতা , — এই সকল অবস্থাপন্ন ও বিশেষ লক্ষণাবিত বোগীদিগের পক্ষে শর্দি জন্মে, বাতের জন্মে, কুইনাইন আটকান জন্মে, বিলেপী জন্মে, পুণাতন জন্মে, এবং মীহা-যক্কাদি উপসর্গ সংযুক্ত জন্মে ক্যালকেরিয়া বাবজত হয় । একাঙ্গীন ঘর্ম ক্যালকেরিয়াব একটা নিশ্চিত লক্ষণ । জলে দাঁড়াইয়া বা ভিজিয়া কাজ করা জন্মের কারণ হইলে এই ঔষধে উপকার দর্শে । ক্যালকেরিয়াব লক্ষণ ঠাণ্ডা বা ভিজা বাতাসে, জলে ভিজায়, উষ্ণে উঠায়, শারীরিক ও মানসিক পারিশ্রমে বর্ধিত ; এবং শুষ্ক উষ্ণ বায়ু সেবনে উপশমিত হয় ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরামজ্বর ।—বেলা ২টার সময় জ্বর ।

জ্বরের পূর্বে মস্তক ও শরীরের গোলব, সমস্ত গ্রন্থিতে আক্কেষ্টবৎ বেদনা । শীতাবস্থায় পিপাসা ; আমাশয়প্রদেশে শীতের আবস্ত, ও তথায় শীতলতা ও চাপামৃতব ; শীতান্তে উত্তাপ অন্তর্ধান । বাহিরে শীত অন্তরে তাপ, অথবা একবার শীত একবার তাপ ( আর্স ) । মুখ, দস্ত, চরণাদি এক একটা জ্বরের শীতলতা ; মস্তকে তুষাববৎ শীতলতা অমৃতব ; শরীরভাষ্যে শীতলতা মৃতব । \* পদদ্বয় আর্দ্রবজ্রাবৃতবৎ অমৃতব । প্রবণ শক্তির ক্ষীণতা । উত্তাপান্তে শীত ও হস্তের শীতলতা । উত্তাপাবস্থায় পিপাসাব অবিদ্যমানতা । ঝলকে ঝলকে বারম্বার উত্তাপাবেশ । মস্তকে বক্তেব প্রধাবন ও অতিশয় উত্তাপ । উত্তাপাবস্থায় অনাবৃত হইতে চেষ্টা ( সিক, মল্ফ ) । রাত্রিতে অ-স্তবে, বিশেষতঃ হাতে ও পায়ে উত্তাপ । প্রাতঃকালে ও সামান্য পবিশ্রমে ঘর্ম-স্রাব । ঘর্মাবস্থায় তৃষ্ণাব অভাব । ঘর্ম্মান্তে প্রায়ই নিদ্রা । অতিশয়, ঈষৎ শুভ্র ও অজীর্ণ দ্রব্য সংযুক্ত অপরিণাকেব ব্রায় মল, পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধ ও

উদবাসন । অরেক বিবাহ সমাক ও স্পষ্ট নহে । সন্নিপাতজ্বর ।—টাইফয়েড অরের প্রারম্ভাবস্থায় অস্থির নিদ্রা ও বিবর্তনজনক স্বপ্ন দেখিয়া জাগরণ ; পুনর্বার নিদ্রা ও পুনরায় সেই বিষয়েই স্বপ্নদর্শন ; চক্ষু রক্ত কবিতা-মাত্র মল্লভা ও দ্রব্যাদির প্রতিক্রিয়া দর্শন, চক্ষু মেলিলে আবার তাহাদের বিরোধিতা, হৃৎকম্প ; ব্যাকুলতা ; প্রতি-শক্তির ন্যূনতা ; নাসিকা হইতে রক্তপাত ; বক্ষাস্থি বিনয়ে অবিরত কণ্ঠস্বর ও তজ্জন্ত শব্দ কাস ( রস ) । টাইফয়েড অব্যবহিত অবস্থায় উদ্বেদ উৎপন্ন না হওয়াতে বোগীর একপ্রকার অচেতনতা ; উদরের ক্ষীণতা ও আত্মন ; অচেতনতা সত্ত্বেও অস্থিরতা, আকুলতা, ও ক্লিষ্টতা ; চিৎকার করিয়া উঠা ও শয্যাবস্ত্র খুঁটা ; গাত্রের অতিশয় উত্তাপ কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল ও আঠা আঠা, নিদ্রা হইতে চমকিত হইয়া উঠা ও ভীতবৎ চারিদিকে দৃষ্টিপাত ; অতিশয় বা কোষ্ঠবদ্ধ ; প্রাতে, বা সামান্য সকলনে প্রচুব ঘর্ম ।

## ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকোজা ।

ক্যালকেরিয়াসূচক গুণমালা ধাতু ও আর্সেনিক জাপক অরের লক্ষণ বিমিশ্রিত থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহ ও গ্রীবাভিমুখে শিউ শিউ কবিতা শীতের গতি ; ত্বকের সমীপবর্তী স্থানগুলি যেন উষ্ণ হইয়াছে একপ অল্পভব । পৃষ্ঠে শিহবণ, গাত্রে বোমাক, রাত্রিতে নিদ্রাশূন্যতা ; মূত্রে অণ্ডলাল নিঃসরণ, অপবাহে যেন পেট কাঁপিতেছে একপ্রকার অল্পভব ও তৎসহ শীতল জলেব তৃষ্ণা ; সন্ধ্যাকালে শীতাবস্থায় ক্ষুধাবিশূন্যতা ; হৃৎকম্প সহ ত্বকের উত্তাপ । বাত্রি তিনটার-সময় ঘর্ম । এই ঔষধের লক্ষণ ।

## ক্রিয়োজোট ।

জ্বরের লক্ষণ ।—শীত ।—শীতের প্রাধান্য, বিশেষতঃ অস্থির ভাবে থাকিলে ; কম্পসহকারে সুগমগলে ঝলকে ঝলকে তাপাবেশ ; গুণহলেব আরক্ততা, পদেব বরফবৎ শীতলতা, প্রত্যুষে নাসিকা হইতে রক্ত-

পাত ; জাল-দৃষ্টি, তজ্জ্বল বারংবার চক্ষু বর্ষণ, চক্ষুর আৱরুতা ও উষ্ণ অশ্রু-  
স্রাব ; বাহ্য উপবিভাগে গুরুত্ব অনুভব, কোপন স্রাব । উত্তাপ ।—মুখ-  
মণ্ডলে তাপের আতিশয্য, গালের কিষদংশের আবরুতা ও উত্তপ্ততা ।  
ঘর্ম্ম ।—গালের উত্তপ্ততা ও আৱরুতাসহ প্রাতে অল্প অল্প ঘর্ম্ম ।

## চায়না বা সিক্কোনা ।

প্রাদৌহিক জীব একোনাট্ট ও সরিষাপাত জীব আর্সেনিক বেকপ  
উপকারী, নিষেধী জীব ( হেট্টিক দিবাব ) চায়না সেইকপ দ্বন্দ্বপ্রদ । চায়না  
পর্ণায়-নিবাবক ও ম্যালেরিয়া-নাশক । স্থানিয়ান এগেন যে সবিসাম জ্বরে  
উষ্ণাবস্থাব অব্যাহিত পূর্বে ও পরে পিপাসা, কুৎস্পন্দ, ব্যাকুলতা, বিবসিষা,  
দুঃস্থ ক্রোধ, আনাশবের উদ্ধদেশে বেদনা ; অথবা শিবোবেদনা ও অতিশয় তৃষ্ণা  
সহকারে জ্বরের আক্রমণের আবন্ত, মস্তকে বক্তের গতি, বাহ্যশিরার প্রস্রাবণ ;  
—এইগুলি চায়নার প্রয়োগ লক্ষণ । ডাঃ বেইস বলেন যে শীত, উষ্ণ, ও  
ঘর্ম্মাবস্থা যথানিষনে প্রকাশিত হইলে এবং নিবাম-কাল স্পষ্ট থাকিলে বিষম  
জ্বরে চায়না বিশেষ ফলপ্রদ । ডাঃ চার্লি বলেন যে প্রকৃত শীত ও উষ্ণাব-  
স্থায় পিপাসার অভাব চায়নার বিশেষ লক্ষণ । শীত বা উষ্ণাবস্থায় পিপাসা  
থাকিলে এবং একেবারে ঘর্ম্ম না হইলে এই ঔষদ ব্যবহৃত নহে । উষ্ণাবস্থাব  
পব দুঃস্থগণক ঘর্ম্ম থাকিলেই এই ঔষদ বিশেষ উপযোগী । চায়নার জীব  
কখনও বাত্রিতে হয় না । সজ্জ হ্রদের ও ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থানের জবেই  
ইহা ভাল খাটে ।

বিশেষ লক্ষণ ।—একদিন পব একদিন বোগের বৃদ্ধি । শারীরিক  
রসপ্তাদি তবণ নিধানের, বিশেষতঃ বক্ত অক্ষণ জনিত মন্দফল । অস-  
মাত্র বায়ু-প্রবাহে প্রোণুভব । গ্রন্থিতে ও অস্থিতে ছিন্নকব বেদনা ; বাত্রিতে  
আহাবাস্তে, ও স্পর্শে সেই বেদনা বৃদ্ধি এবং পুনঃ পুনঃ অঙ্গ-সঞ্চালনে উহার  
উপশম । অতিশয় দুঃস্থতা ও দণ্ডিত্রমে অপ্রতি । উদরাগ্নান ও উদ্রাবে  
উহার অল্পশম । উদরাগ্নান সংকুল, বেদনাশূল, অজীর্ণদ্রব্য সংমিশ্রিত মল ।  
হ্রাস-বৃদ্ধি ।—একদিন অস্থব একদিন, স্পর্শে, বাত্রে, দুঃস্থপানে ;



ঠাণ্ডা লাগিলে, কুজ হঠাৎ বসিলে, মানসিক উত্তেজনা, ও নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি। উত্তাপে ও স্থির থাকিলে হ্রাস। জ্বরের সময়।—দিবাভাগে যে কোন সময়, মধ্যাহ্ন, অপবাহ্ন ৫টা ও পূর্নাহ্ন ৫টা। জ্বরের প্রকৃতি। একদিন বা দুইদিন অন্তর; প্রাত্যহিক, একদিন কম, অন্তরদিন অধিক; দ্বৌকালীন; অগ্রগামী, সপ্তাহিক বা পাকাস্তিক অব।

**জ্বরের লক্ষণ।**—সবিরাম জ্বর।—ক্ষুদ্র ও দ্রুত নাড়ী, আহাবাস্তে নাড়ীর বেগেব হ্রাস। শীতাবস্থাব পূর্বে বিবমিষা, ক্ষুধা, উদ্বিগ্ন, দ্বংকম্প, ও অতিশয় পিপাসা; প্রতিবাত্ত জলপানান্তে শীতানুভব। সর্বাঙ্গীন শীত, শীতাবস্থায় পিপাসা-শূন্যতা, জলপান শীতের বৃদ্ধি। পর্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ, ত্বকেব শীতলতা ও নীলবর্ণ। দাহাবস্থায় মুখ ও ওষ্ঠের শেষ ও জালা; আবক্ত মুখদণ্ডল ও শিরঃপীড়া। দাহাবস্থায় পিপাসাব অভাব, অতিশয় ক্ষুধা বা আহাবে অগ্রবৃদ্ধি। দাহাবস্থাব পব পিপাসা ও অতিশয় ঘর্ম। ঘর্মাবস্থায় পিপাসাব বৃদ্ধি। নিদ্রাবস্থায় অথবা শবীর বজ্রাবৃত করিলে অতিশয় ঘর্ম। যে পার্শ্বে শয়ন কবা যায় সেই পার্শ্বে ঘর্ম। দুর্লগকব প্রভূত ঘর্ম, বিশেষতঃ বাজিতে। জ্বেরেব বিবামাবস্থায় অতিশয় আলস্ত ও দুর্লগকব ঘর্ম, কর্ণে শব্দ, শিবোবুর্গন, ও মস্তক বিবদ্ধিত অনুভব, বদনের পাণ্ডুবতা; গীহা-যক্বেব বেদনা ও বৃদ্ধি; প্রস্রাবের অল্পতা, নড়িলে চড়িলে বা সামান্য পবিশ্রমে সমস্ত লক্ষণেব বৃদ্ধি। ঘর্মাদিক্যানিশিষ্ট তকণ অব। (আর্সেনিক ও চায়নাব প্রভেদ আর্সেনিকে দ্রষ্টব্য)। দুর্লগকব দৈন্য ঘর্মাদি নিশিষ্ট বিলেপী অব। সন্নিপাত জ্বর।—অধিক বক্তপ্রায়েব পব দুর্লগতা।

## চিনিম সলফিউরিকম বা কুইনাইন ।

এক্ষণে, জ্ঞান হইলেই কি ভদ্র, কি ইতব সকণেই কুইনাইন জ্বেরেব অমোঘ ঔষধ মনে কবিয়া অনকুচিত চিত্তে উঃ সেবন কবিয়া থাকেন। নির্বিশেষে ও অধিক পরিমাণে কুইনাইন সেবনে কুইনাইনেব অপব্যবহার হয়। কুইনাইনের অপব্যবহারে অতিশয় অপকাব জন্মে। এজন্য, যথোপযুক্ত অবস্থায়ই কুইনাইন ব্যবস্থা কবা বিহিত। এলোপ্যাথি চিকিৎসকেবা নিম্ন লিখিত কয়েকটা বিষয়েব প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কুইনাইন ব্যবস্থা করেন। (১) বিবদ

জ্বরের শীত বা দাহাবস্থার পবে ঘর্ষাবস্থায় অর্থাৎ জ্বরের বিবামকালে কুইনাইন ব্যবস্থেয় । ( ২ ) অল্প পবিষ্কার না থাকিলে উহা সেবন কবান বিহিত নহে । ( ৩ ) জিহ্বা মলিন ও নাড়ী চঞ্চল থাকিলে কুইনাইন প্রয়োগ নিষিদ্ধ । ( ৪ ) মস্তিষ্কে বক্তাবিক্য, শিবোবোগ, অন্নসহানালীৰ প্রদাহ, তরুণ অতিসার, ও বক্ততে বক্তাবিক্য থাকিলেও কুইনাইন ব্যবস্থেয় নহে । ( ৫ ) কুইনাইন জরায়ুতে ক্রিয়া কবে, অতএব গর্ভাবস্থায় বিশেষ সাবধানে উহা ব্যবহার কবা উচিত ।

হোমিওপ্যাথি মতে তরুণ ও উপনর্গশূল ম্যালেরিয়া জবে বিবামকালে কুইনাইন ব্যবহৃত হয় । ম্যালেরিয়া জবে শীত, তাপ, ও ঘর্ষাবস্থা যথানিয়মে উপস্থিত হইলে কুইনাইন প্রায়ই ব্যর্থ হয় না । ডাঃ হেল বলেন যে জিহ্বা পবিষ্কার, নাড়ী কোমল, এবং বক্ত আর্দ্র ও শীতল না হইলে ( সফটোপন্ন স্থল ব্যতীত ) তৃতীয় দশমিক ক্রমেব নিম্নে কুইনাইন ব্যবহার কবা বিধেয় নহে । মার্কিউরিয়স, একোনাইট, পডোফিলিন, ময়ভনিকা প্রভৃতি যথায়োগ্য ঔষধ ব্যবহারে বক্তঃ ও পবিপাক-বস্ত্রব ক্রিয়া পবিশোধিত হইয়া জিহ্বা পরিষ্কৃত হইলে পরে কুইনাইন ব্যবস্থা কবা উচিত ।

জ্বরের শীত বা উত্তাপাবস্থায় পিপাসা না থাকিলে কিম্বা উত্তাপাবস্থায় পবে ঘর্ষ না হইলে কুইনাইন ব্যবস্থান কবা বিহিত নহে । তরুণ মলিরাম জবে শীত থাকুক বা না থাকুক, উত্তাপাবস্থা ও উত্তাপেব পবে প্রচুর ঘর্ষ না থাকিলে কুইনাইন প্রয়োগে উপকার দর্শে না । কুইনাইন ও সিকোনাব লক্ষণে নিষিদ্ধ । সাদৃশ্য লক্ষিত হয় । প্রভেদ এই যে কুইনাইনেব জব ঘটকায়দ্বয় লাব ঠিক এক সময়ে উপস্থিত হয়, এবং উহা সাধাবণতঃ পূর্বাঙ্ক ১০টা, অপরাঙ্ক ৫টা ও বাত্রি ১০টাব সময় প্রকাশিত হইয়া থাকে । যে জব প্রতি পর্যায়ে অগ্রবর্তী হইবা অর্থাৎ আগুয়াইয়া আগুয়াইয়া আইসে তাহাতেও এই দুই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—দ্যাহিক জ্বরেব ঠিক নির্দ্ধাবিত সময়ে উপস্থিতি ; ঐকাহিক জ্বরেব ২৪০ ঘণ্টা আগুয়াইয়া আগুয়াইয়া আগমন ; জ্বরেব সম্যক বিচ্ছেদ, জ্বরেব এব পর্যায় হইতে অত্র পর্যায়েব অন্তর্স্বর্তী সময়ে অতিশয় তর্কসূচী ও পিপাসা, প্রীতি ও বক্ততে বেদনা, কাণে ভেঁ ভেঁ

শক ; শিবোঘূর্ণন ; মস্তক বৃহত্তর অল্পতর ; জ্ববেব সকল অবস্থায়ই নেকদণ্ড ( বিশেষতঃ কটিব নিয়ন্ত্রণ ) টিপিলে ব্যথা ; বেলা ওটার সময় কম্পকর জ্বর ও পিপাসা , শীতকালীন ওষ্ঠ ও নখের নীলাভা ; দাহ ও অতিশয় পিপাসা ; শিবার ক্ষীণতা , উত্তাপাবস্থায় প্রলাপ ; অসহ্য উত্তাপ , বাবাংগার জ্বন্ত 'ও হাঁচি ; অনন্তর প্রচুর ঘর্ম , ঘর্মাবস্থায় পিপাসাব অধিক্য , স্থিতি হইয়া বসিয়া থাকিলে ও ঘর্ম , ঘর্মশ্রমে শিরোবেদনা ব্যতীত অন্যান্য লক্ষণেব শান্তি , কিন্তু শিবঃপীড়ার বৃদ্ধি , জল ভাল লাগা , এবং জলগানে উপশম অন্ততর ; কটন তিক্তস্বাদ , বিরামকালে ও অতিশয় তৃষ্ণা , পৃষ্ঠবংশে টিপিলে বেদনা ; প্রীতিব ক্ষীণতা , নিচ্ছেদকালেব অলক্ষণস্থায়িত্ব ।

## চেলিডোনিয়ম ।

যক্কদ্রোগ সংশ্লিষ্ট জবে চেলিডোনিয়ম ব্যবহৃত হয় । দক্ষিণ স্বক্কাস্থির অভ্যন্তরীণ ও নিম্নতর কোণেব নীচে অবিতর বেদনা যক্কদ্রোগে এই ঔষবি প্রয়োগেব বিশেষ লক্ষণ । চেলিডোনিয়মেব লক্ষণ প্রাতে , ও অপরাহ্নে বর্জিত , এবং সাধারণে উপশমিত হয় । আসেনিক চেলিডোনিয়মেব অন্তরূপকণ

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিবামজ্বর ।—প্রবল শীত ও কম্প ;

হাত পায়ে শীতের আবস্ত , তথাকার শিবাব ক্ষীণতা ; দক্ষিণ পদেব তৃষ্ণারবৎ শীতলতা , বিবনিসা , পৃষ্ঠদিগা নিম্নাভিমুখে শিহবণ ( শিড় শিড় করা ) ; পর্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ । সাধারণে শমনাস্তে আভ্যন্তরিক তাপ ; হস্তেব জ্বালকর উত্তাপ , পবে সর্দশনীবে তাহাব বিস্তার , মস্তক , মুখমণ্ডল , ও বাহুব উর্দ্ধভাগে উত্তাপ । দুই গ্রহণ বাত্ৰিব পব ও প্রাতঃকালেব প্রাক্কালে নিদ্রাকালে ঘর্ম , জাগ্রত হইলে ঘর্মেব বিবতি । জবেব নিচ্ছেদ সম্পৃষ্ট নহে ।

যক্কদ্রোশে বেদনা । শল্লিপাতজ্বর ।—অজ্ঞাতসাবে অপ্রগাঢ় পীতবর্ণ , শুভ্র , বা ধূসরবর্ণ মল নিঃসরণ , কিন্তু বোগীব জ্ঞানেব পবিচ্ছন্নতা , পিত্ত-জবেব দ্বাস সঙ্কেও মুত্রেব পাণ্ডুবর্ণ , স্বাদশূন্য , গাঢ় পীতবর্ণ লেপাবৃত , আবহুপ্রান্ত , দন্তেব চিহ্নে চিহ্নিত জিহ্বা ; শ্বাসে চর্ণক , আমাশয়ে অস্বচ্ছন্দতা অল্পতর ; প্রচাপনে কৃষ্ণিতে অস্থ অল্পতর , কটিদেশীয় কশেককাল ভিন্নকর বেদনা ,

সেই বেদনার কট্যস্থি পর্য্যন্ত সম্প্রসারণ, 'ও' কণেককা যেন বিচ্ছিন্ন হইল  
এরূপ অল্পভব; নিদ্রা যাইবাব ইচ্ছা, অথচ নিদ্রা যাইতে অশক্তি; একদিন  
জিহ্বার শুষ্কতা, অপর দিন আর্দ্রতা, অল্প উদগাব, ক্লান্তি ও আলস্য।

## জেলসিমিয়ম ।

রক্ত-সঞ্চলন-বদ্ধে জেলসিমিয়মেব ক্রিয়াদর্শে । এই ক্রিয়াবশতঃ কাহাব  
কাহাব প্রথমে শীত 'ও' তৎপবে দাহ লক্ষণাধিত জ্বব উৎপন্ন হয়। এজন্ত  
সামান্য অবিক্রম; স্ত্রী 'ও' বালকদিগেব সামান্য জ্বব, শিশুদিগেব স্বল্প-  
নিবামজ্বব ও স্বল্পনিবাম প্রকৃতিব অগ্রাভ জবে, ঘর্ম না কইয়া সঙ্ক্যাকালেব  
প্রকোপ অবস্থাব অবসান হইলে এবং অজীর্ণেব লক্ষণ না থাকিলে এই ঔষধ  
ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হিউজ বাদন বে ব্যাপ্তির্শিয়া দাবা পাকিণয়িক জ্বর ও  
একোনাইট দাবা প্রাদাভিক জ্বব যেকপ প্রথম উদ্যমেই ভগ্ন হয় তজ্রপ জেল-  
সিমিয়ম দাবাও শিশুদিগেব স্বল্প-নিবাম জ্বব হীনবল হইয়া থাকে। অল্পেব  
বিদান-বিকাববিহীন স্নায়বী জ্বব 'ও' আন্তরিক জ্বব, জলবৎ নামাস্রাব,  
স্ববভেদ 'ও' শীত সংযুক্ত বোমান্তিব উদ্বেদাবস্থা, জ্বব গীডকা উথিত হই-  
বাব সময় শিশুদিগেব আক্ষেপ, অতিশয় অস্থিৰতা সহ জ্বব ভাব জেলসি-  
মিয়মেব আযত। তীব্রজবে অতিশয় অস্থিৰতা ও তুর্নিগাব পিপাসা লক্ষণে  
একোনাইট, প্রমাপসংযুক্তদাহ ও শুষ্ক জিহ্বা লক্ষণে ব্যাপ্তির্শিয়া ও বেনে-  
ডোনা ব্যবহৃত হয়। এই প্রকাব জ্ববে জেলসিমিয়ম দণপ্রদ নহে। জেল-  
সিমিয়ম প্রয়োগোপযোগী জ্বব অপেক্ষাকৃত মৃত। শব্দ লাগিবাব পবে ও  
হামেব পুন্নে যে জ্বব হয় তাহাতে ইহা বাবহাব কবিলে সমদিক উপকাব  
দর্শে। আলস্য; গাত্র-গোবন; মস্তক, পৃষ্ঠ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মৃদু বেদনা; মস্ত-  
কের বৃহত ও পূর্ণত্ব অন্ততব, জিহ্বা শুষ্কতা আর্দ্রলেপ, অনতিদ্রুত, পূর্ণতা-  
প্রবণ, কোমল নাড়ী; জ্ববে জেলসিমিয়মেব প্রদান প্রয়োগ-লক্ষণ। ফলতঃ  
জ্ববেব যে অবস্থায় বক্তবহানাড়ীগুলি ওসাবিত 'ও' পবিপূর্ণ থাকে, অথচ পূর্ণ  
নিকমিত সবল ওদাহেব স্রাব উহাদেব দৃঢ়তা ও প্রতিঘাত শক্তি থাকে না,  
সেই অবস্থায় জেলসিমিয়ম ব্যবহা কবা যায়। এই প্রকাব জ্ববে আলস্য,

পেশীর দৌর্বল্য, সম্যক বিশ্রামেচ্ছা ও তজ্জালুতা দি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে ।  
এরূপ অবস্থায় ও একোনাইটের জ্বাষ ধামনিক বক্রসঞ্চয় থাকিতে পারে বটে,  
কিন্তু উহার তত প্রাবল্য থাকে না । নাড়ী পূর্ণ, প্রবাহিত, ও অকঠিন অমূ-  
তৃত হয় । অতএব পিত্তজ্বরে ও যকৃতের অপ্রবল রক্তসঞ্চয় লক্ষণে জেলসিমিয়ম  
ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । টাইফয়েড নামক সন্নিপাত জ্ববেও ইহা অপ্রা-  
প্যেয় নহে । কিন্তু বক্রবহানাডীৰ শিথিলতাৰ আনুযায়িক অলসতা ও নিদ্রা-  
লুতা এবং তজ্জনিত মস্তিষ্কের অপ্রবল রক্তসঞ্চয় অতিশয় অসমতায় ও অটৈ-  
তত্ত্বে পরিণত হইলে পৰ শ্রাব এই ঔষধ ব্যবহার্য্য নহে ।

জেলসিমিয়ম, একোনাইট, ও এপিসের জর-লক্ষণে প্রভেদ অবগত  
থাকা আবশ্যক । তাহা হইলেই নিশ্চিতকণে এই সকল ঔষধ নির্দোষ  
করিতে পারা যায় । সংক্ষেপতঃ প্রাদাহিক জ্ববে একোনাইট, স্থল বিদ্যমান  
বা সবিবাম জ্ববে জেলসিমিয়ম ; এবং সবিবাম বা সন্নিপাতজ্ববে এপিস  
বিশেষ উপযোগী । ( ক ) উৎকর্ষা, নিবাশা, জ্ববকালীন অস্থিরতাবশতঃ  
পার্শ্ব-পবিবৰ্জন, মূত্ৰাব আশঙ্কা ; গাত্র-বস্ত্র তুলিয়া ফেলা ; পূর্ণ, কঠিন,  
উল্লক্ষনশীল নাড়ী ; উত্তপ্ত ও ঘর্ষশূন্য হস্ত ; এবং প্রভূত ঘর্ষ হইয়া সকল  
লক্ষণেৰ শাস্তি ;—একোনাইটের লক্ষণ । ( খ ) উপদাহিতা, অমূতবাব-  
দিক্য, বালকদিগেব কখন কখন নিদ্রাশূন্যতা, স্নায়বীয়তা অথবা আক্ষেপেব  
সম্ভাবনা, কিম্বা নিদ্রালুতা, মত্ততাব জ্বাষ অক্ষিপুটেব গুরুত্ব, সম্পূর্ণ শাস্ত  
থাকিবার ইচ্ছা ; পৃষ্ঠেব উৰ্দ্ধে ও নিম্নে শীতেব প্রত্যাবৃত্তি ; তৎপবে বিব-  
র্জিত নিদ্রালুতা সহ জ্ববেব উদ্ভাপ ; পূর্ণ ও প্রবাহিত নাড়ী, মধ্যম বকম  
ক্রমিক, কিন্তু উপশমপ্রদ ঘর্ষ ;—জেলসিমিয়মের লক্ষণ । ( গ ) থাকিবা  
থাকিবা অস্থিরতা, নিদ্রা বাইবার ইচ্ছা কিন্তু স্নায়বীয়তা বশতঃ অনিদ্রা,  
অথবা মূহ মূহ বিভবিড়ে প্রলাপ ; প্রগাঢ় নিদ্রা ; হাঁটুতে বা উদবে অপ-  
বাকু তিনটাব সময় শীতেব আবস্ত, ঘর্ষশূন্য গাত্র, বা মধ্য মধ্য ক্ষণস্থায়ী  
ঘর্ষজ্বাব সংযুক্ত উদ্ভাপ ; গাত্রোন্মোচন প্রবৃত্তি, বক্ষঃস্থলেব অতিশয় বাতনা  
জ্বকেব কোন কোন স্থানের শীতলতা ও কোন কোন স্থানের উষ্ণতা, নাড়ীৰ  
ক্ষততা ও সবলতা, অথবা বোগী দুর্বল হইয়া পড়িলে নাড়ীৰ ত্বরিততা ও  
তারবৎ স্থলতা, সবিবামতা ও অপ্ৰাপ্যতা,—এপিসের লক্ষণ ।

**বিশেষ লক্ষণ ।**—নির্জনে থাকিবাব ইচ্ছা, কাণের উপবদিয়া মস্তক বেঠন করিয়া ঘেন একটা ফিতা বাধা রহিয়াছে একপ অমৃত্তব, পৃষ্ঠবংশের নিম্নদেশ হইতে পৃষ্ঠদিয়া করোটা হইয়া জিহ্বার অগ্রভাগে শীতের উপস্থিতি ; কম্পকালে চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে বলা ; উত্তাপাবস্থায় নিদ্রা ও দিড়বিড় করিয়া বকা ; শিবোঘ্নন, মস্তকেব পশ্চাদিক হইতে উহার আবস্ত ও তৎকালে একটা বস্ত্র ছইটাব জায় দেখা, একপার্শ্বে বোঁকা ; মস্তকে বেদনা । **হাস-বুদ্ধি ।**—আর্দ্র বায়ুতে ; ঝড়তুফান আসিবাব পূর্বে, হঃসংবাদ প্রবণে ; আকস্মিক মানসিক উত্তেগে, স্থিতির থাকিলে ও তামাক খাইলে বৃদ্ধি । ঠাণ্ডা ও খোলাবাতাসে উপশম । **জ্বরের সময় ।**—অপরাহ্ন ও সায়াল্ ; শীতশূন্ত জব পূর্নাহ্ন ১০টা ( গ্রাট-মিউ, ব্যাপ্ট ) । **জ্বরের প্রকৃতি ।**—প্রাত্যহিক, একদিন অন্তব, ঠিক নির্দিষ্ট সময় ( আবায়, সিড্রন, সাবাদ ) ; অন্নবিবাম অবের সবিরামে, বা সবিরামেব অন্নবিবামে পবির্ণতি ( শেষোক্তে ব্যাপ্ট, ইউপ, কুইন ও ) ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—পৃষ্ঠ দিয়া উপরের দিকে শীতের প্রধাবন অথবা পদে শীতের আবস্ত ও উদ্ধদিকে সম্প্রসারণ । কখন কখন ওবা অবসহকাবে প্রচুর মুত্রস্রাব ও সর্কশবীবে মৃষ্টবৎ বেদনা । শীতাবস্থায় তৃষ্ণাশূন্ততা । শীতাবসানে নিদ্রালুতা ( এপি ) । দীর্ঘস্থায়ী প্রবল তাপ ; মস্তকে ও মুখমণ্ডলে উত্তাপের আতিশয়া, স্নায়বীয় অস্থিরতা ; নিদ্রা বা অন্ধনিদ্রা ; শিশুর মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠা, এবং ঘেন পড়িয়া যাইবে এইকপ আতঙ্কে যাহা কাছে পায় তাহাই জড়িয়া ধরা, শিবোঘ্নন, আলোক ও শব্দে বিদ্বেষ ( বেল ) । প্রচুর ঘর্ষ, ঘর্ষস্রাবে বেদনাব উপশম ; মণিপূব প্রদেশে সর্সাপেক্ষা অধিক ঘন্য । অন্নক্ষণস্থায়ী বা নামমাত্র জ্বরের বিরাম অথবা একেবারেই বিচ্ছেদাভাব । বিবামকালে নোগীব পেশীর দুর্বলতা, স্নায়বীয়তা, কোপনতা ( খিটু খিটে তার ), শিরঃপীড়া ; তামাকের ধূমপানে সেই শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি ( ইগ্নে, ধূমপানে হাস,—আবে-নিয়া ) । ( জেলসিমিয়ম ও ইগ্নেশিয়ার প্রভেদ ইগ্নেশিয়ায় দ্রষ্টব্য ) । **অন্নবিরামজ্বর ।**—রাত্রি ছইপ্রহবেব সময় জ্বরের প্রকোপ ; প্রাতে জ্বরের অন্নবিরাম, প্রাবস্ত হইতেই পেশীর দুর্বলতা ও তজ্জন্ত উত্থান শক্তি-

হীনতা; মস্তকের সমুখ বা পশ্চাৎ ভাগে শিবঃপীড়া, মস্তক বৃহত্তর অল্প-  
 ভব, ক্ষীত বা আলোহিত সুখমণ্ডল; মুখে আঠা আঠা বা তিক্ত  
 আশ্বাদ; জিহ্বায় শ্বেত বা পীতবর্ণ লেপ; পূর্ণ, দ্রুত ও অনতিকটন নাড়ী।  
 শর্দিজ্বর।—শীতল বা আর্দ্র বায়ু সেবন অপবা উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ুর সহসা  
 আর্দ্র বায়ুতে পরিবর্তন বশতঃ জ্বর; পৃষ্ঠোপবি শীত, জ্বাৰন্তের পূর্বে  
 মস্তকের উত্তপ্ততা, পিপাসা, উৎকর্ষা ও অস্থিরতা পরিশৃঙ্খতা (পিপাসা,  
 অস্থিরতা, ও উৎকর্ষা—একন)। স্থিতিবতা ও গাত্র-গোবব; মস্তক শুষ্কতর  
 ও বহুতর অল্পব; মুখমণ্ডলের আবদ্ধতা, চক্ষুর সজলতা, নাসিকা  
 হইতে জলবৎ প্রেছা নিঃসরণ, অন্ন অন্ন খলা যাপা; বৃহৎ, পূর্ণ, দ্রুত, ও  
 অনতি কঠিন নাড়ী (ক্ষুদ্র, বটিন, দ্রুত, তাবৎ নাড়ী—একন); জ্বের  
 স্নানবিষম প্রকৃতি, এবং প্রত্যহ একইসময়ে প্রকোপ। সন্নিপাত জ্বর।  
 মানসিক শক্তির হ্রাস (ব্যাপ্ত), শারীরিক দুৰ্গততা বশতঃ অঙ্গকম্পন;  
 শিবোদয়ন ও অপবিচ্ছিন্ন দৃষ্টি, নিদ্রাজ্ঞতা ও শিবোদয়ন, অধিক পরিমাণে  
 জলবৎ প্রেছা নিঃসরণে উদ্বিগ্ন উপশয়, মস্তক, পৃষ্ঠ, ও হস্তপদাদিতে অসহ  
 বেদনা; মস্তিষ্কে আঘাতিত বৎ বেদনা, অক্ষিপুটের পক্ষাঘাত (কষ্ট),  
 জিহ্বা-কম্প, তজ্জন্ত উদ্বিগ্ন সহজে বাহির করিতে পাবা যাবনা (বেল, ল্যাক,  
 সিক), জিহ্বার অসাড়তা ও তজ্জন্ত কথা বলিতে না পাবা; শীতশীত  
 অভ্যুত, সমস্ত পেশীর দুৰ্গততা, স্নায়বীয় ব্যঞ্জন প্রাধান্য। (ব্যাপ্ত দ্রষ্টব্য)।

## জিহ্বা।

জ্বরের লক্ষণ।—সর্বিরামজ্বর।—সামান্য পৃষ্ঠে পুনঃ  
 পুনঃ কাণ; আন্তরিক উত্তাপ সহ অপরিত শীত শীত অল্পভব; অপবাহু  
 হইতে সামান্য পর্য্যন্ত কম্প, দিবাভাগে বরেকবান শীতাল্পভবসহ জ্বরের  
 আক্রমণ, অনন্তর সর্কষণীবে ঝলকে ঝলকে তাপের আবেশ; অঙ্গকম্প;  
 মূর্ছাকরতা; বক্তবহা নাড়ীর প্রবল দপদপ; মুখের শুষ্কতা ও উত্তপ্ততা;  
 অধিক পিপাসা, ব্যক্তিতে ঘর্ম, কখন কখন ঘর্মে অন্ন গন্ধ; দিবাভাগেও  
 ঘর্ম। মস্তিষ্কে উৎকট বেদনা ও প্রবল ক্রোধ লক্ষণাপন্ন সর্বিরামজ্বর।

সন্নিপাত জ্বর ।—\* মস্তিষ্কেব পক্ষাঘাতের আশঙ্কা, হস্ত-কম্প ও শীতল হস্তপদ সহকারে টঙ্কার; চৈতল্য পবিশৃঙ্খতা; শব্দার নিম্নদিকে সরিয়া যাওয়া; নিম্ন হস্ত অবনতি; মোমের তায় পাণ্ডুবর্ণ মুখাকৃতি; বারংবার অল্প হইতে অজ্ঞাতসারে বিবেচন, দ্রুত, ক্ষুদ্র, পর্যায়দোষবিশিষ্ট, প্রায় অপ্রাপ্য নাড়ী ।

## টারাক্সিকম ।

জ্বরের লক্ষণ ।—সর্বরোগ জ্বর ।—শিথোবেদনা সহকারে সর্বদশীবে ঈষৎ, বিচরণে শীতের আধিক্য, উপবেশনে হ্রাস। নাসাগ্র ও হস্তদ্বয়েব তুষাবণ শীতলতা। সপশনাবে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে তাপ; নিদ্রান্তে তাপ। গ্ৰীহা বেদনা ও সমস্ত বাদি হ্রাসকর প্রচুব ঘর্ষ, নিদ্রার প্রথমাবস্থায় ঘর্ষের আধিক্য। ঘন্থকালে তৃষ্ণা, ঘন্থে গাত্র কুট কুট করা। জ্বর সহকারে উদবেব উপসর্গ। জিহ্বাব মানচিত্রেব ত্রায় চিত্রিত আকৃতি। আহাব বা পানান্তে শীতাত্তব। বহুদ্রোগ সংঘট জ্বর। সন্নিপাত জ্বর ।—অস্থিরতা, স্থির হইয়া থাকিলে নিম্নাঙ্গে অসহ্য ছিন্নকব বেদনা, মস্তকেব পশ্চাত্তাগে প্রবল ছিন্নকব বেদনা, অবিবত মূহ (বিড়বিড়ে) প্রলাপ, আহাব বা পানান্তে অতিশয় শীতাত্তব, মানচিত্রেব ত্রায় চিত্রিত জিহ্বা। বাদ্রিকালে ছললকর প্রভূত ঘর্ষ এবং জিহ্বাব চিত্র-বিচিত্রতা এই ঔষধেব বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। চায়নাব ঘন্থন ত্রায় শবীৰ বস্ত্রাবৃত কবিলেই টাবাসিকমেব ঘর্ষ উদ্ভিক্ত হব না ।

## ডলকামারা ।

শীত ও বর্ষাকালে আজতাদি জনিত জবে ডলকামাবা ব্যবহৃত হয়। বার শীতল হইলে রোগেব বৃদ্ধি; সঞ্চরণে হ্রাস, ষ্টেন্সিকবিল্লী ও গ্রন্থির আধিক্য; এবং ঘর্ষ-রোধ ডলকামাবাব বিশেষ লক্ষণ। আরেণিয়াব সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। প্রভেদ এই যে, আবেণিয়াব অব ঠিক নির্ধাবিত সময়ে উপস্থিত হয়, ডলকামারাব জ্বর নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হয় না।



**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—গৃষ্ঠ হইতে উত্থিত বা মস্ত্যসাবিত, উত্তাপ প্রয়োগে অনুপশমিত, বেদনাসংযুক্ত শীত । সর্বদা ঘর্ষশূন্য জালাকর উত্তাপ (একন, আর্স, বাই), গৃষ্ঠে উত্তাপ ও জালা । তৃষ্ণাবিহীন, প্রলাপ সংযুক্ত উত্তাপ । দুর্গন্ধি ঘর্ষ (আর্গ, কার্বো-এন, সিলি) ; ঘর্ষাবস্থায় প্রভূত, পবিত্রাব মূত্রস্রাব । ঘর্ষাভাব । সূতিকাক জ্বর ।—অর্জিতা বা শীতলতা জনিত সূতিকা অব (ডলকা ১৮) ।

## ডিজিটেলিস ।

যে সকল বোলে হুৎপিণ্ড অক্রান্ত হয় এবং নাড়ীর অসমান বা সবিরাম গতি জন্মে তাহাতেই সাধাবণতঃ ডিজিটেলিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই ঔষধের লক্ষণ উষ্ণ গৃহে, শয়নে, ও সঞ্চালনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । নিবৃত্ত-বজ্রা-দিগে যে ঝলকে ঝলকে সহসা তাপাবেশ ও তৎপবে অতিশয় স্নায়বীয় দুর্বলতা ; এবং নড়িলে চড়িলে হৃদক্ৰিয়া যেন বিলুপ্ত হইবে এ প্রকার আশঙ্কা জন্মে (না নড়িলে হৃদক্ৰিয়া বিলুপ্ত হইবে একপ আশঙ্কা, জেলস) তাহাতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় । ডিজিটেলিসের পবে চায়না ব্যবহৃত হয় না ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—মূহ ও বিষমগতি নাড়ী । সামান্য সঞ্চালনে নাড়ীর মূহগতির ক্রততা প্রাপ্তি । অতিশয় মন্দ-গতি নাড়ী । অন্তবে শীত, বাহিবে তাপ । সহসা উত্তাপাবেশ ও তৎপবে অতিশয় দুর্বলতা । \* গাত্রের অতিশয় শীতলতা । \* হস্তপদের শীতলতা । শীতল, আঠা আঠা, প্রভূত ঘর্ষ । (আর্স, ক্যান্ফ, তিবাট) । সন্নিপাত জ্বর । বাতশ্লেষ্মা প্রধান-ধাতু, প্রসাবিত কনীনিকা, সম্পূর্ণ পবিচ্ছন্ন জিহ্বা, মূহ ও নিয়মিত নাড়ী, শক্তি-হ্রাস ; উদবোজ্জ্বল গুরুত্ব ও পৃষ্ঠ অমৃত্য ; বিষক্তি, বুকজালা, বমন, ভয় বর্ণের অতিসাব ; অগ্নিশূ, অতিশয় নিদ্রালুতা ।

## খুজা ।

শরীরে প্রমেহ বা মাষক দোষ থাকিলে জবে খুজা ব্যবহৃত হয় । তৃষ্ণা গহকাবে বা তৃষ্ণা ব্যতীত অন্তরে বাহিরে কম্প সংযুক্ত শীত ; পূর্ববর্তী উত্তা-

পাবনা ভিন্ন কেবল শরীরের অনাবৃত স্থানে ঘর্ষ, আবৃত স্থলের উত্তপ্ততা ও ঘর্ষশূন্যতা ; এবং তৈলাক্ত দুর্গন্ধি ঘর্ষ ;—এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ।

## নক্সভমিকা ।

শীতাবস্থা পূর্বে উত্তাপ, অথবা যুগপৎ শীতোত্তাপ, সর্বদা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও পৃষ্ঠে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, এবং বিরামকালে আমাশয়িক ও পৈতিক লক্ষণের প্রাবল্য বিশিষ্ট সবিবাম অব ; নাসিকা অবরুদ্ধতা, সমুদ্র, এবং নাসিকার পবিত্রতা ॥ স্রাবভাব লক্ষণাপন্ন শদি অব ; স্ত্রীলোকদিগের ঋতু পবিত্রতা অব ; এবং আমাশয়িক ও পৈতিক লক্ষণের প্রাবল্যবিশিষ্ট টাইফয়েড অব প্রভৃতিতে নক্সভমিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

সবিবাম অব্বে অনেক সময় লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে পূর্বে ইপিকাক ব্যবহার করিয়া তৎপরে নক্সভমিকা ব্যবহৃত কবিলে, অথবা প্রাতে ইপিকাক ও বৈকালে নক্সভমিকা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে । অব্যায়াম, অধিক অধ্যয়ন, রাত্রিজাগরণ, দীর্ঘকালব্যাপী আচ্ছাদের দোষ, অধিক দস্তা-যুক্ত দ্রব্য আহার, বা উত্তেজক পানীয় পান জনিত বোগে এই ঔষধের বিশেষ অধিকার দৃষ্ট হয় । গুরুদ্রব্য ভোজী, মাদকদ্রব্য সেবী, উগ্রপ্রকৃতি, কোপন স্বভাব, হিংসা-রেষপূর্ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী । নিদ্রা যাইবার কতিপয় ঘটিকা পূর্বে এই ঔষধ সেবন করিলে দিবসের অত্যন্ত সময় অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া ভালরূপে নিশ্চয় হয় । নিত্যন্ত আবশ্যক না হইলে প্রাতে অল্পকাল অবস্থায় নক্সভমিকা ব্যবহৃত হয় না । এলোপ্যাথি বা কবিরাজী চিকিৎসায় উষ্ণবীৰ্য্য ঔষধ ও মিশ্র ঔষধ সেবনের পবে কোন বোগী ব চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময় প্রথমেই নক্সভমিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

বিশেষ লক্ষণ ।—কুশ্বেদহ ; সর্কাজে উৎক্ষেপ ; সর্কাজে গুরুত্ব ; সায়াজে নিদ্রার আক্রমণ, শেষ রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ আবার প্রত্যুষে নিদ্রা, নিদ্রান্তে প্রাতে ক্লান্তি ও দুর্গন্ধতা ; অব্যাহত নিদ্রার পর রোগ-লক্ষণের উপশম ; বিকল মল-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট কোষ্ঠবদ্ধ ও বাববার অল্পমাত্র মল নিঃসরণ ।  
হ্রাস-বৃদ্ধি ।—মানসিক পরিশ্রমে, প্রাতঃকালে, আহাবান্তে, শঙ্কে, যত

স্পর্শে, ক্রোধে, অনারত বায়ুতে, ও গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধি । বলপূর্ক চাপিলে, সন্ধ্যাকালে, বিশ্রামে, নিদ্রায়, ও বর্ষাকালে হ্রাসপ্রাপ্তি । জ্বরের সময় ।—রাত্রি বা প্রাতঃকাল, পূর্বাঙ্ক ৬টা হইতে ৭টা, ১১টা; ১২টা, অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৯টা, সন্ধ্যা হইতে সাবাবাত্রি, (লাক, পদস, রস, পলিপ); অপরাহ্ন ৬টা হইতে ৭টা (শীতশূত্র অব) । জ্বরের প্রকৃতি ।—সর্বপ্রকার অব; একদিনান্তর পর্য্যায় অব; অগ্রগামী প্রাতঃকালীন অব (স্নাট-মিউ, নল্লভমিকাব ত্রায় শীতসহকারে সমাগত অগ্রগামী অব আস, চায়না, কুইনাইন, ব্রাইও, ইপিকাক প্রভৃতিও ব্যবস্থেয় হইতে পারে); অনিয়মিত অবস্থা ও অনির্দিষ্ট সময় বিশিষ্ট অব ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সনিরামজ্বর ।—অগ্রগামী প্রাতঃকালীন অব, অনিয়মিত সময়ে শীতের উপস্থিতি; শীতসহ অঙ্গ-বেদনা, জ্বন্তণ, তৃষ্ণাশূত্রতা, নখের নীলবর্ণ; তৎপরে পিপাসা, দীর্ঘতায় উত্তাপ, ও শব্দস্থলে স্ফূটী-বেধ, অল্প ঘর্ম; নিরামকালে আমাশয়িক ও পৈতিক লক্ষণের বিদ্যমানতা, জ্ঞানাব হ্রাসলতা ও অশ্রুতা অল্পতব; প্লীহা-বৃদ্ধিতে বেদনা । অপরাহ্নিক অব ।—অবের অনিয়মিত আবেশ; প্রথমে ঘর্ম, অনন্তর শীত, তৎপরে আবাব ঘর্ম, অথবা প্রথমে তাপ, অনন্তর শীত, কিম্বা বাহিবে উত্তাপ অন্তরে শীত, বা বাহিরে শীত অন্তরে উত্তাপ; অবিবত, এমনকি উত্তাপ ও ঘর্মাবস্থায়ও বস্ত্রাবৃত থাকিবার ইচ্ছা; শীতাবস্থায় হস্ত-পদ, স্বপ্ন ও মুখ-মণ্ডলের নীলবর্ণ; উত্তাপাবস্থায় হাত জালা, কাণ জালা, লোহিত মুত্র, মাধাধবা, কাণে গুণ্ণগুণ শব্দ, বৃক্ষে যাতনা, এবং মুখমণ্ডল ও মস্তকে উত্তাপ; শীত ও উত্তাপাবস্থায় গণ্ডুলের আবদ্ধতা, ও পিপাসা; ঘর্মাবস্থায় গায়ে শীতকার, প্রত্যেক বার নড়নে চড়নে শীত, শীত ও উত্তাপাবস্থায় উত্তমকপে শবীর আরত করিয়া রাখা । কঞ্জেষ্ট্রিভ চিল বা দূষিত সর্বিবাম অব ।—শিবোষ্মন, অস্বচ্ছন্দতা; প্রলাপ, উদবেগ ক্ষীততা, পার্শ্বে ও উদবে স্ফূটী-বেধ । সন্নিপাত জ্বর ।—টাইফয়েড অবের প্রথমাবস্থা; পৈতিক ও আমাশয়িক লক্ষণের প্রাধান্য, স্থখে তিক্ত বা লেহনং স্বাদ, জ্বিহ্বাব পীতভা, বিবমিষা, ক্লেশং হৃদিঘর্ষ বমন, পৈতিক অতিসার, উদবে জালা, অথবা কেবল আমাশয়ে যাতনা, উদববেদনা ও বাৎসবাব মন-প্রসূতি, অথচ অধিক মল নিঃসারবে

অসামর্থ্য ; কুহন ও কোষ্ঠবদ্ধ সহ আরক্ত ও স্বল্প মূত্র , বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াতিশয়া ; অনাবৃত বায়ুতে অতিশয় অম্লত্বাধিক্য , জলে অল্পটি সহ পিপাসা ; শয়নেব অতিশয় ইচ্ছা ও উহাতে উপশম ।

নক্সভমিকায় ও ত্রাটমিউরিয়োটিকমে প্রভেদঃ—(১) নক্সভমিকার অবের আবেশ ও অবস্থাত্রয় ঠিক নিয়মমত উপস্থিত হয় না ; ত্রাটমিউরিয়োটিকমে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হয় । (২) নক্সভমিকার অব আদিবান পূর্বে অঙ্গ-দৌর্বল্য , অঙ্গমর্দ , জৃম্বণ , খল্লী , গা কামড়ানি , কখন কখননা শীতের পূর্বে উত্তাপ ও ঘর্ম লক্ষণ থাকে ; ত্রাটমিউবে শীতো আতঙ্ক , গা মাটিনাটি , গাবমিবিমি , বমন , মথাধবা ও জল পিপাসাদি পূর্বে লক্ষণ থাকে । (৩) নক্সভমিকায় শীতাবস্থায় পিপাসা থাকেনা এবং গাহ আবৃত কবিলে বা উত্তাপ প্রয়োগে শীতের শাস্তি জন্মে না ; ত্রাটমিউব অব শীতে অধিক পরিমাণে বাবে বালে জল পান করিতে হয় এবং উষ্ণ গৃহে শীতের উপশম পড়ে । (৪) নক্সভমিকায় ঘর্মাবস্থায় তৃষ্ণা থাকেনা , এবং নড়িলে চড়িলে শীত কলে ; ত্রাটমিউতে ঘর্মাবস্থায় পিপাসা থাকে ও নড়িলে চড়িলে ঘর্ম নিঃসৃত হয় । (৫) নক্সভমিকার ঘর্ম অঙ্গ ও একাঙ্গীন , উহা শবীবের দক্ষিণ পার্শ্বে বা উপবর্দ্ধে জন্মে , এবং ঘর্মে অঙ্গ-বেদনা উপশমিত হয় ; ত্রাটমিউব ঘর্ম অধিক ও সর্বাঙ্গীন , তদ্বাং অত্যাগ বেদনার উপশম পড়ে বটে কিন্তু প্রলব শিরোবেদনার বিশেষ লাঘব জন্মে না । (৬) নক্সভমিকায় বোগীব মুখে তিক্ত বা দুর্গন্ধি আত্বাদ থাক , তজ্জন্ত বাব বাব মুখ ধুইতে হয় ; ত্রাটমিউর বোগীব মুখেব আত্বাদ তিক্ত বা লবণাক্ত থাকে ।

## নক্সমশ্চেটা ।

বোগেব সহিত নিদ্রালুতা ও তজ্জালুতাব বিদ্যমানতা নক্সমশ্চেটার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ । গর্ভবতী বা গুহ্যবাগুগ্রস্তা স্ত্রী ও বালকদিগেব রোগে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী । তজ্জালুতা বা মুচ্ছা-প্রবণতা , গাত্রের শীতলতা ও ঘর্মশূন্যতা . অর্জ ও শীতল বায়ুতে বোগেব বৃদ্ধি এবং বাহ্য উত্তাপে উপশম প্রাপ্তি নক্সমশ্চেটার বিশেষ লক্ষণ । একদিন বা দুইদিন অন্তর , একদিন

অল্প একদিন অধিক ; দুইদিন অল্প, একদিন বিরাম ; এইসকল প্রকৃতির  
জরে ইহা ব্যবহৃত হয় ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—নিদ্রাতৃণতা, জিহ্বা  
শুভ্রলেপ, খাসে ঝড়ঝড় শব্দ, কখন কখনবা রক্তাক্ত নিগীমন, উত্তাপাবস্থায় ও  
যৎসামান্য তৃষ্ণা, তন্দ্রালুতা সংযুক্ত ঘর্ম ও তখন অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা ।  
সন্নিপাত জ্বর ।—গাত্রে নীলাভ চিহ্ন ; শিবোঘ্বন সহ পৈশিক অস্তিরতা ;  
যৎসামান্য শ্রমাস্তে দুর্বলতা ও শয়নেব প্রবৃত্তি ; তন্দ্রালুতা ও অক্ষিপুটের  
পতন সহ শ্বস্নের ত্রায় অবস্থা ; অচলতা ও নির্দীপকতা বিশিষ্ট প্রগাঢ় তন্দ্রা-  
দোষ ; প্রলাপ ও হতবুদ্ধিতা ; তৃষ্ণাশূন্যতা সহ মুখ, জিহ্বা ও গলার পরি-  
শুদ্ধতা ; আমাশয়েব পূর্ণতা ও ক্ষুধাপরিশূন্যতা ; অল্প-কুঞ্জন ; পীতবর্ণ পাতলা  
অতিসার ; রক্তবর্ণ স্বর, পরিচ্ছন্ন মূত্র ।

## নাইট্রিক এসিড ।

পাবন, উপদংশ, বা গণ্ডমালা দোষগ্রস্ত ; যক্ষ্মদ্রোগগ্রস্ত ; এবং উদরামর-  
গ্রস্ত রোগীদিগের পুনাতন জরে এই ঔষধ সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।  
নাইট্রিক এসিড জাপক সবিরামজ্বর প্রতিদিন, অথবা একদিন পর একদিন,  
অপরাহ্নে বা সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হয় । ইহার লক্ষণ সাধারণে ও রাত্রিতে,  
সংস্পর্শে, বায়বীয় পরিবর্তনে, জাগরণে, বিচরণে, উপবিষ্টাবস্থা হইতে উত্থানে  
বিবর্জিত ; এবং শব্দটাবোহণে ও উদগারে উপশমিত হয় । টাইফয়েড জরে  
পেয়ারাখ্যাগ্রস্থি কত জন্মিতে আরম্ভ হইলে নাইট্রিক এসিড ব্যবহৃত হয় ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—অপরাহ্নে, অনাবৃত  
বায়ুতে শীত, তৎপরে শয়িতাবস্থায় শুষ্ক উত্তাপ, তৎসহকারে নিদ্রাহীনতা ও  
অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় মনে নানাপ্রকার কল্পনার উদয় ; কেবল প্রাতঃকালের  
প্রাকালে ঘর্ম ও নিদ্রা । সন্নিপাত জ্বর ।—\* উজ্জল লোহিতবর্ণ সান্নি-  
পাতিক রক্তস্রাব, অসংযত রক্ত ও সংযত অণ্ডলাল ; জিহ্বার প্রগাঢ় আর-  
ক্ততা, ও মধুমলেব ত্রায় একপ্রকার দর্শন ; উদরে স্পর্শ-দেষ ও রক্তাক্ত  
অতিসার, দুর্গন্ধি মূত্র ; গাত্র-জালা ; অল্প হইতে রক্তস্রাব ; অল্পে কত ও

উদরে গড় গড় শব্দ, প্রচণ্ড প্রলাপ ও শয্যা হইতে উঠিয়া যাওয়া, ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাস ও শ্বাস সহকারে কুসকুসেব প্রাদাহিক রোগ ; ঈষৎকপিশ-বর্ণ, রক্তাক্ত নিম্নবন ও অনিষ্মিত নাড়ী, অথবা দ্রুত, কঠিন নাড়ী ও তৎসহ শ্বাস-বোধ ; অবসন্নতা, উদাসীনতা ; হতবুদ্ধিতা ও তৎসহ চকিত প্রমত্ত দৃষ্টি, বদ্বিবতা, অতিশয় দুর্বলতা, ও কম্পন ; সামান্য সঞ্চালনে মুচ্ছা, শীতলপদ ।

## শ্রাট্‌মিউনিয়োটিকম ।

আমেরিক চিকিৎসকেরা সবিবামজরে শ্রাট্‌মিউনিয়োটিকমের অত্যন্ত প্রশংসা করেন। ডাঃ মিচেল বলেন যে পূর্বে তিনি কেবল পুৰাতন জরে ও কুইনাইন সেবনের পববর্তী জ্বরেই এই ঔষধ ব্যবহার কবিতেন, এক্ষণে তাঁহার বিশ্বাস যে তরুণ জবেও এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। ঐক্যাহিক জ্বরে শ্রাট্‌মিউনিয়োটিকম তিনি অতিশয় ফলপ্রসন্ন মনে করেন। অতিশয় ঘর্ম ও শীতাবস্থায় পিপাসা তাঁহার মতে ইহার প্রধান প্রয়োগ লক্ষণ। ডাঃ ডনহাম বলেন যে প্রাতে জ্বরের পূর্ব, প্রবল ও সম্যক আবেগ এবং তীব্র শীত ; অনন্তর সমুখ কপালে শিথিলতা, আবদ্ধ মুখমণ্ডল, ও উগ্র উদ্ভাপাবস্থা ; পবিশেষে সন্ধ্যাকালে ঘর্ম শ্রাট্‌মিউনিয়োটিকম লক্ষণ। ডাঃ বাব পুৰাতন জ্বরে ধূস্রবাত পীতবর্ণ আকৃতি লক্ষণে এবং গ্ৰীহা ও যকৃতের বিবর্জনে এই ঔষধ ব্যবহার কবিতে বিধি দেন। ইহা জ্বরের সময় প্রযুক্ত্য নহে, বিবামকালেই ব্যবস্থেয়। জ্বরে ইহার ত্রিংশ বা তদূর্দ্ধ ক্রমে যেকুপ উপকার দর্শে, নিয়ক্রমে সেরূপ নহে। পুৰাতন জ্বরে এই ঔষধ অল্প অল্পকর্ত্তী ঔষধ ব্যতীত সচরাচর পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা বিধেয় নহে। পূর্ক্সাহ ১১টার সময় জ্বব আসিলেই শ্রাট্‌মিউনিয়োটিকম সাধারণতঃ ব্যবস্থেয় হয়, কিন্তু অল্প সময়ে জ্বব আসিলে অথচ জ্বরের লক্ষণের সাহিত এই ঔষধের সম্যক সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা অব্যবস্থেয় নহে। অনুপ স্থানে ও নবকর্ষিত স্থানে বাস জনিত ম্যালেরিয়া জ্বরেই ইহার বিশেষ অধিকার। ডাঃ ফ্যাবিংটন বলেন যে পূর্ক্সাহ ১০।১১ টার মধ্যে শীতাবস্থার আবির্ভাব ; শ্বাস বা পায় শীতের আরম্ভ ; শীতাবস্থায় কখন কখন পিপাসা, এবং সর্কশরীরে বেদনা ; কখনও বা শীতপিত্তের প্রকাশ ;

সাধারণতঃ উত্তাপাবস্থার প্রাবল্য, উত্তাপ সহকারে পিপাসাব আধিক্য ; শিরঃপীড়ার ক্রমশঃ অধিকতর দপদপকবতা ; এবং মস্তিষ্কে এই রক্তসঞ্চয়ের উগ্রতাবশতঃ সময়ে সময়ে রোগীর প্রশ্রাব ; ক্রমে ক্রমে প্রভূত বর্ষাশ্রাব এবং বর্ষনিঃসরণে শিরঃপীড়া ও অন্ত্রাল লক্ষণেব উপশম ; এই সকল লক্ষণে সন্নিবাহিত জ্ববে শ্রাট-মিউ ফলপ্রসূ । বিলেপীজ্বর বা ক্ষয়রোগের আলুপসিক শীত পূর্বাঙ্ক ১০টার সময় উপস্থিত হইলে ঠানব ব্যা-স্বেষ, শ্রাটমিউরিয়েটিকম নহে । কুইনাইন অপব্যবহারেব পববর্তী, প্লীহাযকৃতাদি উপসর্গ সংযুক্ত পুৰাতন জ্ববে এপিসেব লক্ষণের সহিত শ্রাট-মিউর লক্ষণের সাদৃশ্য দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু প্রভেদ এই যে এপিসেব জ্বর অপরাহ্ন ৩টার সময়, এবং শ্রাট-মিউর জ্বব পূর্বাঙ্ক ১০টার সময় প্রকাশ পায় । এপিসের পূর্বে ও পরে শ্রাট-মিউ ব্যবহার করিলে ইহার উত্তম ক্রিয়া দর্শে ।

**বিশেষ লক্ষণ ।**—অত্যন্ত শীর্ণতা, অশ্রাব, কাসিলে চক্ষুদিয়া জল পড়া, কোষ্ঠবদ্ধ, মলদ্বার সঙ্কুচিত অন্ত্রভব, মলত্যাগের পর মলদ্বার জ্বালা ও ছিন্নবৎ অন্ত্রভব . হাঁটিতে, হাঁটিতে, বা কাসিতে অনিচ্ছায় মুত্র নিঃসরণ, শ্রোতে জাগিবামাত্র অতিশয় শিরঃপীড়া, রুটিতে অকচি ও লবণে স্পৃহা ; দম্বাত্তর বিষয়ক স্বপ্ন । **হ্রাস-বৃদ্ধি ।**—পূর্বাঙ্ক ১০।১১ টাব সময় ; অগ্নির বা বোদ্রের উত্তাপে, শয়নে, শ্রমে, কথনে, লেখনে ও পঠনে বৃদ্ধি ; অগ্রগামী জ্ববেব পূর্বাঙ্কে ৩ দিবসে বৃদ্ধি । বাহিরেব বাতাসে, শীতল জলে নানে ; উপবেশনে ; ও উপবাসে হ্রাস । **জ্বরের সময় ।**—পূর্বাঙ্ক ১০।১১ টার সময় ; রাত্রি ৩টা হইতে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত । **জ্বরের প্রকৃতি ।**—সকল প্রকৃতির বিষমজ্বব ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—**শীত ।**—পূর্বাঙ্ক ১০।১১ টার সময় প্রবল শীত, শীতসহকারে অতিশয় পিপাসা, জ্বরের সকল অবস্থায়ই পিপাসাব বিদ্যমানতা, প্রধানতঃ অন্ত্রবে শীত, হাত পা ববফের স্তায় শীতল, পায় বা মাজায় শীতেব আবস্ত, তৎসহ নথেন নীলবর্ণ, পিপাসা, বিদীর্ণকর শিরঃপীড়া, বিবনিষা, কখন কখন অচৈতন্য । কখন কখনবা শীতের পূর্বে ঐতিনিয়ত বমন, ও শীতাবস্থায় অতিশয় পিপাসা, কিন্তু শীতল জল পান নদিবাব অলক্ষণ পবেই বমন ইইয়া উহার পতন । **উত্তাপ ।**—\* বিবর্জিত

শিবঃপীড়া সহ তাপ ও বারম্বার অধিক পরিমাণে জলপানের কৃপা ; অচৈতন্য বা দৃষ্টির অপরিস্ফুটতা, ও মূৰ্ছাকল্পতা ; অবকালীন ওষ্ঠে মুক্তাব ত্রায় ফোফা ; মুখের কোণে ক্ষত । ঘর্ম্ম ।—প্রচুর ঘর্ম্ম ; ঘর্মে শিবঃপীড়া ভিন্ন অশ্রাব উপসর্গের হ্রাস । বিরাম ।—বিরামকালে বন্ধতে স্ফূর্তি-বেদ, অতিশয় আলস্য, শীর্ণতা, মলিন মুখাকৃতি ; আবিল মুহ, মুখে গোহিতবর্ণ বেণু ; ক্ষুধাহীনতা ; \* ওষ্ঠে অব-ক্ষেটি ( অব-চুঁঠা ) ( ইথে, নল্ল, রস ) ।

ন্যাট্রিমি উবিয়োটিকম ও আর্সেনিকে প্রভেদ :—(ক) ন্যাট্রিমি মিউ-  
রিয়োটিকমের জ্ববে (১) প্রাতে ও দিনে বৃদ্ধি (২) শিবঃ পীড়ার শীতে আবন্ত,  
তাপে বৃদ্ধি ও অধিক ঘর্ম্মশ্রাবেন কিঞ্চিৎ উপশম ; (৩) জ্ববের সকল অবস্থায়ই  
পিপাসাব বিদ্যমানতা ; অধিক পরিমাণে বাবে বাবে জলপান ; এবং তাহাতে  
পিপাসাব শান্তি, (৪) ক্ষুধামন্দা ; (৫) ওষ্ঠে অব-চুঁঠা ; এই সকল লক্ষণ থাকে ।  
(খ) আর্সেনিকের জ্ববে (১) বৈকালে ও রাত্রিতে বৃদ্ধি ; (২) জল সহকায়ে  
শিবঃপীড়ার আবন্ত, ও ঘর্ম্মশ্রাবের অনেককাল পর পর্যন্ত উহাব বিদ্যমানতা ;  
(৩) শীত ও উত্তাপাবস্থায় বাল্যবাবে কিন্তু অল্প অল্প ; এবং ঘর্ম্মাবস্থায় অধিক  
পরিমাণে জল পান, (৪) ক্ষুধা, (৫) ওষ্ঠেব শুষ্কতা ও ফাটা ; এইসকল  
লক্ষণ থাকে ।

যদি শিবোবর্ণন, শিবঃপীড়া, ও ছর্কলতাদি জ্ববের উপসর্গ ন্যাট্রিমি উবি-  
য়োটিকম ব্যবহাবেও সম্যক আবেগা না হয় তবে নল্লভমিকা সেবনে উপকার  
দর্শে । নল্লভমিকা ও ন্যাট্রিমি উবিয়োটিকমেব প্রভেদ নল্লভমিকায় দ্রষ্টব্য ।

## পডফিল্ম ।

ডাঃ উইলিয়ামসন বলেন যে সাধারণ বা প্রত্যয়ে শীত, শীতের পূর্বে পৃষ্ঠ-  
বেদনা এবং তৎনহ কুক্ষিদেবে প্রচাপন, ও শাপার সন্ধিতে বেদনা, শীত  
না বাইতে বাইতে উত্তাপাবস্থার অগমন ; প্রলাপ, বাবদূকতা, প্রবল শিবো-  
বেদনা, ও ক্ষুধাহীনতা সহ অতিশয় পিপাসা, এবং ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রা,—এই  
সকল লক্ষণে সনিরাম, স্নায়-নিরাম, ও সন্নিপাত জ্ববে পডফিল্ম ফলপ্রদ ।

কোষ্ঠবদ্ধ ও দক্ষিণাজ্ঞের উপসর্গ সংবৃত্ত জ্ববে ইহার বিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট



হয়। শীতাবস্থায় ও তাপাবস্থায় কতকক্ষণ পর্য্যন্ত বাবদুকতা ও পরে সেই সকল কথা বিস্মরণ পডফিলমের একটি বিশেষ লক্ষণ। উত্তাপাবস্থায় চরম নীমায় নিদ্রাবস্ত হইয়া ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রিত থাকে। ইহাবস্থায় একটি ব্যবস্থালক্ষণ। এই লক্ষণটী এপিসেও আছে। কিন্তু এপিসে ঘর্ম্মাবস্থায় গাত্রের শীতপিত্ত প্রকাশ পায় এবং পডফিলমেব ভায় এত অধিক ঘর্ম্ম থাকেনা। এই ঔষধের সবিরাম জ্বর সাধাবণতঃ পূর্ক্কাৎ ৭টাব সময়েই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাব লক্ষণ প্রত্যুষে ও গ্রীষ্মকালে বর্দ্ধিত, এবং শম্ম্যাকালে, বাহ্যিক উত্তাপে, ও চাপ প্রদানে উপশমিত হয়।

**জ্বরের লক্ষণ।**—সবিরাম জ্বর।—শীতাবস্থায় অতিশয় বাবদুকতা এবং উত্তাপাবস্থায় প্রগাঢ় নিদ্রা; \* আমাশয়িক লক্ষণেব প্রাবল্য; শীতের পূর্ক্বে কটিতে তীব্র বেদনা, কিন্তু শীতাবস্থায় সেই বেদনাব অবিদ্যমানতা, সামান্য শীত, শীতাবস্থায়ই উত্তাপের আবস্ত, শীতাবস্থায় পিপাসাশূন্যতা; উত্তাপাবস্থায় অতিশয় পিপাসা, উত্তাপাবস্থায় নিদ্রা, ও প্রচুর ঘর্ম্মস্রাব; জিহ্বাব মলিনতা ও শুভ্র নেপাচ্ছন্নতা, নিখাসে দুর্গন্ধ; মুখে বিষাদ; সম্পূর্ণ ক্ষুধাহীনতা, গণ্ঠ্যেব গন্ধে পর্য্যন্ত ঘৃণাব উদ্বেক; প্রচুর লালা নিঃসরণ; কোষ্ঠবদ্ধ বা উদবাসা। স্বল্পবিরাম জ্বর।—পৈত্তিক স্বল্পবিরাম জ্বর। শীতের পূর্ক্বে কটিবেদনা; উত্তাপাবস্থায় প্রলাপ, বাবদুকতা, ও নিদ্রা, এবং তৎপরে সেই সকল কথা বিস্মরণ, উত্তাপাবস্থায় প্রবণ শিবঃপীড়া, ও অন্ত্যস্ত পিপাসা, ত্বক্বেব লালগাম্ভীর্য, পর্য্যায়ক্রমে শিবঃপীড়া ও অতিসার; মুখে পচা আশ্বাদ; বহুদেশে পূর্ণতা ও মোচড়ান বেদনা, পৈত্তিক মল।

## পলমেটিল।

পলমেটিল প্রয়োগেব বিশেষ প্রকৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ বিনীত স্বভাব ও অশ্রাবপ্রবণ ব্যক্তিদিগেব জ্বরে আমাশয়ের ও অশ্রবে লক্ষণ এবং হরিৎপাণ্ডু বিদ্যমান থাকিলে ও যাবাহে জবেব আবেণ উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ইহাব পবে কখন কখন ইংলেশিয়া ব্যবস্থা করা আবশ্যকীয় হয়। পলমেটিলান জ্বর-লক্ষণ সচবাচব বিমিশ্রিত থাকে, অর্থাৎ

শীতের পবে অতি শীত উতাপাবস্থা উপস্থিত হয়, অথবা একই সময়ে শীত ও তাপাবস্থা শরীরেব ভিন্ন ভিন্ন অংশে বা পার্শ্বে প্রকাশ পায়। শীতের পবে উতাপ যদি কেন্দ্র বোগীর নিকটই অনুভূত হয়, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ না পায় তবে পলসেটিলাব জ্বরে পিপাসা থাকে না; আর অন্তর বাহির উভয়ই বিদ্যমান থাকিলে পিপাসা থাকে। পিপাসাশীলতা পলসেটিলাব একটা বিশেষ লক্ষণ বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত ব্যতিক্রমেব প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। পলসেটিলাব ঘর্ম প্রবাহই শরীরেব একপার্শ্বে হইয়া থাকে। বামপার্শ্বে পলসেটিলাব লক্ষণ সমধিক প্রকাশিত হয়। বামা ও বালকদিগেব বোগেই এই ঔষধ বিশেষ ব্যবহৃত হয়। বোগেব লক্ষণেব পবিত্তনশীলতা এই ঔষধেব প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণ। বোগীর মানসিক লক্ষণেব পবিত্তনশীলতা; অথবা জ্বরেব লক্ষণেব পবিত্তনশীলতা থাকিলে অর্থাৎ দুই পালাব জ্বর ঠিক একরূপ লক্ষণাপন্ন না হইলে পলসেটিলা ব্যবস্থা করা যায়। কুইনাইন অপব্যবহারেব পবিত্তী সবিরাম জ্বরে মুখের তিক্ত আস্বাদ অথচ জিহ্বার পনিচ্ছন্নতা; যৎসামান্য আনাশয়িক বিশৃঙ্খলায় জ্বরে পুনরাক্রমণ; এবং স্ত্রীলোকদিগেব রজোবিলোপ বা বজ্রোবৈলক্ষণ্য লক্ষণে পলসেটিলা উপকারী। ডাঃ ফ্যাবিংটন বলেন যে কুইনাইন অপব্যবহৃত জ্বরে অপরূহ দুই তিনটাব সময় পিপাসা; তৎপবে তৃষ্ণাশূন্য শীত, এবং বক্ষঃস্থলে শৈবিক বক্তনক্ষয় বশতঃ উৎকর্ষা ও গুরুত্ব অনুভব; নিদ্রার আবল্য অথচ নিদ্রা বাইতে অশক্তি; কখনওবা এক হস্তের উত্তপ্ততা, ও অপর হস্তেব শীতলতা পলসেটিলাব লক্ষণ। গর্ভাবস্থার জ্বরে গর্ভজীবের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে অথবা সূতিকার জ্বরে লক্ষণেব সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। পলসেটিলাব লক্ষণ এক দিন অস্ত্র, সারাহে ও বাত্মিতে, শরনে বা উপবেশনে বৃদ্ধিত; এবং অনানুত বায়ুতে, ও শীতল গৃহে উপশমিত হয়।

**জ্বরেব লক্ষণ।**—সবিরামজ্বর।—জ্বরেব আবেশের পূর্বে সমস্তদিন তন্দ্রালুতা, আময়্য অতিসার। অপরূহ চারিটার সময় শীত; শীতাবস্থায় তৃষ্ণাশূন্যতা; উৎকর্ষা, ও স্বাস-কষ্ট; শীত উপস্থিত হইবার সময় স্নেহা বমন; হেণা সেথা, স্থানে স্থানে শীত, অবশতা সহ একপার্শ্বিক শীত; বদন বা এক হাতের উতাপ, অথ হাতের শীতলতা; দেহ উত্তপ্ত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

শীতল ; আভ্যন্তরিক শুষ্ক উত্তাপ, বাহ্যিক উত্তাপ পরিশূন্যতা ; প্রসব-বেদনার  
 জ্ঞান বেদনা, নিদ্রালুতা, নিদ্রাকর্ষণে চমকিত হইয়া উঠা । একপার্শ্বিক ঘর্ষ,  
 কেবল বদন ও মস্তকে ঘর্ষ, বাত্রিতে ও প্রাতে ঘর্ষের আধিক্য, জাগরণান্তে  
 সম্ভব ঘর্ষের বিবর্তি । ঘর্ষাবস্থায় ঘুমে কথা বলা । জ্বরের বিচ্ছেদকালে  
 শিরঃপীড়া, শীত শীত অনুভব, স্নায়বীৰ্য্য অতিসাব, বিবর্মিষা, ও ক্ষুধাহীনতা ;  
 বিবর্জিত প্ৰীতি ; বজ্রোলোপ বা রজ্জোবৈলক্ষণ্য । ত্র্যাহিক জ্বর ।—অনেক  
 ক্ষণস্থায়ী শীত, বৎসামাত্র উত্তাপ, ও স্নিপাসাশূন্যতা ; জ্বরের সকল অবস্থা  
 অস্পষ্ট নহে, প্রায়ই এক অবস্থার সহিত অল্প অবস্থার মিলন, উত্তাপাবস্থার  
 প্রাবল্য থাকিলে স্নিপাসাব বিদ্যমানতা । সন্নিপাত জ্বর ।—প্রথমাবস্থায়  
 শীতের প্রাবল্য ও ক্ষুধাহীনতা পরিশূন্যতা ; মুখের বিবসতা, গুল্মজিহ্বা, বিব-  
 মিষা, স্লেষ্মাময় বমন, ও আনমন বিবেচন, বিবেচনের পূর্বে অঙ্গকূজন,  
 চিমটিকাটাব জ্ঞান বেদনা, ও বাত্রিতে উহার বৃদ্ধি, এবং খিটখিটে ও বিমর্ষ  
 ভাব ; বাহ্য উত্তাপ অসহ্য, অথচ গাত্রাবরণ ফেলিলে তৎক্ষণাৎ শীতানুভব ;  
 শরীরের কেবল একপার্শ্বে উত্তাপ, অথবা একপার্শ্বে উত্তাপ অন্তপার্শ্বে শীতলতা,  
 বা একপার্শ্বে ঘর্ষ ; কথা বলিবার সময় যথোপযুক্ত শব্দ ব্যবহারে অতিশয়  
 আয়াস ; একইপ্রকার মনোভাব, শিরোবুর্গন ও আলোকে বিবেচ্য সহকারে  
 শিরোগোবব ; কৰ্ম্মানিকা প্রথম সঙ্কুচিত, তৎপরে প্রসারিত, বধিবতা ;  
 জিহ্বা দক্ষবৎ পলিগুক্ত অথচ তৃষ্ণাশূন্যতা, মুখ হইতে পচা গন্ধ নিঃসরণ ;  
 তন্দ্রালুতা, প্রণাপ, ভয়ঙ্কর আবাস্তব বস্তু দর্শন, অস্থিভতা, শব্দায় এপাশ  
 ওপাশ করা, এবং উত্তাপবশতঃ আবরণস্বত্ব ফেলিয়া দেওয়া, কম্প, দুর্দ্বগতা  
 ও সর্কাস্বেব গৌরব ; বাত্রিতে শব্দায় অজ্ঞাতসারে পাঠলা মল নিঃসরণ ।

## পলিপোরস ।

প্রচুর পরিমাণে কুইনাইন ও অজ্ঞাত জরদ্র ঔষধ ব্যবহারের পরবর্তী  
 অধিক দিনের পুষ্কাতন জ্বরে পলিপোরস বিশেষ ফলপ্রদ । প্রাত্যহিক সবি-  
 রাম জ্বরেও ইহা উপকারী ; কিন্তু শবৎকালের জ্বরে এই ঔষধে অধিক ক্রিয়া  
 নশে না । বসন্ত, হেমন্ত ও গ্রীষ্মকালেব জ্বরেই ইহা সমধিক ফলপ্রদ ।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পৈত্তিক স্বল্প-বিরাম জ্বরেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় ।  
সবিরাম জ্বরে অতিশয় আলস্য ; মস্তকে রক্তসঞ্চয় ও শিবোদ্বৃণন ; বদনের  
উত্তপ্ততা, আরক্ততা, ও উহার সর্বত্র কণ্টক-বেধ অনুভব ; পৃষ্ঠে ও অঙ্গ-  
প্রত্যঙ্গে বেদনাসহকারে শীত ; তীব্র শীতানুভব, উষ্ণ হইতে অশক্তি ।  
উত্তাপ, উত্তাপাবস্থায় শিবোবেদনা, মুখমণ্ডলের আরক্ত রাগ, নড়িতে চড়িতে  
অপ্রবৃত্তি, তাপাবেশের অবসানে জড়তা ও অবশতা অনুভব ; সাধাবণতঃ  
উত্তাপাবস্থার অধিকক্ষণ স্থিতি ও তৎপবে অগ্রচূৰ ঘন্যপ্রাব ; \* কদাচিত্  
পিপাসা । বিরামকালে যকৃৎ ও উদরের অভ্যন্তরস্থ মস্ত্রেব অস্বাধিক কিয়া-  
বৈলক্ষণ্য, ও ত্বকেব পাণ্ডুবর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, মূহ শিবঃপীড়া, অতিশয় আলস্য ;  
ক্ষুধাহীনতা বা কুকুবৎ ঘন ঘন ক্ষুধা ; বিরামকালের স্বপ্নতা ;—এই সকল  
লক্ষণে পলিপোরস ব্যবহৃত হয় ।

## পেট্রোলিয়ম ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—সর্গশরীরেব ত্বকে তীব্র  
কণ্ডূরন, তৎপবে অতিশয় শীত ও প্রবল কম্প, হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডলের অত্যন্ত  
শীতলতা ; শীতান্তে সাধাঞ্চে উত্তাপ, তৎসহকারে পদদ্বয়েব শীতলতা ; শীতের  
অব্যবহিত পরে প্রভূত ঘন্য ; অথবা বাত্রিতে ঘন্য । সন্নিপাত জ্বর ।—  
মূহ প্রলাপ সংযুক্ত টাইফয়েড অব । প্রলাপ কালে রোগী আপনাকে যুগল  
মনে করে, যথা একখানি পা তাহার নিকট হইখানি বোধ হয়, অথবা কেহ  
যেন তাহার সহিত এক শয্যায শুইয়া আছে সে একপ অনুমান কবে ।

## প্লাণ্টেগো ।

কুইনাইন বা অক্কায়া জ্বর ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে যে সবিরাম অব দূরীভূত  
হয়না ; অথচ পুৰাতন আকার ধারণ করিয়া অনেক দিন থাকে এবং প্রত্যহ,  
অথবা দুই, তিন, চারি, সাত, বা চৌদ্দদিন অন্তর নিয়মিতরূপে দিবাভাগে

উপস্থিত হয়, তাহাতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেবল দিবসে  
জ্বরের প্রকাশ ও জ্বৰকালে মূত্রাণবের মুখাবরক-পেশীর শিথিলতা ইহার  
বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

## ফসফরিক এসিড ।

চিত্তের ঔদাস্ত এবং শবাব ও মনের নিশ্চেষ্টতা বিশিষ্ট দৌৰ্ব্বল্য এই  
ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ। মুখমণ্ডল ও নখনের আরক্ততা থাকিলে এই  
ঔষধ অব্যবহৃত। অল্পকট টাইফয়েড অবৈ জ্বৰে মূলকাৰণ যে বিবাক্ত  
পদার্থ তদ্বা রক্ত অপেক্ষা স্নায়ুগুণ অধিক আক্রান্ত হইলে ফসফরিক এসিড  
ব্যবহৃত হয়। অতি ঘৰ্ম বিশিষ্ট বিষম জ্বৰেও ইহা আবোগ্যকর।

**জ্বরের লক্ষণ।**—সবিরাম জ্বর।—সর্বশরীরে সৰু সৰু  
শীত, হস্তাঙ্গুলীর বরফের তায় শীতলতা, শীতাবস্থায় পিপাসাশূন্যতা। তৎ-  
পরে উত্তাপ, উত্তাপাবস্থানও তৃষ্ণাহীনতা; অথবা অট্টেতত্ত্বকর অত্যন্ত  
উত্তাপ। হৃৎকলকর প্রভূত ঘৰ্ম; কেবল ঘৰ্মাবস্থায় পিপাসা (চায়না, ঘৰ্মান্তে  
পিপাসা, লাইকো)। সন্নিপাত জ্বর।—সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য; কথাবলিতে  
অনিচ্ছা; কিছু জিজ্ঞাসা করিলে হাঁ বা না বলিয়া আস্তে আস্তে উত্তরদান,  
(আলাপ-প্রবৃত্তি হ্রাস); মূহ প্রলাপ; \*নাসা-রব-পবিশূন্য, নিদ্রাভিত্তবৎ  
জ্ঞানশূন্যতা, কিন্তু জাগরিত হইলেই আবার সম্যক জ্ঞানের সঞ্চার; উদ্রিয়া  
বলিলে শিরোধূর্ন বশতঃ পতন; লাণ্যশূন্য কাচবৎ চক্ষু, চক্ষুর চারিদিকে  
নীলবর্ণ মণ্ডল; হিব-দৃষ্টি; হৃদ্বাগ্র নাসিকা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব;  
নাসিকা-রক্তে অঙ্গুলী-প্রবেশ; প্রতি ক্ষীণতা, অথবা স্নায়বীয় বধিরতা; হত-  
বুদ্ধিবৎ মুখাকৃতি; জিহ্বা ও ওষ্ঠের পাত্তবর্ণ; মুখে ও জিহ্বায় আঠাআঠা,  
হৃৎশ্বেদ্য স্লেষ্মা; উদরাগ্নান ও \* অতিশয় অল্প-কুজন; বেদনামূল্য জলবৎ ধূম-  
রাত অতিসার, বা অনৈচ্ছিক মলস্রাব; অণ্ডলালসয় হৃৎকাকার মূত্র; অতিশয়  
হৃৎকলতা; পাণ্ডুর, লোলিত স্বক; কালিমা, যে সকল স্থানে ভরদিয়া শয়ন  
করাযায় তথায় নীলাভ লোহিতবর্ণ চিহ্ন, গাত্র-তাপের অল্পগ্রতা, অবিরত  
আঠাআঠা বা প্রভূত ঘৰ্ম, মুখমণ্ডল, হস্ত, ও পাক্ষণবের উপর শীতল ঘৰ্ম;  
হৃৎকল, ক্ষুদ্র, দ্রুত, ও পর্য্যাপ্তশীল নাড়ী।

## ফসফরাস ।

ফসফরাসের লক্ষণে কোথাও সামর্থ্য বা জীবনীশক্তির বিবর্তনের নিদর্শন অথবা শারীরিক ক্রিয়ার বাস্তবিক উত্তেজনা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু কেবল আর্সেনিকের লক্ষণের ছায় উপদাহশীল ছর্ব্বলতাই দেখা যায়। দীর্ঘ ও ক্ষীণকায় ব্যক্তিদিগের বোম্বাই ফসফরাস বিশেষ উপযোগী। সবিরাম জ্বর অবিরাম জ্ববে, অথবা অবিরাম জ্বর সবিরাম জ্ববে পরিণত হইলেও ইহা খাটে। সন্নিপাত-দোষে মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশের অবসন্নতা লক্ষণে সন্নিপাত জ্বরে ফসফরাস ব্যবহৃত হয়। ইহাব লক্ষণ দুই প্রহর ব্যত্ৰিব পূর্বে; ঝড় বৃষ্টিব সময়; বামপার্শ্বে বা চিৎ হইয়া শয়নে বর্জিত; এবং অন্ধকায়ে; নিদ্রান্তে, শীতল দ্রব্য আহায়ে, ও ঘর্ষণে উপশমিত হয়।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর।—বাহ্যিতে উত্তাপ, আমাশয়ে উত্তাপেণ আবন্ত, মুর্ছাবৎ ছর্ব্বলতা ও ক্ষুধা; তৎপরে শীত, শীতের পব আভ্যন্তরিক উত্তাপ, বিশেষতঃ হাতে, কিন্তু বাহ্যিক শীতলতা, পিপাসাহীনতা। সন্নিপাত জ্বর।—দ্বিতীয়াবস্থা অবসানের প্রাকালে ফসফরাসের বক্তব্য, অথবা যুক্তের ছায়া নিবেটতা প্রাপ্তি, এবং তৎসহ যাতনা ও উৎকর্ষা; বন্ধঃস্থলের অশিথিলতা সহ কঠিন, শুষ্ক কাস; অথবা তবল, ঘড় ঘড় শব্দ সংযুক্ত, হৃষ্টেদা, স্বচ্ছ, বা গাঢ়, ঈষৎ পীত বা ঈষৎ লোহিতবর্ণ নিষ্ঠীবন বিশিষ্ট কাস; সন্ধ্যা হইতে দুইপ্রহর ব্যত্ৰি পর্যন্ত কাসের বৃদ্ধি, অবসন্নতা, আঠা আঠা, ঘর্ষ, ক্ষুদ্রনাড়ী, নিম্ন মুণ্ডল ও বায়ুনলীতে ঘড় ঘড় শব্দ সহকারে ফসফরাসের পক্ষাঘাতের আশঙ্কা; সুপ্তি, প্রলাপ, শব্দ-হাতড়ান; মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের আশঙ্কা ও পতনাবস্থা; শ্রুতিশক্তির ক্ষীণতা, বিশেষতঃ মনুষ্যের শব্দে; নিমগ্ন, গম্ব-গত, নীলমণ্ডল-পরিবেষ্টিত চক্ষু; নাসাপার্শ্বের পাখার ছায় সঞ্চলন; নাসিকা হইতে বাবংবাব প্রচুর রক্তপাত; নাসিকা, ওষ্ঠ, মুখ, ও গলাব শুষ্কতা, এবং জলে উহাব অনির্ভূতি; দন্ত হইতে মাটী সরিয়া যাওয়া ও উহা হইতে সহজে রক্তপতন; পরিশুদ্ধ, অচল, কৃষ্ণবর্ণ লেপাচ্ছন্ন, বিদারিত, ও চিকণ জিহ্বা; শীতল পানীয় দ্রব্য পানের আকাজ্জা, ক্ষুধাশূন্যতা; জলীয়, পত্রিক, না আঠা আঠা পদার্থ বমন; আগ্রান ও উচ্চ আটোপ সংযুক্ত

বেদনাহীন অতিসার; জলবৎ, ঈষৎ হবিদগ্ন, ধূসরাভ, অথবা বিসমাসিত রক্ত জনিত কৃষ্ণবর্ণ বিরেচন; প্রত্যেকবার মলস্রাবের পৰ অতিশয় দুৰ্বলতা; এমোনিয়ার স্থায় তীব্রগন্ধ, ঘোলা, শুভ্রঅধঃক্ষেপস্রাবী মূত্র; দেহ-কাণ্ডে আরক্ত চিহ্ন, কালিমা, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা; দেহের অতিশয় উত্তাপ, কিন্তু মস্তকে ও শরীর-শাখায় শীতল ঘর্ষ।

## ফিরম ।

নীৰক্তাবস্থায় ছদ্ম বক্তাধিকোব চিহ্ন; যথা, অতুভেজিত ও প্রশান্তভাবে থাকিলে গণ্ডুস্তলেব পাণ্ডুবর্ণ ও মুখমণ্ডলেব মুদগ্ন; কিন্তু উত্তেজনায়া বা উদ্বিগ্নে উহাব আবক্ত বাগ, নাড়ীৰ পূর্ণতা ও নমনীয়তা, কিন্তু একোনাইটেব স্থায় পূর্ণতা ও উল্লক্ষনশীতলতা নহে; রক্তবহানাডীৰ প্রসারণ বশতঃ (প্রদাহ বশতঃ নহে) উদর-প্রাচীবে ঘূষ্টবৎ স্পর্শ-দেহ; এবং দীৰে ধীবে হাঁটিলে রক্ত-সঞ্চয়, বেদনা ও প্রায় অস্ত্রান্ত সমস্ত লক্ষণেৰ উপশম ফিরম প্রযোগেব বিশেষ লক্ষণ । ক্যাৰিংটন বলেন কুইনাইন অপব্যবহাবেব পৰবৰ্ত্তী দীৰ্ঘকালস্থায়ী সবিরাম জবে উত্তাপাবস্থায় রক্তবহা নাড়ীৰ, বিশেষতঃ শঙ্খস্থলেব ও মুখমণ্ড-লেব শিবাৰ ক্ষীততা, দপদপকব শিরোবেদনা, গ্ৰীহাব বৃদ্ধি; অপিচ, শোণ থাকিলে ফিরম ব্যবহৃত হয় ।

**ভূরের লক্ষণ ।**—নীত উপস্থিত হইবাব সময় বমন, উত্তাপা বস্থায় চক্ষুব চাবিদিকে ক্ষীততা; গ্ৰীহাৰ ক্ষীততা, বক্তহীনতা, অবগন্নতা, ও অতিশয় দুৰ্বলতা সহকাৰে উদরেৰ প্রসাৰিততা, মুখমণ্ডলেব অতিশয় পাণ্ডুবতা = গালেব অভাস্তরেব ঐক্যিক বিল্লীৰ অত্যন্ত নীৰক্ততা ও শুভ্রতা : চক্ষুব উপবে ও নীচে বদনেব, এবং পদদয়েৰ শোণ ।

## বেলেডোনা ।

বেলেডোনা স্থানবিশেষেব রক্তবহানাডী সঙ্কুচিত ও অত্রস্তা বিধান-তত্ত্ব উপদাহিত কবিয়া সেই স্থানে বক্ত-সঞ্চয় জন্মায় ও অধিক রক্ত সঞ্চাৰিত কাদ । এই প্রকাৰে বেলেডোনা দ্বাবা রক্ত-সঞ্চয়ন বিবৰ্দ্ধিত হয় ও অর-লক্ষণ জন্মে । তরুণ জরে মস্তিষ্ক বা গল-সংঘোব প্রদাহ থাকিলে বেলেডোনা

উপকারী । মস্তকে বক্রসঞ্চয় বশতঃ শিবোলক্ষণ থাকিলেও ইহা ব্যবস্থের ।  
 তবে অল্প শীত, অধিক দাহ ও ঘর্ম্মাবস্থা অব্যবস্থা থাকিলে বেলে-  
 ডোনা ব্যবহৃত হয় । ইহাব লক্ষণে আর্সেনিক জ্ঞাপক অবসন্নতা বা একো-  
 নাইস্‌চক অস্থিৰতা থাকে না । ডাঃ ডনহাম বলেন যে বেলেডোনার লক্ষণে  
 পর্যায়শীলতা লক্ষিত হইয়া না, এবং জ্বরের অবস্থা-বিভাগ সুস্পষ্ট থাকে না ।  
 অতএব ন্যালেবিয়া জ্বরে সহন দাহাবস্থা অবস্থ হইয়া প্রায় অবিস্মরণ থাকিলে  
 এবং প্রথম ইটতেই মস্তকের বক্রসঞ্চয় বা প্রদাহাদি শিবোলক্ষণ ও তৎসহ  
 বেলেডোনা জ্ঞাপক সাধারণ লক্ষণ গুলি বিদ্যমান থাকিলে বেলেডোনা ব্যব-  
 হৃত হয় । অপর টিহাও টিহাব অভিন্নত যে সন্নিপাতজ্বরে উন্নততা বা  
 মস্তিষ্কেব প্রদাহ উৎপন্ন হইলেই কেবল অন্তঃকর্ষী প্রবণ স্বরূপ বেলেডোনা  
 ব্যবহৃত । ডাঃ ফ্যারিংটন বলেন যে জ্বরে মস্তিষ্ক-পৃষ্ঠ-বংশীয় স্নায়ুগুণ  
 আক্রান্ত হইলেই কেবল বেলেডোনা ব্যবহৃত হয় । শিশুদিগের বোগে অতি  
 প্রথমেই এই স্নায়ুগুণ আক্রান্ত হয় । যুবকদিগের বোগে, প্রাপ্তে  
 জ্ব প্রকাশ পায়, তৎপরে মাস্তিষ্ক লক্ষণ উৎপন্ন হয় । তখন বেলেডোনার  
 ব্যবহৃত হইয়া থাকে । প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল, গলদেশেব ধমনীৰ দপদপঃ  
 কঠিন, পূর্ণ, উল্লক্ষনশীল নাকী, এবং প্রবল প্রলাপ, অপর, সহসা  
 বোগ-লক্ষণেব আবির্ভাব ও তিবোভাব এষ্ট প্রবধ প্রযোগের প্রধান  
 লক্ষণ । এই সকল লক্ষণকে বেলেডোনার সাধারণ লক্ষণ বলে ।  
 কারণ, বেলেডোনা জ্ঞাপক প্রায় সকল বোগেই এষ্ট কণ্ঠকটী লক্ষণ বিদ্যমান  
 থাকে । পূর্ণ-বক্র, বক্রসঞ্চয়-পবতন্ত্র, বিশেষতঃ শব্দীনেব অত্যন্ত স্থান হইতে  
 মস্তকে সমন্বিত বক্রসঞ্চয়-প্রবণ ; কতকটা ক্যালকেবিয়াব স্তায় মাংসল ও  
 প্লেগ্মা-প্রধান ব্যক্তিদিগেব পক্ষেই বেলেডোনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী ।  
 যাহাবা স্তম্ভ সময়ে প্রক্লান্ত থাকে ও প্রমোদ জন্মায়, কিন্তু বোগেব সময়  
 কোন ও অর্দাব হইয়া উঠে তাহাদেব পক্ষেই বেলেডোনা ভাল পাটে ।  
 বেলেডোনার লক্ষণ অপবাহ তিনটাব পব, পুনরাব সন্ধ্যাত্রেব পব, সঞ্চা-  
 লনে, স্পর্শ করিলে, বায়ু-প্রবাহে, আকস্মিক উষ্ণ ঋতুর পবিবর্তনে,  
 গ্রীষ্মকালে, সূর্য্যেব উত্তাপে ও পান কবিবাব সময় বিবর্জিত ; এবং উষ্ণ  
 গৃহে ভালরূপে বস্ত্রাবৃত থাকিলে উপশম প্রাপ্ত হয় ।



অরে একোনাইট ও বেলেডোনার প্রভেদ করা অপেক্ষাকৃত সহজ । সহানুভৌতিক স্নায়ুগুণে মুখ্য ক্রিয়া নিবন্ধন একোনাইটের অর জন্মে । মাস্তিষ্ক-পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুগুণে মুখ্যক্রিয়াবশতঃ বেলেডোনার অব উৎপন্ন হয় । অরের প্রারম্ভাবস্থায় প্রবল মানসিক অস্থচ্ছন্দতা ; অস্থিরতা, পার্শ্ব-পরিবর্তন ; মূত্ৰাভয় ; ঘৰ্ম্মশূত্র উত্তপ্ত গাত্র ; পূর্ণ, উল্লক্ষনশীল নাড়ী ; ক্লিয়ৎপরিমাণে অবাস্তব দৃষ্টি ; নিদ্রাবস্থায় অন্ন অন্ন ক্রন্দন ; অন্ন অন্ন মূত্ৰপ্রণাপ ( বিড় বিড় করিয়া বকা ) ; এই সকল মাস্তিক লক্ষণ অবের উত্থাপের আতিশয্য বশতই উৎপন্ন হয়, নস্তিকের মুখ্যপ্রদাহ হইতে জন্মে না । এক্ষণ অবস্থায় একোনাইট বেলেডোনা অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী । কিন্তু অব প্রবন্ধিত হইয়া মস্তিষ্ক আক্রান্ত হইলে বেলেডোনা ব্যবস্থ্যয় ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—প্রবল শিরঃপীড়া, পর্য্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ, অঙ্গের শীতলতা, মস্তকের উত্তপ্ততা ; পৃষ্ঠেব নিম্নদিকে কম্পের প্রধাবন ; অবিরত পরিণত আলোকের উত্তাপ, শীঘ্র উত্তাপাবস্থার আরম্ভ, উত্তাপকালে মুখমণ্ডলের আরক্ততা ও ক্যাবোটীড ধমনীর দপদপ এবং তৎসহ কেবল মস্তকে ঘৰ্ম্ম, শরীরেব আবৃত স্থানে ঘৰ্ম্ম ( অনাবৃত স্থানে ঘৰ্ম্ম, একন ) ; পিপাসা শূত্রতা অথবা অধিক পিপাসা ; কোপনতা ও নাকে । কাঁদা । সন্নিপাত জ্বর ।—অপ্রবন্ধিত অবস্থায়, মস্তিকে অতিশয় রক্তসঞ্চয় ; মস্তকেব পশ্চাষ্টাঙ্গে বা শিখরদেশে ছুরিকাঘাতের স্থায় বেদনা, অথবা কপাল যেন কাটিয়া পড়িলে একপ অনুভব, পর্য্যায়ক্রমে মুখমণ্ডলের লোহিত ও পাণ্ডুবর্ণ ; প্রদীপ্ত ও স্থির চক্ষু, প্রসারিত কনীনিকা, নিদ্রাবস্থায় গোঁগো শব্দ ও অস্থিরতা ; ভয়ঙ্কর স্বপ্ন, প্রচণ্ড প্রলাপ, অথবা রাত্রিকালে কতিপয় অসংলগ্ন বাক্যবিশিষ্ট প্রলাপ, আবক্ত, শুষ্ক, কম্পিত, ও বিদ্যারিত জিহ্বা, কোষ্ঠবদ্ধ বা বারংবার অন্ন অন্ন আতিসারিক মলনিঃসরণ ; অধক্ষেপ বিশিষ্ট ; অথবা পরিষ্কার প্রভূত মূত্র ; পূর্ণ, পুষ্ট, আয়তন-পরিবর্তন-শীল নাড়ী । তৃতীয় অবস্থায়, স্তপ্ততা, সকলপ্রকার অভিযোগ ও আকাজ্জা পবিশূত্রতা, মধ্যো মধ্যো কেবল পানীয় জব্যের অভিলাষ প্রকাশ, গিলিতে কষ্ট ; স্থিব, চিক্ণ চক্ষু ; নিম্নহস্তর পেশির শিথিলতাবশতঃ মুখের বিকাশ ; জিহ্বার চৰ্ম্মাকৃতি, স্তহরাং উঠা বাহির করিতে বোগীর অশক্তি ; বহিরতা ; উদরের

দৃঢ়তা ; অনিচ্ছায মলমূত্র নিঃসরণ ; শয্যাব পশ্চাদ্ধিক সবিয়া যাওয়া, গায়ের কাপড় ফেলিয়া দেওয়া, জজ্বা প্রক্ষেপ করা ; শয্যা-বস্ত্র উৎক্ষেপণ ; নিদ্রা-শূন্য নিদ্রালুতা ; সবিরাম নাড়ী ; গাত্রেব অতিশয় উত্তাপ সহ ঘর্ম্ম-প্রবণতা ; মুখমণ্ডলে শীতল ঘর্ম্ম ; প্রতি সঞ্চলনে উপচয় । সূতিকা জ্বর ।— প্রসাবিত উদর, উহাতে স্চী-বেধ ও খননবৎ বেদনা ; সহসা বেদনার আবেশ, বেদনা সত্ত্বর উপস্থিত হয়, এবং অধিকক্ষণ বা অল্পক্ষণ থাকিয়া আবার সত্ত্বর যায় ; \* প্রবল আক্ষেপিক উদব-বেদনা, বোধহয় যেন নশী বিক্ষিয়া রহিয়াছে, অথবা সঙ্গমেজ্জিয়ারদিকে যন্ত্রণাপ্রদ আবেগ, \* উদবে স্পর্শ-দেব ; শরীরের কোন কোন অংশে শীত, কোন কোন অংশে উত্তাপ, অথবা গাত্রে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও মস্তকে জ্বালাকব উত্তাপ, তৎসহ মুখমণ্ডল ও চক্ষু আবদ্ধতা, ক্যারটিড ধমনীৰ দপদপ সহ কপালে অবিরাম বেদনা ; আবদ্ধ জিহ্বা ও পিপাসাসহ শুষ্ক মুখ, গল-কোষেব আক্ষেপ সহ গিলিতে কষ্ট ; অনিদ্রা ও ছটফট, প্রমত্তপ্রায় প্রপাপ, বা অত্যাধিক মাস্তিক লক্ষণ ; স্বপ্ন, জলবৎ, ও আঠা আঠা, অথবা দুর্গন্ধি, বা সম্পূর্ণ বিস্মৃত প্রসবাস্তিক শ্রাব ; জরাযু হইতে দুর্গন্ধময় সংযত রক্তশ্রাব ; অনৈচ্ছিক মূত্রশ্রাব ; ক্ষীত ও প্রবাহিত, অথবা গোলিত ও দুগ্ধশূন্য স্তন ; কোষ্ঠবদ্ধ, বা অতিসাব । (বেল অগ্রচূর হইলে, হাইওস দিয়া দেখুন) । স্বপ্নবিরাম জ্বর ।—জিহ্বায় পীতাত বা শুভ্রবর্ণ গাঢ় লেপ, পানাহাবে অগ্রবৃত্তি, অন্ন, তিক্ত বা আঠা আঠা পদার্থের বমন ; আঠা আঠা বিরেচন ; শরীরে, বিশেষতঃ মস্তকে শুষ্ক উত্তাপ, তৎসহ পিপাসা, ও একবার উত্তাপ একবার শীত ; আকূলতা, অস্থিরতা, সন্দ্বিগ্নতা বা খামখেয়ালীতাব, প্রবল শিবঃপীড়া, মস্তকের সমস্ত যেন কপালে পতিত হইবে এ প্রকার অনুভব ; মুখশোণ, গিলিতে কষ্ট ; দিবসে প্রগাঢ় নিদ্রা, বাজিতে নিদ্রাশূন্যতা । ( ক্যাম ও মার্কেস সহিত তুলনা করুন ) ।

## ব্যাপ্টিসিয়া ।

ব্যাপ্টিসিয়া টাইফয়েড জ্বর জন্মায়, স্ততরাং টাইফয়েড জ্বরের প্রথম ও প্রবর্তিত অবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সমস্ত জ্বরে ( কণ্টি-নিউড ফিভার ) প্রথম উপক্রমে ইহা ব্যবস্থা করিলে সন্নিপাত-লক্ষণ উপস্থিত

হয় না। শয়নে অঙ্গ-গ্রহ, ও শরীরের খণ্ডবিখণ্ডতা অল্পভব ইহার প্রধান প্রবেগ-লক্ষণ। স্বল্প-বিরাম জ্বরের প্রবর্তিত অবস্থায়ও পাকাশয়িক লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হেল বলেন যে জীবনী-শক্তির ক্ষীণতা বা দুর্বলতাবিশিষ্ট সকল প্রকার জ্বরের পূর্বকণ ■ প্রথম অবস্থায়ই ব্যাপ্টিসিয়া অতিশয় ফলপ্রসূ। প্রাদাহিক জ্বরে ইহা অব্যবহ্যে। প্রদাহ অপেক্ষা উপদাহিতারই ইহা উপযোগী। স্নায়বীয় লক্ষণের প্রাবল্যে টাইফয়েড ও মাস্টিস জ্বরেই এই ঔষধ সদাধিক ব্যবহৃত হয়। (ক) অত্যন্ত দুর্বলতা; (খ) মস্তক খণ্ড-বিখণ্ড বা আপনাকে টুইজন অল্পভব; (গ) মল, মূত্র, ঘর্ম্ম, শ্বাসাদি সকল স্রাবেই অতিশয় দুর্গন্ধ, (ঘ) যে পার্শ্বে ভব দিয়া শয়নকরা যায় সেই পার্শ্বে ঘুটবৎ অল্পভব, (ঙ) কণাথ উত্তর দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়া, এইগুলি ব্যাপ্টিসিয়ার বিশেষলক্ষণ।

**জ্বরের লক্ষণ।**—সন্নিবাস জ্বর।—জ্বরের পূর্বে আলস্য ও অস্থচ্ছন্দতা। সমস্তদিন শীত শীত করা ও সন্ধ্যায়ে ঘুটবৎ বেদনা, পৃষ্ঠদিয়া শীতের উপর নীচে উঠা নামা। অনন্তর সমস্ত শরীরে শুষ্ক উত্তাপ, মধ্যে মধ্যে আবার পৃষ্ঠদিয়া শীতের উপর নীচে উঠা নামা, ঝলকে ঝলকে উত্তাপাবেশ, কটিদেশ হঠাৎ চাপিদিকে তাপের বিকীর্ণণ। পুনঃ পুনঃ দুর্গন্ধময়, অনধিক ঘর্ম্ম। বিবারণকালে সন্ধ্যারূপে অবজ্ঞা প্রাপ্তি, অস্থিরতা, ও দুর্বলতা।

**সূতিকাজ্বর।**—সন্নিপাত-লক্ষণবিশিষ্ট বক্ত-দুষ্টিতা, অতিশয় অবসন্নতা সংযুক্ত দুর্গন্ধ প্রসবাস্তিক স্রাব, উদরের ক্ষান্ততা, পূর্ণতা, কাঞ্চান, কুঞ্জন, ও বমনে উৎপন্নিত হইবে বলিয়া অল্পভব; অস্ত্রে স্তম্ভীকরণ সন্ধ্যায় বেদনা, মলিন আবৃত্ত স্বল্প মূত্র; শয়নে শ্বাস-কষ্ট, কিন্তু বক্ষঃস্থলের অনাকুঞ্জন, অস্থিরতা, অস্থচ্ছন্দতা, ও সন্ধ্যারূপে অবগম্য অল্প অল্পভব।

**সন্নিপাত জ্বর।**—প্রথমাবস্থায় বক্তবর্ণ প্রাস্ত্র বা বর্ণিষ কিম্বা পীত-মিশ্রিত কপিশবর্ণ কেন্দ্র বিশিষ্ট শুভ্রজিহ্বা, মুখের তিক্তস্বাদ বা স্বাদশূন্যতা; আহার গবিপাকে অশক্তি, বাবস্থায় পীতবর্ণ বিবেচন, দক্ষিণ ইলিয়াক প্রদেশে কুঞ্জন ও অঙ্গ অঙ্গ স্পর্শ-দ্বেষ, নার্ডাব বেগের ও জ্বরের বৃদ্ধি; শরীরের যে অংশে ভরদিয়া শয়ন করা যায় তাহাতে বেদনা। প্রবর্তিত অবস্থায়\* জড়বুদ্ধিবৎ মুখাঙ্কতি, অত্যন্ত শিরঃশীতা, মস্তিষ্ক ব্যতন ও ঘুটবৎ অল্পভব,

সমস্ত পেশীব বেদনাসহ অবসন্নতা ; মানসিক শক্তির অভাব , সমস্ত শরীরে, বশেষতঃ মুখমণ্ডলে জ্বালা ও তীব্র উত্তাপ , শুষ্ক, গাঢ় লেপারূপে জিহ্বা স্ফীত, অথবা দৃঢ় ও অবশ অল্পভব, জিহ্বায় ক্ষত ; স্থূল বাক্য ; স্বরভঙ্গ সংযুক্ত কাশ , বাৎসব মূৰ্ছাবেশ সহ উদবোধে অতিশয় শূন্যতা ও ঘৃষ্টবৎ অল্পভব, ত্রিকস্থানে বেদনা ; শরীরে যে অংশে ভবদিয়া শয়ন করা যায় সেই অংশে ঘৃষ্টবৎ অল্পভব ; অতিশয় অস্থিভতা , ত্রাণ্ডি ; রোগীর বোধ হয় যেন ঠিক তাহাবই স্থায় আর এক ব্যক্তি তাহাব পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছে , মাথা যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া ছড়ান বহিয়াছে এবং সে সেই খণ্ডগুলি একত্র করিবার নিমিত্ত শয্যায় এগাশ ও পাশ করিতে থাকে ; অহগমনকতা, কাহাবও কথা শুনিতে শুনিতে, ও উত্তর দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়া, প্রগাঢ় নিদ্রা, জোরে নাড়িয়া বা নাম দিয়া ডাকিয়া জাগাইতে হয়, স্বাসে পচাওন্ধ ; পাতলা, হরিদ্রাবর্ণ বা মলিন, এবং \* অতিশয় দুর্গন্ধময় মল ; \* দুর্গন্ধময় ঘন ও মূত্র , অতিশয় দুৰ্লভতা ও স্নায়বীয় অবসন্নতা, তৎসহ উত্তেজনা , শয্যা পবিত্রাণ করিয়া যাইবার চেষ্টা , সমস্ত দিন শীত শীত অল্পভব, ব্যক্তিগে উত্তাপ , গাত্রবেদনা সহ শীত ; ক্ষত ।

ব্যাপ্টিসিয়া ও জেলসেমিয়মে প্রভেদ ।—টাইকয়েড জরের প্রাবৃত্তাস্থায়, জেলসেমিয়ম ও ব্যাপ্টিসিয়া লক্ষণে অতিশয় সাদৃশ্য আছে । দুই ঔষধেই (১) পেশীব বেদনা ও অবসন্নতা, (২) অবসন্নতা সহকারে নিদ্রা-লুতা ও স্নায়বীয় উত্তেজনা , (৩) মস্তক বা অগ্র কোন অঙ্গ বৃহত্তর অল্পভব ; এবং (৪) অপবাক্ষে বৃদ্ধি , এই কয়টা লক্ষণ আছে । কিন্তু প্রভেদ এই যে জেলসেমিয়মের ক্রিয়া ব্যাপ্টিসিয়া অপেক্ষা মৃদু । এই মৃদু ও তীব্রতাই ইহাদের প্রভেদ ।

## ব্রাইওনিয়া ।

রক্তের পবিবর্তনে অর্থাৎ উহাব পবিমাণ, গুণ, ও সঞ্চালনের বৈলক্ষণ্যে, যথা অব্যাবস্থায় ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পবিবাসজবে এই ঔষধ বড় অধিক ব্যবহৃত হয় না । স্বল্পবিরাম জরেই ইহা অধিক প্রয়োগিত হয় ।

প্রাদাহিক, আমাশয়িক, আমাশয়িক, পৈতিক, আতিবাতিক, ও সান্নিপাতিক জ্ববেও সময়ে সময়ে ব্রাইওনিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডের বিবর্তিত ক্রিয়া ও তজ্জন্ত অনেকটা একোনাইটির জায় দ্রুত, কঠিন, অশিথিল নাড়ী ; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া-শক্তির বাস্তবিক আধিক্য ; ও শরীর সঞ্চালনে উচ্চ বৃদ্ধি, স্তব্বাং বোগীর সম্পূর্ণ স্থিতির থাকিবার আগ্রহ ; জ্বরের সহিত প্রায় সর্বদাই মস্তকে মৃদু মৃদু দপদপকর অথবা তীব্র শল্লাঘাতবৎ বেদনা, তৎসঙ্গে প্রায় সতত চক্ষুর অভ্যন্তরে ও উপরে তীব্র বেদনা ; বেদনা বৃদ্ধি পায় বলিয়া রোগীর মস্তক ও চক্ষু নাড়িতে অগ্রবৃত্তি ; বালিশ হইতে মস্তকোত্তোলনের যৎসামান্য চেষ্টায় বিবমিষা ও মূচ্ছাকল্পতা অতীব ; প্রাদাহিক জ্বর ও লঘুপ্রকৃতির আমাশয়িক জ্বরাদি মৃদু জ্বরে অতিশয় মুখ-শোথ ও জিহ্বার মলাচ্ছন্নতা, জিহ্বার শুভ্রবর্ণ লেপ ও জিহ্বার মধ্যস্থলের নিম্নভাগে উহার সমধিক স্পষ্টতা ; জিহ্বা-প্রান্তের সমাক পরিচ্ছন্নতা ; জ্বরের তীব্রতার আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে উহার সান্নিপাত প্রকৃতি ধাবণ ; পৈতিক লক্ষণের প্রাবল্যের উপস্থিতি ; পূর্বের শুভ্র লেপাবৃত্ত জিহ্বার এক্ষণ ঈষৎপীতবর্ণ, ও মুখে নিশ্চিত তিক্তাসাদ ; বিদীর্ণকব শিবঃপীড়া ; দক্ষিণ কক্ষিতে সূচী-বেদন ও অল্প অল্প বেদনা সহকারে উদরোদ্ব-দেশে স্পর্শ-ষেয ; সান্নিপাত-লক্ষণ বতই বাড়িতে থাকে ততই জিহ্বার শুভ্রতার আতিশয়া, কিন্তু জিহ্বার লেপের পূর্ববৎ অবস্থা ; সবিস্ময় জ্বব হইলে লীত ও উত্তাপের বিমিশ্রতা, অর্থাৎ লীতবহুয় মস্তকেব উত্তপ্ততা, গওদেশের প্রগাঢ় আরক্ততা এবং পিপাসা, ও অনেক ক্ষণ পর পর একবারে অধিক পরিমাণে জলপান ; কোন কোন রোগীরবা অবিরত পিপাসা ; নাড়ীব কঠিনতা, দ্রুততা ও অশিথিলতা ; যৎসামান্য শ্রমে শ্বস্বের উদ্বেক এবং উহার অল্প বা তৈলবৎ গন্ধ ;—এই গুলি ব্রাইওনিয়ার জ্বরের সাধাবণ লক্ষণ ।

কোপনতা ও সহজে ক্রোধের উদ্বেক ব্রাইওনিয়ার বিশেষ মানসিক লক্ষণ । কি পিত্তজনিত রোগ, কি শিবঃপীড়া, কি অগ্নিমান্দ্য, এই সকল রোগেই ব্রাইওনিয়া জ্ঞাপক এই মানসিক লক্ষণ বিশিষ্টরূপে বিদ্যমান থাকে । ব্রাইওনিয়ার লক্ষণগুলি নড়িলে চড়িলে ও স্পর্শে বৃদ্ধি পায় । দুই চারিটা বিশুদ্ধ স্মারবীর লক্ষণ ব্যতীত ইহাব সমুদায় লক্ষণেরই এই প্রকৃতি দৃষ্ট হয় ।

হৃদীবোধবৎ ও বিদ্ধবৎ বেদনা এবং সঞ্চলনে রোগ-লক্ষণেব বৃদ্ধি ব্রাইওনিয়ার প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—শীতের প্রাবল্য ; প্রধানতঃ সায়াহ্নে, সচরাচর কেবল দক্ষিণপার্শ্বে শরীরেব বাহ্যিক শীতলতা সহ শীত ; অনাবৃত বায়ু অপেক্ষা গৃহের অভ্যন্তরে শীতের আধিক্য ; \* ওঠে ও অস্থলীর অগ্রভাগে শীতের আবস্ত । শুষ্ক জ্বালাকর উত্তাপ, প্রধানতঃ অন্তবে তাপ, শিবির অভ্যন্তরে যেন রক্ত জলিতেছে এরূপ অহুভব, তাপাবস্থায় সমুদায় যাতনার বৃদ্ধি ; অল্পক্ষণ পরে পরে কেবল কোন কোন অঙ্গে ঘর্ষ, জ্বরের সকল অবস্থায়ই অতিশয় তৃষ্ণা, কিন্তু উত্তাপাবস্থায়ই পিপাসার আধিক্য ; প্রভূত ঘর্ষ, সচরাচর ঘর্মের অল্পত্ব, যৎসামান্য পরিশ্রমে ঘর্মের উদ্বেক, এমনকি অনাবৃত বায়ুতে আন্তে আন্তে হাঁটিলেও ঘর্মশ্রাব এবং অধিকক্ষণ ঘর্মের অবস্থিতি ; পূর্ণ, কঠিন, অশিথিল, ক্রতনাড়ী ; উত্তাপাবস্থায় বা শীতের পূর্বে শিরোবেদনা ও শিবোগূর্ণন । বিরামকালে উদরের উপসর্গ ; অঙ্গ-বেদনা ; নড়িতে চড়িতে অনিচ্ছা ; মলাচ্ছন্ন জিহ্বা, তিক্ত আশ্বাদ, আহারে অরুচি ; বিবমিষা, বমন-প্রবৃত্তি, ব্যথিত পার্শ্বে শয়নে ও শয্যায় গাএ উষ্ণ হইলে বোগীর আরাম অহুভব । স্বল্পবিরাম জ্বর ।—শুষ্ক কপিশাভ পীতবর্ণ জিহ্বা ; মুখ হইতে পচা গন্ধ নিঃসরণ ; মুখে তিক্ত আশ্বাদ, বিশেষতঃ নিদ্রান্তে, অথবা স্বাদশূণ্যতা বা বিষাদ ; অল্প পানীয়, কফি, বা সুবা পানের অতিশয় স্পৃহা, নিরেট খাদ্য দ্রব্যে অপ্রবৃত্তি, বিবমিষা, আমাশয়ে শ্লেষ্মার সঞ্চয়, বারংবার বমনের ইচ্ছা, অথবা পিত্ত বমন, বিশেষতঃ পানান্তে ; মস্তকে, আমাশয়-গহ্বরে, অথবা পার্শ্বে, ও শবীর-শাখ্যে হৃদীবোধ, বিশেষতঃ কাসিবার বা হাঁটিবার সময় ; আমাশয়-গহ্ববে ভার বা অশিথিলতা অহুভব, বিশেষতঃ আহারান্তে ; কোষ্ঠবদ্ধ ; জলবৎ, পবিষ্কার বা জৈবৎ পীতবর্ণ, পীতাভ অধঃক্ষেপ সংযুক্ত মূত্র ; জ্বালাকর পিপাসা সহ প্রবল গাত্রোত্তাপ, অথবা সর্কশবীরের কম্প, ও মুখমণ্ডলের আরক্ততা ( এবং উত্তাপ ) সহ শীত শীত অহুভব ; প্রচণ্ড শ্রভাব ; অতিশয় দুর্বলতা ; শিবোগূর্ণন সহ মস্তকের জড়তা । ( একন, ক্যাম, নক্স-ভম সহকারে তুলনা করুন ) । সম্মিপাত জ্বর ।—( ১ ) জ্বরেব প্রারম্ভ হইতে হিমবৎ, দপদপ কর, উৎক্ষেপজনক শিবেপীড়া, বিবমিষা, ও বিবক্টি, জৈবৎ

শুভ্র জিহ্বা, তিক্ত আশ্বাদ, গল-শোষ, পিপাসা; ওষ্ঠে ও মুখে কোকান্বিত্য উদ্বেদ; আমাশয়ে খল্লী সূদৃশ আকৃষ্টতা; উদবোর্ধ্বে চাপদিলে বেদনা; উদবেদনা; আখ্যান, কোষ্ঠবদ্ধ; মুত্রেব স্বল্পতা ও আবিলতা; ভগ্ন বা ক্ষীণ শব্দ; প্রাতে কাস; কাসিলে বা গভীর নিশ্বাস গ্রহণ কবিলে পশ্চাকার মধ্যবর্তীস্থানে তীব্র বেদনা; কষ্টপ্রদ অলসতা; মস্তকে শীতলঘর্ষ; শুষ্ক ত্বক। (২) দ্বিতীয় অবস্থায়, জ্বরবীয বা মানসিক লক্ষণাবিহীন টাইফয়েড জ্বরে, পূর্বাধিনেব ঘটনা সম্বন্ধীয় বা বিষয়কর্ণ্য সম্পর্কীয় প্রবল প্রলাপ, এবং শয্যাহইতে ছুটিয়া যাইবাব প্রবৃত্তি; চক্ষু মুদিত কবিবাব সময় নিদ্রম দর্শন; কোপনতা, বিবক্ণ চিত্ততা, ক্রোধ-ভাবিতা; অতীব, সূচী-বেদন বা ছিন্নকর শিরঃপীড়া, সঞ্চালনে ও চক্ষু উন্মীলনে উহাব আধিক্য; চক্ষু প্রভাশূন্যতা ও সজলতা; শ্রুতিশক্তি ক্ষীণতা, জ্ববেব তীব্র উত্তাপ, অনেক ক্ষণ পবে পবে এক একবাবে অধিক পরিমাণে জলপান করিবাব প্রবল তৃষ্ণা, মুখেব শুষ্কতা ও উহাব অভ্যন্তরে কোকান্বিত্য উদ্বেদ; স্বাদ-শূন্যতা; আতাবে অরুচি এবং তৎসহকারে বিব-মিষা ও বমন কবিবার ইচ্ছা, অথবা আঠা আঠা পিত্তবমন; উদবোর্ধ্বে প্রচাপনে স্পর্শ-দেহ; উদবেব ক্ষীততা; কোষ্ঠবদ্ধ বা প্রাতে ও বাত্রে অতিসাব, অতিসাবে প্রায় অনৈচ্ছিক দুর্গন্ধময় পচা, পুণাতন পর্ণিবেব গন্ধবিশিষ্ট মল নিঃসবণ, ভাবী মূত্র; কাসিবাব বা গভীর নিশ্বাস গ্রহণ কবিবার সময় বন্ধঃস্থলেব পার্শ্বে ব্যথা, দিবসে নিদ্রা রাত্রিতে ছটকটি; ক্ষুদ্র ও কোমল নাড়ী; আঠা আঠা ঘর্ম, হস্ত-কম্প। (৩) তৃতীয় অবস্থায়:—অতিশয় অলসতা ও দুর্বলতা, চুপকরিয়া থাকিবাব ইচ্ছা; নড়িলে চড়িলে সর্কাজে বেদনা; মুখে ও গলায় সাবানেব ফেণাব ত্রায় ফেণা ফেণা লালাসঞ্চয়, সময়ে সময়ে তন্দ্রাবা বোগীবা প্রায় গল-বোদ, শুষ্ক, বন্ধুর, বিদাবিত, ও সচরাচর মলিন কপিশবর্ণ জিহ্বা; দীর্ঘ নিশ্বাস ভাগ, গোঁগো ও কোঁকো করা, মুখেব চর্কণবৎ সঞ্চালন সহকারে অস্থির নিদ্রা, হৃদ-প্রদেশে যাতনা ও গৌবব; প্রলাপ সহ মানসিক অবসাদ, স্বপ্নশূন্য নিদ্রা, গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা; অনিচ্ছায় মল-মুত্রেব নিঃসবণ, ঘর্ম সহকারে বা ঘর্মব্যতীত শবীরেব এক প্রকার বিশেষ অন্ন গন্ধ, সংযত প্রকৃতি, কিন্তু সহজে ক্রোধের উদ্দীপনা।

## ভিরেটম এলুবম্ ।

ডাঃ ডনহাম বলেন যে ভিরেটমেন প্রায় প্রত্যেক প্রয়োজনীয় লক্ষণের সহিতই (যেখানে কেন সেই লক্ষণ প্রকাশিত না হউক) “কপালে শীতল ঘর্ম” এই বিশেষ লক্ষণটি বর্তমান দৃষ্ট হয়। ভিরেটমেন প্রাপক শীতলতা জ্বর-রোগে এই ঔষধি প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। সবিরাম জ্বর, দূষিত সবিরাম জ্বর, ও সন্নিপাত জ্বরাদিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ভিরেটমেন লক্ষণ পানাস্তে; মলত্যাগেব পূর্বে ও মলত্যাগকালে, ও উত্থানে বিবর্তিত; এবং উপবেশনে ও শয়নে উপশমিত হয়। সহসা বলক্ষয়, শবীবের শীতলতা, কপালে শীতল ঘর্ম, বৎসামাত্র শ্রমে মূর্ছাব আক্রমণ, ইহার বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—শীতের প্রাধান্য; শীত সহকারে পিপাসা; শীত, আভ্যন্তরিক হইলে উষ্ণাভিমুখে নয় কিন্তু নিম্নাভিমুখে গতি। নীলবর্ণ, শীতল, অস্থিহ্রাপক ত্বক্, হস্তের নীলবর্ণ; মুখ-মণ্ডল, মুখ, ও জিহ্বাব শীতলতা; আয়ামিত শ্বাস; শ্বসপিণ্ডের দুর্বলতা। উত্তাপে অল্পশয়; শীতল, আঠা আঠা ঘর্ম, কপালে ঘর্মের আধিক্য। দূষিত সবিরাম জ্বর ।—(কঞ্জেষ্ট্রিভিচন)। ওলাউঠাব জ্বর লক্ষণপন্ন দূষিত বিষম জ্বর। প্রাধান্যতঃ বাহিবে শীত ও শীতলতা, তৎসহ অস্থিরে তাপ ও গাত্র শীতল আঠা আঠা ঘর্ম, শীতের নিম্নাভিমুখে গতি, কম্পকব শীত, তৎসহ ঘর্ম, অনন্তর শীঘ্র উহাব মর্দান্ধীন শীতলতায় পরিণতি; জলপানে শীতের বৃদ্ধি; প্রাধান্যতঃ অস্থিরে তাপ, তৎসহ পিপাসা, কিন্তু জলপানে অনিচ্ছা, উত্তাপের উর্দ্ধগতি; প্রভূত, শীতল, আঠা আঠা, দুর্গন্ধি ঘর্ম, ও তৎসহকারে মুখমণ্ডলের মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ; জীবনীশক্তির অতিশয় অবসাদন। সন্নিপাত জ্বর ।—বমন, বিবেচন, শীতল ঘর্ম ও অজ্ঞেব শীতলতা সহকারে রোগের আরম্ভ; নাড়ীর প্রায় অপ্রাপ্যতা, উদবেব আকুঞ্চিতবৎ অতিশয় ব্যথিততা, অজ্ঞাতসাবে মূদ্রাব, শবীব-শাখার তুহারবৎ শীতলতা ও উহাতে বেগুণিরঙ্গের খীড়কা, জ্বাগ্রত তন্দ্রা, এবং ভয়প্রাপ্তির জ্বর বারবাহ চমকিয়া উঠা; মৃতবৎ মুখাকৃতি; অতিশয় অবসন্নতা।



## ভিরেট্রম ভিরিডি ।

বিষমজ্বরের উত্তাপাবস্থায় যুবকদিগের মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চয়, প্রলাপ, জ্বপিত্তের প্রবলক্রিয়া, কঠিন ও দ্রুতনাড়ী; এবং বাসকদিগেব প্রবল আক্ষেপ লক্ষণে এই ঔষধ একোনাইট ও বেলেডোনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতদ্বারা জ্বরের আবেশের তীব্রতা এবং আক্ষেপের আশঙ্কা সম্ভব প্রতিরুদ্ধ হয়। স্বপ্ন-বিরাম বা পিত্তজ্ব ম্যালেরিয়া জনিত না হইলে সময়ে দময়ে এই ঔষধে উপকার দর্শে। মস্তিষ্কেব উত্তেজনা সংযুক্ত জবে ইহা বিশেষ উপযোগী। প্রাকাসয়িক উপসর্গ সম্বলিত প্রাদাহিক অবস্থা অর্থাৎ বিব-মিষাদি বিশিষ্ট কক্ষজবে ভিরেট্রম ভিরিডি একোনাইট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বুখা বমন-বেগ, বমন, পথ্য উল্লীষণ, শিরোবেদনা, প্রলাপ, অচৈতন্য ও অবসন্নতা লক্ষণাগ্নয় সন্নিপাত জব প্রভৃতিতেও এই ঔষধ ব্যবহ্যেয়। স্মৃতিকা জ্বের প্রাবস্তাবস্থায়; সহসা দৃষ্টি ও প্রসবাস্তিক স্রাবের বিলোপ; তীব্র জ্বর, অস্থিরতা; অত্যন্ত বেদনা, কুহ্নন, আখান, শীতল ও আঠা আঠা গাত্র-ত্বক্; দ্রুত, দুর্বলনাড়ী লক্ষণেও এই ঔষধ উপযোগী। জবে নিউ-মোনিয়াব সূচনা উপস্থিত হইলে, ধামনিক বক্তসঞ্চলনের অতিশয় উত্তেজনা থাকিলে; এবং আয়াসিত ও কষ্টকব শ্বাস লক্ষণে একোনাইটের স্থলে ভিরেট্রম ভিরিডি ব্যবহৃত হয়। ডাঃ হেল বলেন যে পূর্ণ, কঠিন, দ্রুত, ও উল্লক্ষনশীল নাড়ী; এবং জিহ্বাব প্রান্তভাগে পীতবর্ণ ও মধ্যস্থলে প্রশস্ত বা অপ্রশস্ত লোহিত রেখা জরবোগে এই ঔষধ ব্যবহারের বিশেষ লক্ষণ। উথানে; বিচরণে; সায়াছে; ও সঞ্চলনে ইহাব লক্ষণ বিবর্জিত হয়। রক্ত-প্রধান ধাতুতেই ইহা ভাগ খাটে। এতদ্বারা উপকার দর্শিলে সম্বরই উপকার দর্শে। স্বেদ নিঃসরণে একোনাইটেব জায় ইহারও উপকারিতা স্ফুট হওয়া যায়।

## ভেলেরিয়ানা ।

সবিরাম জ্বর।—\* শীতের অভাব বা অল্পক্ষণস্থায়ী শীত, ষাড়ে শীতের আবস্ত হইয়া পৃষ্ঠদিয়া নামা, শীতাবস্থায় মুচ্ছা; শীতের পরে \* অনেক

ক্ষণস্থায়ী উত্তাপ ; অবল উত্তাপ সহ প্রভূত ঘর্ম, রাত্রিতে ও পরিশ্রমে ঘর্মের আধিক্য ।

## ম্যাগ্নিসিয়া কার্বনিকা ।

আমাশয় ■ অস্ত্রেই ম্যাগ্নিসিয়া কার্বনিকার বিশেষ ক্রিয়া দর্শে । এই ক্রিয়া বশতই ইহার প্রায় সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় । অসহিষ্ণু বিবক্তিত্ত্ব বালকদিগেব বোগেই এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী । ম্যাগ্নিসিয়া কার্বনিকা ক্যামোমিলাব অল্পপূবক । সাধাবশতঃ শরীরেব একদিক আক্রান্ত হইলে এই ঔষধে বিশিষ্টরূপে উপকাব করে । ইহাব লক্ষণ, শীতলতায, বায়ু-প্রবাহে, স্পর্শে, ও প্রতি ২১দিন অন্তব বৃদ্ধিত, এবং উষ্ণ বায়ুতে উপশমিত হয়, কিন্তু শয্যার উত্তাপে ও সূর্যোত্তাপে বৃদ্ধি পায় । সাধাৰ্হে ও শয়নান্তে শীত ও কম্প, পায়ের পাতায় শীতের আরম্ভ, পিঠদিয়া শীত নামা, গৃহের বাহিবে পরিশ্রমে শীতের উপশম, শরীরে শীতল জল প্রক্ষেপেব ত্রায় শীতালু-তব । সাধাৰ্হে শীতান্তে তাপ, মস্তকে ঘর্মসহকারে পূর্বাৰ্হে তাপ, বাড়িতে অস্থিরতা, ও অনাবৃত হইতে অনিচ্ছা সহ তাপ ; পূর্বাৰ্হে কেবল একদিকে ( দক্ষিণ দিকে ) তাপ, ও তৃষ্ণা । তৈলবৎ ও অল্পগন্ধি ঘর্ম, রাত্রি ১২টা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ঘর্ম । এই সকল লক্ষণে প্রত্যহ বা ২১ দিন অন্তর উপস্থিত দবিরাম জরে ম্যাগ্নিসিয়া কার্বনিকাব ব্যবহাব হয় । সলফেট-অব-ম্যাগ্নিসিয়া ।—পূর্বাৰ্হে ১টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শীত, শরীরের একাংশে উত্তাপ ও অত্যাংশে শীত ম্যাগ্নিসিয়া সলফের প্রবান প্রয়োগ-লক্ষণ ।

## ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা ।

স্ত্রীলোক ও শিশুদিগেব বোগে, বিশেষতঃ শুষ্কবায়ুগ্রস্ত স্ত্রীলোক ও গণ্ডমালাগ্রস্ত বালক বালিকাদিগেব পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী । যক্ৰদ্রোগ ও দস্তোদ্ভেদ সংস্পষ্ট অবেই ইহাব সমধিক অধিকার দৃষ্ট হয় । কোষ্ঠ-কাটিত্ব, কষ্টে খণ্ড খণ্ড শক্ল মল নিঃসরণ, অথবা মলেব অধিক শুষ্কতা বশতঃ মলদাব অতিক্রমের পর শুড়া শুড়া হইবা পতন ইহাব একটা বিশেষ লক্ষণ ।

সূক্ষ্ম পাখিলে বিবক্ষিত ও নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে হ্রাসপ্রাপ্ত হংকম্প, স্রী বা পুরুষদিগের বোণে ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকাব আর একটা বিশেষ লক্ষণ । ইহাব অধিকাংশ লক্ষণ বসিয়া থাকিলে বাদ্যতঃ ; এবং নড়িলে চড়িলে, পরি-  
ভ্রমে, ও অনারত বায়ুতে উপশমিত হয় । অগ্নিব নিকটেও শীত, অপরাহ্ন  
৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত শীতের আধিক্য ; অনারত বায়ুতে, ও শয্যা  
শয়নে শীতের লাঘব, সায়াহ্নে উত্তাপ, পিপাসা ; কেবল মস্তকে ঘর্ম ;  
অনারত হইতে অনিচ্ছা, —এই সকল লক্ষণে সুবিরাম অরে ম্যাগ্নিসিয়া  
মিউরিয়েটিকা ব্যবহৃত হয় ।



## মার্কিউরিয়স ।

রাশিতে ও শয্যাব উত্তাপে বোণের বুদ্ধি পাবদেব প্রদান প্রয়োগ লক্ষণ ।  
জ্বর ও প্রদাহিত অবস্থায় ঘমাভাব একানাইট ও বেলেডোনা জ্ঞাপক । কিন্তু  
ঘর্মজাব হইলেও সেই ঘর্মে বোণীর উপশম না জন্মিলে মার্কিউরিয়স ব্যব-  
হ্যেয় । অবিরাম বা স্বল্প-বিরাম জবে, বিশেষতঃ যত্নেব বিবুদ্ধি বা অপ্রবল  
প্রদাহ থাকিলে, লক্ষণানুসাবে মার্কিউরিয়স ব্যবহৃত হইতে পারে ।  
প্রাতিজ্ঞায়িক বা আশাশয়িক ( ক্যাটাবাণ বা গ্যাষ্ট্রিক ) জবে বদনের  
ক্ষীততা, গলার অভ্যন্তরেব ও বাহিরেব ক্ষীততা, সন্ধিস্থানের অবিরাম  
বেদনা ও শয্যাব উষ্ণতায তাহাব আতিশয়া এবং ঘর্ম নিঃসরণে অনুপশম  
লক্ষণে মার্কিউরিয়স ব্যবহৃত কবা যায় । অপব, এই সকল লক্ষণের সহিত  
প্রায় সর্বদাই রোগীর অস্ত্রের প্রতিজ্ঞায়-প্রবণতা দৃষ্ট হব এবং তজ্জন্তু আতিশয়  
কুহন সহকায়ে আমরক্ৰমণ মল নির্গত হইয়া থাকে । মলনিঃসরণেব পবেও  
সেই কুহনের বিবতি জন্মে না । এস্থলেও বেলেডোনাব পরে মার্কিউরিয়স  
উপযোগী হব । সন্নিপাত অরেব প্রণমনাস্থায় নাভস্বেদা ধাতুব বোণীদিগের  
বোণে লক্ষণের সাদৃশ্য থাকিলে মার্ক-সল ; এবং দ্বিতীয় অবস্থায় মার্ক-  
ডলসিস ব্যবহৃত হয় । জিহ্বা শুষ্ক ও প্রগাপ প্রকাশিত হইবামাত্র তখন  
মার্ক-ডল, বহিত কবা বিহিত । বাহাবা পূর্বে অতিমাত্রায় ও অনেক দিন  
পর্য্যন্ত পাবদ গমন কবিয়াছে তাহাদেব পক্ষে এই ঔষদ প্রশস্ত নহে ।

সাধারণতঃ পুষ্কবের পক্ষে মার্ক-কর, জ্বীলোকের পক্ষে মার্ক-মল, ও শিশুর পক্ষে মার্ক-ভাইভস অধিক উপযোগী হয় । মার্কিউরিয়সের লক্ষণ সাধারণে ও রাত্রিতে ; শস্যার উত্তাপে ; ঘর্মনিঃসরণ সময়ে ; বর্ষাকালে ; শীতল সান্ধ্য বায়ুতে ; উষ্ণ দিবস ও শীতল নাত্রিবিশিষ্ট শবৎকালে , ব্যায়ামকালে ; ও দক্ষিণপার্শ্বে শয়নে বিবদ্ধিত , এবং দিবাভাগে , ও বিশ্রাম সময়ে উপশমিত হয় ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরামজ্বর ।—সাধারণে শীত, উত্তাপ ও প্রবল পিপাসা, অথবা প্রাতঃকালের প্রাকালে পিপাসা; ঘর্মাবস্থায় হ্রস্কম্প ও বিবমিষা; হর্গন্ধি বা অন্ন ঘর্ম, ঘর্মাবস্থায় অস্থিরতা বৃদ্ধি । স্নানবিরাগজ্বর । আত্ম জিহ্বা, জিহ্বায় শুভ্র বা পীতভ লেপ ; শুষ্ক, জ্বালাকব ওষ্ঠ ; মূখে বিবমিষাজনক, মন্দ, বা তিক্ত আপাদ , বমনপ্রবৃত্তিসহ বিবমিষা বা গ্লেয়া ও তিক্ত পদার্থ বমন , কুষ্টি, আমাশব-গহ্বর, বা নাভির চারিদিকে ব্যথিততা, বিশেষতঃ তৎসহ নাত্রিকালে অতিশয় অস্থিরতা ও উৎকর্ষা ; দিবসে নিদ্রা-লুতা, \* রাত্রিতে জাগ্রততা , ক্ষণবাগিতা , পর্যাবক্রমে শীতোত্তাপ, সন্ধ্যাকালে প্রবল জ্বর, দুইপ্রহর নাত্রির সময় যেরূপ অতিশয় বৃদ্ধি ; \* জ্বালাকর পিপাসা, সময়ে সময়ে পানীয় দ্রব্যে অরুচি । আম ও পিত্তময় মল , বক্তাকৃতি গাঢ় পোক্তিতবর্ণ মূত্র । সন্নিপাত জ্বর ।—মার্ক-মল ।—পাণ্ডুব, বিবর্ণ, পীতভ বদন , পচা ও বগশূন্য আমাদ ; জিহ্বায় গাঢ় পীতবর্ণ লেপ, উদবোদ্ধ ও যকৃদ্দেশে স্পর্শে বেদনা , প্রতুত, তবল, গিচ্ছিল, কখনওবা অল্প অল্প রক্তাক্ত মল ; বাবস্থান মূত্র-প্রবৃত্তি , অস্থিরতা, উৎকর্ষা, অনিদ্রা, শিরঃপীড়া, কিস্ত প্রলাপাতার, আঠা আঠা, হর্গন্ধি ঘর্ম , গাত্র-স্বকের ঈষৎ হলিজাবর্ণ ; বায়ুনলীর উপদাহ । মার্ক-ডা ।—দ্বিতীয় অবস্থায় অনিচ্ছিত আমাশয়িক উপদ্রব, সমগ্র উদরে স্পর্শ-দেহ ; জলবৎ, বর্ণশূন্য, অথবা উর্ণা স্তবকেণ স্রায় শুভ্র আম মিশ্রিত, কিম্বা মাংসদোত জলেব স্রায় মল, নাত্রিকালে মলস্রাবের আধিক্য ।

—\*—

## মার্কিউরিয়ালিস ।

দক্ষিণ বাহু ও বক্ষঃস্থলের দক্ষিণদিকে শীতের আবস্ত এই ঔষধেব বিশেষ লক্ষণ । ঐম হস্ত ও বামবাহুতে শীতের আরম্ভ কাস্মোভেজিটেবিলিসের

লক্ষণ । জ্বরের লক্ষণ ।—সমস্ত শরীরে শীত, শীতাবস্থায় মুখমণ্ডলের উষ্ণতা, ও নিদ্রা, অনন্তর উত্তাপ, পরিশেষে ঘর্ম । আমাশয়ে, দক্ষিণ বাহুতে বা বক্ষঃস্থলের দক্ষিণদিকে শীতের আবস্ত, কম্প, দুর্বলতা, অঙ্গ-বেদনা, ও সর্বদা নিদ্রা বাইবার ইচ্ছা, আমাশয় ও উদরে বেদনা, স্পর্শে সেই বেদনার বৃদ্ধি ; বক্ষঃস্থলে ভারবোধ ও শ্বাস-কষ্ট । জ্বালাকবউত্তাপ, করতল ও পদ-তলের উষ্ণতা, পুনঃ পুনঃ হস্তেব জ্বালা ; হস্তেব শিরার ক্ষীততা । শীতশূষ্ক ও প্রায় ঘর্মশূন্য উত্তাপ । শেষ রাত্রিতে, নিদ্রাব পরে ঘর্ম ; ঘর্মাবস্থায় অধিক পিপাসা ।

—.—

## মিউরিয়েটিক এসিড ।

টাইফয়েড নামক সন্নিপাত জ্বরেই মিউরিয়েটিক এসিড সমধিক ব্যবহৃত হয় । সবিরাম জ্ববে ইহার তেমন ব্যবহাব নাই ; তবে অস্থিবেষ্টে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার দশে । বিগলিত ক্ষতাদি সংযুক্ত জ্বরের জ্বায় ক্ষীণ ও দুর্বলাবস্থা এই ঔষধের প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—শীত ।—শীতের প্রা-  
ধান্ত, শীত ও কম্প, মুখমণ্ডলের জ্বালা, গণ্ডস্থলের উষ্ণতা, পৃষ্ঠের শীতলতা,  
হস্তের শীতলতা, বাহ্যিক তাপ, যুগপৎ শীতোত্তাপ । উত্তাপ ।—আভ্যন্তরিক  
উত্তাপ ; গাত্রাবরণ পবিত্র্যাগেব প্রবৃত্তি ; অস্থিরতা ; রাত্রিতে উত্তাপসহ  
ক্লংকম্প, কবতল ও পদতলে জ্বালা । প্রথম নিদ্রায় রাত্রি দুইগ্রহণ পর্যন্ত  
ঘর্ম ; সায়াহ্নে শয়নকালে পদে শীতল ঘর্ম ; মস্তক ও পৃষ্ঠে ঘর্মের আধিক্য ;  
ঘর্মকালীন মৌনতা । সন্নিপাত জ্বর ।—প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় ;—  
ক্রমাগত প্রলাপ, তজ্জন্ত বিশ্রাম ও নিদ্রা পরিশূন্যতা, অতীত ও বর্তমান  
বিষয় সম্বন্ধে অবিরত নিবিষ্টতা, স্মৃতবাং দেশকাল সম্বন্ধে বিস্থতি । ইন্দ্রিয়েব  
ক্রিয়াতিশয়া, জ্যোতিতে নেত্রের আকুঞ্চন, শব্দে কর্ণের অন্ততবাধিক্য,  
আত্মাণ ও আশ্বাদন শক্তির অতিশয় প্রার্থ্যা, চক্ষুর প্রদীপ্ততা, কনীনিকার  
স্ফুটিততা, গণ্ডের সীমাবদ্ধ আরক্ততা ; নাসিকা, ওষ্ঠ, ও জিহ্বাব পরিপুঙ্কতা,  
জিহ্বার যৎসামান্য লেপ বা লেপশূন্যতা ; অগ্ননালীর অতি মৃদু উপদ্রব

কখন কখন সান্নিধ্যাতিক মল নিঃসরণ অথবা কোষ্ঠবদ্ধ ; পরিষ্কার অন্নমূত্র ;  
 হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীর স্পন্দনের আধিক্য, উত্তেজনশীলতা, অথচ শক্তিশূন্যতা ;  
 শ্বাসের দ্রুততা, স্বকের পরিশুদ্ধতা, ও গাত্রভাপের বৃদ্ধি ; নিদ্রার অতিশয়  
 প্রয়োজন অথচ নিদ্রা যাইতে অপারগতা ; পেশীর শক্তির অমধিক লাঘব ;  
 অন্ন অন্ন দুর্বলতা ও মানি (ব্রাইওনিয়াব পরে) । তৃতীয় অবস্থায় ;—  
 অতিশয় অবসন্নতা ; মস্তিষ্ক ঘুটবৎ শিরঃপীড়া, নিদ্রাবস্থায় গোঁগোঁ ও  
 কৌকৌ শব্দ করা, এবং অবিরত শয্যার নিম্নাভিমুখে সরিয়া সরিয়া যাওয়া,  
 জাগ্রতাবস্থায় মুহুঃপ্রলাপ ও অচেতন্ত্ব ; হ্রস্বতা ; মুখ ও জিহ্বাব অতিশয়  
 পবিত্রকতা ; জিহ্বার শুষ্কতা ও শুষ্কতা, সজ্ঞান অবস্থায়ও রোগী উহা ইচ্ছা  
 কবিয়া নাড়িতে চাড়িতে পারে না ; প্রতি তৃতীয় স্পন্দনে নাড়ীর সবিবাম-  
 দোষ (একটু থামা) ; জলবৎ প্রভূত মূত্র নিঃসরণ ; জলবৎ অতিসার ;  
 অনিচ্ছায় মল-মূত্র নিঃসরণ, মূত্রত্যাগকালে অজ্ঞাতমারে মলস্রাব ; শিব-মেনে,  
 নিম্ন-হস্ত ঝুলিয়া পড়া ; দিহ্বা ও মলদ্বাবেব পক্ষাঘাত ; মলদ্বাব হইতে  
 রক্তপাত ।

## মেনিয়াস্টিস ।

অনিয়মিত সবিবাম জবে প্রধানতঃ শীতাবস্থা প্রাপ্তান্ত থাকিলে এবং  
 শীত অসম্যকরূপে প্রকাশিত হইলে অর্থাৎ হস্ত, বা হস্তাঙ্গুলী প্রান্তভাগে,  
 অথবা পদাঙ্গুলী ও পদে শীত জন্মিলে কিম্বা নাসিকার অগ্রভাগ তুষারবৎ  
 শীতল হইলে, অথবা কেবল উদবে শীত ও কম্প জন্মিলে এই ঔষধ ব্যব-  
 হেয় । নাসিকার ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগেব তুষারবৎ শীতলতা ; এবং চাতু-  
 র্থক জরে জাহ্নুর নিম্ন হইতে জজ্বার শীতলতা ; এই ঔষধেব বিশেষ লক্ষণ ।  
 ফ্যারিংটন বলেন যে সবিবাম জরে নাসাগ্র, কর্ণ-প্রান্ত, ও অঙ্গুলীর অগ্র-  
 ভাগেব শীতলতা ; জাহ্নুপর্ধ্যন্ত পদের তুষারবৎ শীতলতা ; হস্তপদের তুষারবৎ  
 শীতলতা ও শরীরের অন্তঃস্থানের উষ্ণতা লক্ষণাপন্ন জরে ল্যাকেসিসও ব্যব-  
 হেয় হইতে পারে, কিন্তু ল্যাকেসিসেব লক্ষণে গাত্রের নীলবর্ণ ও অতিশয়  
 দুর্বলতা এবং তজ্জন্ত নাড়ীর সূত্রবৎ সূক্ষ্মতা থাকে ; মেনিয়াস্টিসে থাকে না ।

মেনিয়াস্থিগের অবের সময় ও প্রকৃতির স্থিতি থাকে না। জ্বরের লক্ষণ।  
—বায়সবৎ দুর্নিবাব ক্ষুধা; মাংসাহারে অতিশয় স্পৃহা, তৃষ্ণাশূন্য শীত;  
অগ্নির উত্তাপে শীতের লাঘব (রুদ্ধি, ইপি); হস্তাঙ্গুলী ও পদাঙ্গুলীর  
শীতাবিক্য; জালুপর্ষ্যস্ত পদদ্বয়েব শীতলতা, যেন শীতল জলে ডুবান রহি-  
য়াছে এরূপ অনুভব, হস্তপদেব তুষাববৎ শীতলতা, শরীরের অন্যান্য স্থানের  
উষ্ণতা। তৃষ্ণাশূন্য সর্বাঙ্গীন উত্তাপ; মস্তকে উত্তাপের আধিক্য; উত্তাপের  
বর্দ্ধিত অবস্থায় প্রলাপ; বলকে বলকে উত্তাপের আবেশ। সন্ধ্যা হইতে  
প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম। অঙ্গাক্রান্তবৎ শিরঃপীড়া।

## রসটক্সিকোডেগুন।

আর্দ্রগৃহে বা আর্দ্র শয্যায শয়ন, আর্দ্রবায়ু সেবন, শীতল জলে স্নান, হিম  
ভোগ, বৃষ্টিতে ভিজা, অধিকক্ষণ জলে বা আর্দ্রবস্ত্রে থাকা, গুরুদ্রব্যাদি তোলা,  
অঙ্গ মচকাইয়া যাওয়া, এবং বাত-দোষ প্রভৃতি কাণে বোগ জন্মিলে সাধা-  
রণতঃ রসটক্স ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রসটক্সেব লক্ষণ বিশ্রাম সময়ে উপস্থিত  
ও বিবর্দ্ধিত এবং সঞ্চালনে উপশমিত হয়। কিন্তু পক্ষাঘাত ও অবসন্নতা  
বিশ্রামে উপশমিত ও অধিক সঞ্চালনে বিবর্দ্ধিত হয়। রসটক্সেব লক্ষণে পর্য্যায়-  
শীলতা লক্ষিত হয় না। বিশ্রামে বোগেব লক্ষণেব বৃদ্ধি ও সঞ্চালনে উপশম  
রসটক্সেব প্রধান প্রযোগ-লক্ষণ। বিশ্রামে বৃদ্ধি ও সঞ্চালনে হাস ব্রাইওনিয়ার  
বিশেষ লক্ষণ। তান্তব-বিধানে রসটক্সেব ও মাস্তক-বিধানে ব্রাইওনিয়ার ক্রিয়া  
দর্শে। ব্রাইওনিয়া রসটক্সেব অনুপূর্বক। এজন্ত টাইকস অবৈ পর্য্যায়ক্রমে এই  
ছই ঔষধের বহুল ব্যবহাব দৃষ্ট হয়। রসটক্সেব বিব-ক্রিয়া বশতঃ অতিসার ও  
অবসন্নতা লক্ষণাপন্ন একপ্রকাব মুহন্নাসবায়ু অব উৎপন্ন হয়, অতএব পূর্বে  
সান্নিপাতিক লক্ষণবিশিষ্ট অবৈ এই ঔষব বিস্তব ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এক্ষণ  
উহার পবিবর্ত্ত সাধারণতঃ ব্যাপ্টিসিয়া প্রযোজিত হইয়া থাকে। কিন্তু  
সান্নিপাত অবৈ ও অন্যান্য প্রকাব অবৈ বাত-লক্ষণ থাকিলে রসটক্স দ্বারা  
অত্যন্ত উপকার দর্শে; অপিচ, জরগ্রস্ত বোগী যখন পৃষ্ঠের ও অঙ্গের  
বেদনা উপশমার্থে ক্রমাগত অবস্থান পবিবর্ত্তন করিতে থাকে, তখন এই

ঔষধি বিশেষ ফলোপকারক হইবে । ডাঃ ওয়াবল বলেন যে সরিষাপাত জ্বরে সংক্ষেপতঃ অতিশয় উপদাহিতা ও উত্তেজনার লক্ষণে রসটিক্ক ; এবং অম্লশ্লে-  
জনা, নিশ্চেষ্টতা ও পতনাবস্থার লক্ষণে ফসফরিক এসিড ব্যবহার্য্য । বোগ  
বিবর্জিত হইয়া উপদাহিতাব অবস্থা উগ্রত্ব হইলে রসটিক্কের পরিবর্তে  
আর্সেনিক ; এবং নিক্রিয়তার অবস্থার অত্যন্ত আধিক্য জন্মিলে ফসফরিক  
এসিডের পরিবর্তে কার্বোভেজিটেবিলিস প্রয়োজ্য । জ্বরের অগ্রভাগে  
রক্তবর্ণ ত্রিকোণ চিহ্ন সরিষাপাতাবস্থায় রসটিক্ক প্রযোগেব একটী বিশেষ লক্ষণ ।  
ডাঃ ক্যাবিংটন বলেন যে এক জজ্বার, সাধারণতঃ উষ্ণত শীতের আরম্ভ ;  
কাহাব ও কাহাব ওলা স্ক্লাম্বিৎসের মধ্যভাগে শীতের আৰম্ভ ; শীতাবস্থায়  
বিবর্তিকর শুষ্ককাস ( সিঙ্ক, মসক ) ; বাহিবে শীত, অন্তরে তাপ ; পিসাসা-  
ভাব ; সচরাচর শীতপিত্ত ও মুখেব লিকট অব-ফোট ( গ্ৰাট-মিউ ) ; এবং  
মুখমণ্ডল ব্যতীত শরীরেব অন্তঃস্থানে ঘর্ষ ( সিলিশিয়াব বিপরীত ) ; এই  
সকল লক্ষণে সবিস্ময়ভাবে রসটিক্ক ব্যবস্থেয় । ডাঃ ডনহাম “শীতাবস্থায়  
শুষ্ককাস” কেবল এই লক্ষণটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রসটিক্ক দ্বারা নিশ্চয় নিব্রম  
জবেব বোগী আবেগ্য কবিয়াছেন । স্বপ্ন-বিব্রম জবেও ওপিয়ম অপেক্ষা  
অগ্রগত মোহ-লক্ষণে ইহা ব্যবহৃত হইবে । ওলাউঠার পরবর্তী জ্বরে হানিমাম  
ব্রাইওনিয়া সহকায়ে পর্যায়ক্রমে রসটিক্ক ব্যবহাৰ করিতে বলেন । পৌনঃ-  
পুনিক জ্বরে ও ডেডুজবেও এই ঔষধ উপকারী । গল-গহ্বরেব শোথ,  
গল-কোষে ফোট, এবং গল-কোষ ও স্বরযন্ত্রে অসহ্য অবদমন ও বন্ধুত্বতা ;  
এবং অতিশয় দুর্বলতা লক্ষণাগ্ন ইনফ্লুয়েঞ্জা জবেও রসটিক্ক উপকারী ।

**জ্বরের লক্ষণ ।—**সবিরাম জ্বর ।—জ্বৰ আসিবাব পূর্বে  
অঙ্গমর্দ, জ্বন্তগ, চক্ষু-জ্বালা, মুখে শ্বেদা সঞ্চয়, শীতের পূর্বে ও শীতাবস্থায় বিব্র-  
তিকর শুষ্ককাস (সিঙ্ক, মসক ; উত্তাপাবস্থায় কাস, একন) ও অজ্ঞেব ক্রান্তি, সাধা-  
রণতঃ দিবসের শেষভাগে অর্থাৎ অপরাহ্ন ৫, ৬, ৭, ও ৮টার সময় জ্বরের প্রকাশ ।  
শীত ।—অবিরত শীতানুভব, বোধ হয় বেন গাত্রে শীতল জল পতিত হই-  
তেছে, অথবা শিবার অভ্যন্তর দিয়া শীতল রক্তপ্রবাহিত হইতেছে ; অপরাহ্ন  
৭টার সময় নড়িলে চড়িলে শীতানুভব ; পৃষ্ঠোপরি শীত, জলপানান্তে উহার



আধিক্য ; উদরে বেদনা বা অতিসার । উত্তাপ ।—উত্তাপাবস্থায় শীত-  
 পিত্তের প্রকাশ, আমাশয়-গহ্বরে চাপ ও ক্ষীততা, শিরার অভ্যন্তর দিয়া  
 উত্পন্ন রক্ত প্রবাহিত হওয়ার স্থায় সর্বাঙ্গীন উত্তাপ ; উত্তাপাবস্থায় পিপাসা  
 ও বারে বারে অল্প অল্প জলপান, অথবা পিপাসা পরিশূন্য অতিশয় উত্তাপ ।  
 ঘর্ম্ম ।—উত্তাপাবস্থায়ও ঘর্ম্ম, মুখমণ্ডলে ঘর্ম্মের অভাব, ঘর্ম্মকালীন উদ্বেদ-  
 গুলির প্রবল কণ্ঠস্বন, ঘর্ম্মেব অল্প বা ভাপনা গন্ধ, ঘর্ম্মকালে পিপাসা বা  
 পিপাসাশূন্যতা, ঘর্ম্মাবস্থায় নিদ্রা । শীতান্তে উত্তাপ ও ঘর্ম্ম, অথবা কোন  
 কোন অঙ্গে শীত কোন কোন অঙ্গে তাপ ( বেল ) কিম্বা যুগপৎ শীতোত্তাপ ;  
 প্রধানতঃ রাক্তিতে মুখেব শুষ্কতা বশতঃ পিপাসা ; অবিরত অস্থিবেদা, স্থির  
 হইয়া বসিয়া থাকিতে পাবা যায় না, শয্যায় অবিবত এপাশ ওপাশ করিতে  
 হয় ; কেবল অবিশ্রান্ত নড়িলে চড়িলে শান্তি জন্মে । স্বপ্নবিরাম জ্বর ।  
 —মোহ, প্রলাপ, অতিশয় দুর্বলতা, হ্রবিত অতিসার, শুষ্ক জিহ্বা, পিপাসা,  
 ও সন্নিপাত-লক্ষণ । সন্নিপাত জ্বর ।—অনিশ্রান্ত সঞ্চলন-প্রবৃত্তি, ও  
 তাহাতে ক্ষণস্থায়ী উপশম ; ঘূষ্টবৎ অনুভব সহ অবসন্নতা ও অবিবত বসিয়া  
 বা শুইয়া থাকিবার ইচ্ছা ; মস্তিষ্কে বেদনা সহ মস্তিষ্কে জড়তা অনুভব ; শুষ্ক,  
 জ্বালাকর উত্তাপ, অত্যন্ত মাথাধরা, এবং ঘাড়ের স্তম্ভতা ও অকুণ্ঠতা, সন্ধ্যা-  
 কালে ও নড়িলে চড়িলে উহার বৃদ্ধি, রোগেব প্রথম সময়ে অত্যন্ত তরুণ  
 অবস্থায় ঘাড় ও বৃককে সঞ্চবমান বেদনা, তৎসহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শ্রান্তি ও  
 আলস্ত, এবং তৎকালে জিহ্বাব মলাচ্ছন্নতা ও অল্প-কুঞ্জন সম্বলিত অভিলার ;  
 শীত শীত অনুভব, অঙ্গিপুটেব সংরোধ সহ শিবোঘূর্ণন, মুখমণ্ডলের বর্ণের  
 বৈলক্ষণ্য, গল-শোথ, ভুক্তদ্রব্য বমন, জন্তণ ; চক্ষুপরি মৃদু ও শুষ্ক চাপ,  
 আলোক ও শব্দে বিবেদ ; তন্দ্রাদোষ ; স্মৃতিহীনতা ; প্রলাপ-প্রবণতা ; নিম্ন  
 ওষ্ঠ ও জিহ্বার কৃষ্ণাভা । দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থাব অচৈতন্য ও অবসন্নতার  
 প্রাবল্য, তৎসহ অত্যন্ত শ্রান্তি, তজ্জগ্ন একেবারেই নড়িতে চড়িতে অশক্তি ;  
 ধীরে ধীরে ও আরাসে মানসিক ক্রিয়াসম্পাদন, ধীরে ধীরে, কখনও বা  
 তাড়াতাড়ি, কিন্তু পরিণত কপে জিজ্ঞাসিত বিষয়েব উত্তর প্রদান, আপনা-  
 পনি ( স্বগত ) অসংলগ্ন আলাপন, বিশেষতঃ দুইপ্রহর রাক্তিব পরে, নাসিকা  
 হইতে রক্তপাত ; শুষ্ক, ও কপিণ চিপটিকাচ্ছ ওষ্ঠ ; জিহ্বা পরিণত অনুভব,

অথবা পরিশুদ্ধতা অনুভূত না হইলে চৰ্ম্মাবৃত্তবৎ অনুভব ; শুষ্ক, সৰ্ম্মত্র আৱৰ্ত্ত জিহ্বা, নিদানপক্ষে জিহ্বাব অগ্রভাগে শুষ্ক, আৱৰ্ত্ত, ত্ৰিভুজাকাৰ চিহ্ন, ও তৎসহ পানেন প্রবৃত্তি ; সৰ্ম্মপ্রকাৰ আহাৰে অপ্রবৃত্তি ; তীব্র চিমটি কাটার জ্বায় বেদনা সহকাৰে উদরের ক্ষীণতা ; অতিশয় হৰ্গক্ষময় অপান, অতিসাব, রাত্রিতে অতিসারের আধিক্য, নিদ্রাবস্থায় অজ্ঞাতভাবে মল নিঃসৰণ, উদর-বেদনা সম্বন্ধিত রাত্রিকালীন অতিসার, মলপ্রাবাস্তে উদর বেদনার বিরতি তৎসহ শিৰঃপীড়া ও সমস্ত অঙ্গে বেদনা ; হৃৎশ্লেষ্মা রক্তাক্ত নিম্নীবন বিশিষ্ট কাস ; বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ, কুসকুসেব নিম্নতব অংশে কুসকুস প্রদাহ জনিত বস-প্রসেক ; অঙ্গে বাতের তীব্র বেদনা, বিশ্রামকালে উহাব আধিক্য ; অস্থিরতা ; ব্রহ্মকন স্বপ্ন সংযুক্ত অস্থির উৎকণ্ঠিত নিদ্রা, বারবাব জাগরণ, অথবা তদ্ভাবৎ নিদ্রা, ও তৎসহ-কাৰে নাসাবব, মুছপ্রলাপ, শয্যাবস্ত্র খুঁটন ; বর্ষশূন্য উত্তাপ বা বর্ষ, তৎকালে বোগীর আবৃত্ত থাকিবাব ইচ্ছা ; মস্তিষ্কেব গুরুতব আক্রান্ততা এবং হস্ত-পদের দেশীয় অনৈচ্ছিক সঞ্চলন ; রক্তবর্ণ উদ্বেদ ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্বেদ, অতি-শয় অবসন্নতা ; বিনৰ্ঘ, উৎসাহহীন, সাহসশূন্য, নিবাস প্রকৃতি। সূতিকাজ্বর ।—দূষিত ও দুৰ্গন্ধি, দীৰ্ঘকাল স্থায়ী, অথবা বাবংবাব প্রত্যায়ত্ত প্রসবা-ত্তিকপ্রাব, সৰ্ম্মাস্মীন উত্তাপ সহ স্তম্ভ-বিলোপ ; অস্থিবতা, স্থস্থিবভাবে গমন কৰিয়া থাকিতে পাবা যায় না, অবিবত অবস্থান পৰিবৰ্ত্তন কৰিতে হয়, তাহাতে ক্ষণকাল উপশম জন্মে, মণ্ড মন্দ জ্ব, শুষ্ক জিহ্বা, নিম্নাঙ্গর শক্তিশূন্যতা।

—\*—

## লাইকোপোডিয়ম ।

প্রতিদিন বা একদিন অন্তৰ একদিন অপেক্ষা তিন চাবিটাব সমন্ব শীতের সমাগম, ও মধ্যবর্তী দাহাবস্থা ব্যতীত শীতের পরেই ঘটেব প্রকাশ ; অথবা অল্প বয়নবিশিষ্ট পূৰ্ব্বোক্ত সময়ে উপাস্ত কেবল শীত, কিম্বা শীতোত্তাপ বিশিষ্ট সবিরাম জ্বরে লাইকোপোডিয়মেব ব্যবহার আছে। টাইফয়েড জ্বরেব প্রারম্ভাবস্থায় লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিলে এই ঔষব ব্যবস্থা কবা যাইতে পাবে। টাইফয়েড জ্ববে চতুৰ্দশ বা পঞ্চদশ দিবসে উক্ত জ্বৰেব স্বভাবসিদ্ধ পীড়কা প্রকাশিত

না হইয়া রোগীর সংজ্ঞাহীনতা, মুদ্রপ্রলাপ, শয্যাবস্ত্র খুঁটন, উদবেগ স্বীততা, অতিশয় অঙ্গ-কুঞ্জন, কোষ্ঠবদ্ধ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্থানে স্থানে আকস্মিক উৎক্ষেপ, অনিচ্ছায় মূত্রনিঃসরণ বা মূত্রস্ফুট, শব্দায় মূত্র পরিত্যক্ত হইলে শয্যাবস্ত্রে ক্রীষং লোহিতবর্ণ রেণুর আয় অধঃক্ষেপ নিপতন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবস্থের। টাইফয়েড জ্বরে ইহা অপেক্ষা মন্দাবস্থারও লাইকোপোডিয়ম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। দীর্ঘকাল স্থায়ী জ্বরের উদ্ভাপ বশতঃ যখন মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের সম্ভাবনা উপস্থিত হয় ; রোগী অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে ; চক্ষুর জ্যোতি জ্ঞান থাকে না, এবং উদ্বিগ্নকে মৎস্তের চক্ষুর আয় দেখায় ; নিম্ন হস্ত ত্রীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে ; খাসে নাশারব ও ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে ; ফুসফুসে বায়ু গমনাগমন সময়ে শ্লেষ্মাব ঘড় ঘড় শব্দ শুনা যায় ; মূত্র অজ্ঞাতভাবে নিঃসৃত হয় বা বিলুপ্ত থাকে এবং নাকী বৈষম্য-দোষবিশিষ্ট ও দ্রুত হইয়া উঠে তখনও লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হয়। এই প্রকার অবস্থায় যদি ঔষধে কোন উপকার দর্শে তবে লাইকোপোডিয়ম দ্বারা বোগীর প্রাণরক্ষা পাইতে পাবে। এই সকল সন্নিপাতাবস্থায় জিহ্বা দৃষ্টেও লাইকোপোডিয়ম নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। বোগীর জিহ্বা স্বীত বোধ হইলে এবং সে উহা বাহির কবিত্তে না পারিলে, অথবা বাহির করিলেও জিহ্বা ঘটিকায়ন্ত্রেব পবিদোলকেব আয় আন্দোলিত হইলে ; অধিকন্তু প্রায় সর্বদা পরিণুক্ত ও ফোকাবিশিষ্ট থাকিলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবস্থা করা যায়। অপর, টাইফয়েড জ্বর, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে এক পায়েব শীতলতা ওজন্ত পায়েব উষ্ণতা লাইকোপোডিয়মের একটী বিশেষ প্রয়োগ-লক্ষণ। ফুসফুসেব পুৰোৎপত্তি জনিত বিলোপী-জ্বরে, বিশেষতঃ বাম অপেক্ষা দক্ষিণ ফুসফুস সমধিক আক্রান্ত থাকিলে লাইকোপোডিয়ম ব্যবহাব করা যাইতে পারে।

শরীরেব উদ্ধাংশের শীর্ণতা ও নিম্নাংশেব স্বীততা ; একাকী থাকিত্তে অতিশয় ভয় ; সর্বদা উদবে পবিত্তপ্তি অথবা নিম্নোদবে পূর্ণতা অমুভব ; অপবাহ চারি ঘটিকাব সময় রোগেব বৃদ্ধি ও সায়াহে হাস প্রাপ্তি , মূত্রে রক্তবর্ণ বেণু ; অস্ত্রে বায়ু উৎপত্তি ,—এই গুলি লাইকোপোডিয়মেব বিশেষ লক্ষণ।

**জ্বরের লক্ষণ।**—অপরাক্ষ ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত হস্ত-  
পদের অবশ্যতা সহকারে শীত; অপরাক্ষ ৭টার সময় স্বপ্নপূর্ণ নিদ্রা হইতে  
জাগরণান্তে শরীরের তুষারবৎ শীতলতা ও অগ্ন ঘর্ষাক্রিয়া; তৎপরে প্রবল  
পিপাসা। বিবমিষা ও বমন, তৎপরে শীতের পরেই অন্তর্বর্তী উত্তাপাবস্থা  
ব্যতীত ঘর্ম্ম; শীত ও তাপাবস্থার মধ্যবর্তী সময়ে একপ্রকার অগ্ন বমন;  
শীতের পরে মুখমণ্ডল ও হস্তের ক্ষীততা; সমগ্র শরীরে, প্রধানতঃ সন্ধ্যাকা-  
লের প্রাক্কালে, ঝলক ঝলকে উত্তাপের আবেশ, ও এক একবার একটু  
একটু করিয়া বারম্বার জল পান, কোষ্ঠবদ্ধ ও ঘন ঘন মূত্রতাগ। সন্ধি-  
পাত জ্বর।—হতবুদ্ধিতা, মূহপ্রলাপ, কণ্ডু-স্পন্দন, অস্ত্রকুঞ্জন, ও কোষ্ঠ-  
বদ্ধ লক্ষণাপন্ন টাইফসজ্বর। ক্যালকেমিয়ার পরে, পীড়কা ধীবে ধীবে বা স্বল্প  
পরিমাণে প্রকাশ পাইলে, তজ্জাদোষ সংযুক্ত হতবুদ্ধিতা, মূহপ্রলাপ, অস্পষ্ট-  
বাক্য, শলোচ্চাবণে ভুল, মুখমণ্ডলের পীতবর্ণ, নিমগ্ন মুখাকৃতি, নিম্ন হৃদয়-  
অধঃপতন, বিকশিত মুখ ও নাসা রক্তেব পাখার ভ্রায় সঞ্চালন সহকারে মন্দ-  
শ্বাস; প্রভৃতি লক্ষণ; জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বা সমগ্র  
শরীরেব উৎক্ষেপ; শয্যা-হাতড়ান; তির্যক্ দৃষ্টি; কম্পন; আটোপ  
ও কোষ্ঠবদ্ধ সহ উদবেগ ক্ষীততা; মূত্রকৃচ্ছ বা খটিকাব জলেব ভ্রায় মূত্র;  
মলিন আঠা আঠা জিহ্বা; তরল, ঘড় ঘড় শব্দ বিশিষ্ট কাস, শীতল হস্তপদ,  
অথবা এক পা শীতল অপর পা উত্তপ্ত, অস্থি নিদ্রা, সকল প্রকার  
অবস্থানেই অশান্তি, উৎকর্ষাপূর্ণ স্বপ্ন ও অস্বোৎক্ষেপ; জাগ্রত হইবাব  
সময় কোপনতা, বিবক্তি ও তিরহাস, অথবা যেন স্বপ্ন দেখিয়া ভীতবৎ  
জাগরণ; অতিশয় শীর্ণতা ও আভ্যন্তরিক দুর্বলতা, এমন কি পক্ষাঘাত,  
উদ্ধ্বাসের শীর্ণতা, নিম্নাঙ্গের ক্ষীততা।

## লেপ্টাণ্ডা।

**জ্বরের লক্ষণ।**—স্বল্পবিরামজ্বর।—নাড়ীবেগেব লাঘব;  
কোমল ও পূর্ণ নাড়ী; আলকাতরার ভ্রায় কাল, অথবা দুর্গন্ধি শাদা মল  
লক্ষণাবিত শিশুদিগের স্বল্পবিরাম জ্বর। অতিশয় আলস্ত; কম্প প্রবণতা,

তৎসহ গাত্র-স্পর্শ-দেয় ও খঞ্জতা অনুভব ; স্থিতি, গাত্র-ত্বকের উত্তাপ ও রক্ষতা ; মলিন, দুর্গন্ধি, আলকাতবায় জ্বায় বা জলবৎ, বস্তাক্ত আমিশ্রিত মল, এবং পাণ্ডু লক্ষণাপন্ন পিত্তজ্বর । সন্নিপাতজ্বর ।—পৈতিক টাইফয়েড জ্বর ; অতিশয় অবসন্নতা, স্থিতি, ত্বকের উত্তাপ ও রক্ষতা ; দেহ-শাখার শীতলতা ; মলিন, দুর্গন্ধি, আলকাতবায় জ্বায়, অথবা জলবৎ, বস্তাক্ত আম-মিশ্রিত মল, আমাশয়-গহবরে দুর্বলতা ও শূন্যতা অনুভব ; উদরোদ্বিগ্ন ও কুক্ষিদেবে বেদনা, পাণ্ডু, শিরোঘূর্ণন ও তন্দ্রানুতাসহ শারীরিক ও মানসিক অবসাদ ।

## লোবিলিয়া ।

সবিরামজ্বর ।—শীতের পূর্বে পিপাসা, জলপানান্তে কম্পকব শীত ও শীতলতার বৃদ্ধি ; পৃষ্ঠেব নিম্নভাগে শীত, আমাশয়ে উত্তাপ, সর্দঙ্গীন শীত ; পিপাসা ও ঘর্ম্ম সহ উত্তাপ । মধ্যাহ্ন সময়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী কম্প সংযুক্ত প্রাত্যহিক জ্বব, তৎপরে উত্তাপ ও ঘর্ম্ম, পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত নিদ্রাবস্থায় ঘর্ম্মের অবস্থিতি । জ্ববে স্বাৎ-কষ্ট উপসর্গ ।

## ল্যাকনাহিস ।

জ্বরেরলক্ষণ ।—সবিরামজ্বর ।—শীতাবস্থায় \*চক্ষু প্রদীপ্ততা, ও শরীরের তুষাবৎ শীতলতা এবং উষ্ণ প্রয়োগে শীতের শাস্তি । সন্নিপাত জ্বর ।—গালের সীমাবদ্ধ আরক্ততা ও \* প্রদীপ্ত চক্ষু সহকালে জ্বর ; জ্বালকর উত্তাপ, দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তাপের আধিক্য ; রাত্রিতে অস্থির নিদ্রা, তৎসহ ক্রমাগত বিবর্দ্ধিত গল-শোথ, ও তজ্জন্ত রাত্রিতে অনিদ্রা ; রাত্রিতে স্বপ্নপূর্ণ অস্থির নিদ্রা, তৎপরে ঘর্ম্ম ; বক্ষঃস্থলে ও হৃৎপিণ্ডের চারিদিকে উত্তাপানুভবসহ শিরোঘূর্ণন ; শিরোবেদনা বর্ণতঃ নাকেকাঁদা ; অতিশয় বহুভাষিতা, তৎপরে হতবুদ্ধিতা ও কোপনতা ; শরীরেব তুষাবৎ শীতলতা, বাহ্যিক উত্তাপ প্রদানে তাহার উপশম ; শীতল, আর্দ্র, ও আঠা আঠা গাত্র-ত্বক্ ; পর্যায়ক্রমে শীত ও ঝলকে ঝলকে উত্তাপাবেশ ; \* সান্নিপাতিক ফুসফুস-প্রদাহ ।

## ল্যাকেসিস ।

(১) গাত্র-ত্বকের সবিশেষ স্পর্শাশুভাবকতা; (২) বাসদিকে রোগের অধিকতর প্রভাব; এবং (৩) নিদ্রাব পবে রোগের সমস্ত লক্ষণের বৃদ্ধি; এই তিনটি ল্যাকেসিসের সার্বভৌমিক লক্ষণ। এই ঔষধ স্জাপক প্রায় সমস্ত রোগেই এই সার্বভৌমিক লক্ষণগুলির বিদ্যমানতা দৃষ্ট হয়। ল্যাকেসিসের ক্রিয়ায় বহুভাবিতা জন্মে। এই বহুভাবিতায় বোগী শীঘ্র শীঘ্র এক বিষয়, পরিভাগ করিয়া বিষয়াস্তবে উপনীত হয়। ঈদৃশ ব্যবদুকতা ল্যাকেসিসের একটা বিশেষ লক্ষণ। সন্নিপাত জরে ও অন্ত্রাশ্র রোগের সন্নিপাতাবস্থায় উল্লিখিত ব্যবদুকতা ল্যাকেসিস প্রয়োগের একটা বিশেষ লক্ষণ। মলের ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ ল্যাকেসিসেব আব একটা বিশেষ লক্ষণ। ডাঃ ডনহাম বলেন যে, পেশীর শক্তিব অভাব, মাড়ীর মন্দতা ও কোমলতা, এবং বুদ্ধিশূন্য প্রলাপবাক্য প্রভৃতি ল্যাকেসিসেব লক্ষণ দ্বারা অতিশয় অবসন্নতা প্রতিলক্ষিত হয়। এই অবসন্নতার সহিত ধামনিক বা মায়বীর উত্তেজনা বিদ্যমান থাকিলে আসেনিক, ও শক্তিহীনতার অত্যন্ত আধিক্য থাকিলে কার্কেডোজিটেবিলিস, এবং এই ঔষধদ্বয়েব মধাবস্তী অবস্থাব অবসন্নতায়ই ল্যাকেসিস উপযোগী। এই প্রকাব অবস্থায়ই টাইফয়েড জরেও ইহা উপকারী। ডাঃ ক্যারিংটন বলেন যে, ল্যাকেসিসেব মানসিক লক্ষণাশ্রুদাবে সন্নিপাত জরে ল্যাকেসিস পবমোপকারী ঔষধ। টাইফয়েড জরের প্রবদ্ধিত অবস্থায় যখন রোগী অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে তাহার নিম্ন হস্ত খুলিবা পড়ে, ও মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত-সম্ভাবনাব অন্ত্রাশ্র লক্ষণ প্রকাশ পায় তখনও ল্যাকেসিস ব্যবস্থা করা যায়। শরৎকালেব অব কুইন্সহীন ব্যবহার সবেও যে জর বসন্ত কালে প্রত্যাবৃত্ত হয় তাহাতেই ল্যাকেসিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপরাহ্ন একটা বা দুইটার সময় শীত; \* উষ্ণ থাকিবার ক্ষমতা তত নথ, কিন্তু স্থির থাকিবার ক্ষমতা শীতাবস্থায় গাত্রে রাসীকৃত বস্ত্রপ্রদানের প্রয়োজন অল্পতব (এইটি ল্যাকেসিসেব বিশেষ লক্ষণ। চাপিয়া ধরিয়া রাখিবার অভিল্য জেগসিমিমমেও লক্ষণ); উত্তাপাবস্থায় তীব্র দাহ; বক্ষঃস্থলে ও কৃৎপিণ্ডে গোবব, এবং তৎসহকারে তন্ত্রালুতা বা বহুভাবিতা এই ঔষধের ব্যবস্থা-লক্ষণ। জন্ম বা অধিক লবণাক্ত দ্রব্য আহাশ বশতঃ জবের প্রকাশ বা পুনরাগমন;

পারদ বা অধিক কুইনাইন সেবনেব পববর্তী পুৰাতন সবিবাম জ্বব; নিবৃত্ত-  
রজ্জ্বা, ও মদ্যপাযীদিগের তৃতীয়ক জ্বরে ল্যাকেসিস উপকার কবে ।  
ল্যাকেসিস ও লাইকোপোডিষম অনেক সময় পর্যায়ক্রমে বাবজত হয়;  
ল্যাকেসিসের পবে নাটম মিউবিষেটিকম ভাল খাটে ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিবাম জ্বর ।—শীতের পূর্বে পিপাসা ;  
দন্তে দন্তে সংঘর্ষণ ও বাহ্যিক উত্তাপ প্রাপ্তিব ইচ্ছা সহকাৰে সৰ্ব্বাপন্ন শীত ;  
কম্পকর, অবশতাজনক শীত, পৃষ্ঠদিয়া মস্তকে শীতের উত্থান (তৃতীয়ক জ্বর);  
\* একবার শীত, একবার তাপ এবং শীতোক্তাপের স্থান-বিকল্পতা; অপবালে  
শীত, তৎসহ অঙ্গে প্রবল বেদনা ও ফুসফুস-বেঠে হৃচী-বেধ, বক্ষঃস্থলে যাতনা,  
এবং আক্ষেপিক অঙ্গ-সঞ্চলন । উত্তাপাবস্থায় প্রবল শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডলেব  
নীলবর্ণ, হ্রস্বলতা; রাত্রিতে বিশিষ্টরূপে হস্ত-পদেব উত্তাপ; \* শীতল পদ  
সহকারে অন্তবে উত্তাপ অনুভব । প্রভূত ঘৰ্ম; অতিশয় ঘৰ্ম প্রবণতা;  
পীতবর্ণ ও শীতল ঘৰ্ম, অথবা রক্তাক্ত ও বস্ত্রবস্ত্রবর্ণকর ঘৰ্ম । \* বসন্ত-  
কালের সবিবাম জ্বব, অথবা শবৎকালে কুইনাইন দ্বাবা অবরুদ্ধ বসন্তকালে  
প্রত্যাবৃত্ত জ্বব, অপরাহ্নের প্রথমভাগে জ্বরের বৃদ্ধি; উত্তাপাবস্থায় বহুতাবিতা ।  
**সন্নিপাত জ্বর ।**—মৃদুপ্রলাপ সংযুক্ত স্থপ্তি; সম্যক ইন্দ্ৰিয়-জ্ঞান পরিশূন্যতা;  
অতিশয় বাচালতা সংযুক্ত প্রলাপ, অনবরত এককিষয় হইতে বিষয়াস্তুর  
পরিভ্রমণ; যেন মৃত্যু হইয়াছে এবং অস্ত্রোষ্টি-ক্রিয়ার আয়োজন হইতেছে  
বোগিণীর একপ অনুভব; নিমগ্ন মুখমণ্ডল; মুখ বিক্ষারিত; করিয়া অধিক  
নিদ্রা; পরিশুদ্ধ, আরক্ত, বা কৃষ্ণবর্ণ, বিদাবিতাগ্র, বাহির করিলে প্রাকম্পিত  
বা নিম্নের দন্তে আবদ্ধ জিহবা; নাসিকা হইতে মলিনবর্ণ রক্তপাত; ক্ষীণ,  
প্রভাশূন্য, বা বিকৃত চক্ষু; আলোকে বিদেষ; বধিরতা, কর্ণে সপ্‌সপ্‌ বা  
গুড়্‌গুড়্‌ ধ্বনি; মুখেব পবিশুদ্ধতা ও অবিবত পান-প্রবৃত্তি; বধিবতা  
সহকাৰে গলা-বেদনা; উদবেব ক্ষীণতা, এবং অতিসাৰেব পূর্বে অল্প-  
কুজন । বাঁধাই হটক বা পাতলাই হটক মলে অতিশয় দুৰ্গন্ধ; আরক্ত-কণিশ  
ও প্রভূত মূত্র; অস্পষ্ট অনুনাসিক বাক্য; শ্বাসকৃচ্ছ, কাস, ও আঠা আঠা  
বক্তাক্ত নিগ্ধবন; \* শয্যাশ্রুত, প্রদাহিত ক্ষত, ক্ষতে কৃষ্ণবর্ণ অনুভব; বস্ত্রপ্রাব,  
রক্তের দগ্ধত্বের শ্রাব আকৃতি, প্রতিনিবত অনিদ্রা, অথবা সৰ্বদা নিদ্রাস্থে

ইক্ষি। সূতিক। স্বর।—দুর্গন্ধি প্রসবাস্তিক শ্রাব, মূত্রনাশ, অচেতন্য ; উদরেব শীততা, জ্বাষু প্রদেশে অল্পমাত্র প্রচাপন, এমন কি কাপড়ের চাপ পর্য্যন্তও সহ্য কবিত্তে পাৰা যায় না ; মল বেন বক্ষস্থলে উঠিতেছে এপ্রকাৰ অনুভব, বক্রপাতে জ্বাযুব যাতনার সেই সময় একটু শান্তি কিন্তু পরক্ষণেই প্রত্যাবৃদ্ধি, নিজাব পবে বৃদ্ধি।

## ফাভিসেথ্রিয়া ।

শীতাদ অর্থাৎ দস্তমূলাদি হইতে সহজে বক্রশাব লক্ষণ সংযুক্ত তৃতীয়ক অব ; \* শীত ও শীতলতাব প্রাধান্ত ; অপবাহু ওটাব সময় শীত, ষাড় হইতে মস্তকে শীতের উত্থান অথবা পৃষ্ঠ দিয়া অবতরণ, উষ্ণগৃহে শীতের আধিক্য, ও অনাবত বায়ুতে পবিশ্রমে হাস ; বাত্রিকালীন উত্তাপ, গাত্রেব আবরণ-বস্ত্র ফেলিয়া দেওয়ার ইচ্ছা ; পিপাসা, তৎপরে প্রাতঃকালের প্রাক্কালে শীত, প্রভূত ঘর্ম্ম, অনাবত হইবাব ইচ্ছা, কপালে ও পাবে শীতল ঘর্ম্ম। কম্প-জ্বরের পূর্বে ও পবে বায়সবৎ ক্ষুধা।

## ফ্রোমোনিয়ম ।

জ্বরের লক্ষণ।—সবিরাম জ্বর।—সমস্ত শরীরের, \* বিশেষতঃ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শীতলতা ; শীতাবশাব মস্তকেব উত্তপ্ততা ; আবৃত থাকিতে অনিচ্ছা। উত্তপ্ত, আরক্ত মুখমণ্ডল ও শীতল পদ। প্রবলজ্বর ; সমুদয় গাত্রেব, \* বিশেষতঃ মুখমণ্ডল ও মস্তকেব জ্বালাকব উত্তাপ (বেল)। সমস্ত শরীরে শীতল ঘর্ম্ম। (এন্ট টাট, আর্স, কুপ, ডিজি, তিরিট)। সম্মিপাত জ্বর।—জ্ঞানশূন্যতা, নৃদ্ধিভ্রংসতা, ইন্দ্রিয় সকলের অস্থি ; প্রবল শরীরবান্দোলন সহ প্রলাপ, বিভীষিকা দর্শন এবং দৃষ্টি ও শ্রতিরভ্রম, গানকরা, সীস দেওয়া, এবং অনিচ্ছায় অবিবত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও দেহেব বিকৃত মঞ্চলন ; ঘালিশ হইতে বারংবার মস্তকের উত্তোলন বা উৎক্ষেপণ ; আক্ষেপিক



মুখ-ভঙ্গি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রুতি শক্তি, ও বাঞ্ছনীয় বিলোপ; সকল বস্তুই তিৰ্য্যাক্ দৃষ্ট হয়, প্রসারিত ও আলোকজ্ঞান পৰিশূন্য চক্ষুৰ তারা; সশব্দ শ্বাস সহ তন্দ্রা দোষ ( কোমা ); অভ্যস্তকৰ তপ্ত ঘৰ্ম, কিন্তু ঘৰ্ম নিঃসরণে শাস্তিব অভাব, বক্ষঃস্থলে লোহিত বর্ণ পীডকা, সমগ্র মুখের অভ্যস্তর ভাগ অবদীর্ণবৎ; মুখের শুকতা, তজ্জন্ত সকল দ্রব্যেবই তৃণব ছায় স্বাদ; জিহ্বাব পক্ষাঘাত, ও বাহিৰ কবিন্দে উহাব কম্পিত গতি, গলাব পনি-শুকতা বশতঃ গিলিতে সম্পূর্ণ অশক্তি, মল বা মূত্র বোধ, অথবা ঘণ্টায় ঘণ্টায় জৈয়ৎ কৃষ্ণবর্ণ, পচানাংসগন্ধা অতিসার, অপযাপ্ত অনৈকিক স্নৰ-স্রাব ।

## সলফার ।

ডাঃ ফাৰিংটন বলেন যে, সলফাৰেব সহিত প্রায় সকল ঔষধেবই কিছু না কিছু সম্বন্ধ আছে । এজন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ কৰিবা ভালৰূপে প্রতিক্রিয়া না জন্মিলে সলফাৰ ব্যবহৃত হইবা থাকে । ঔষধেব ঐদৃশ প্রতিক্রিয়াব অসম্যাকতায যে কেবল সলফাৰই ব্যবহৃত হয় এমন নহে সোৰ্বিগম ও কুপ্র-মাদিরও ব্যবহাব আছে । তৰুণ বোণে সলফাৰ ও পুৰাতন বোণে সোৰ্বি-গম অধিক ব্যবহৃত হয় । আৰাব এলোপ্যাথি বা কবিরাজি নহে উষাবীৰ্য্য ও বিনিশ্র ঔষধ-সেবিত নোগাদিগেব হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কৰিতে হইলেও অথনে তৰুণ বোণে দুই একমাত্রা নয়ভমিকা, ও পুৰাতন বোণে দুই একমাত্রা সলফাৰ প্রয়োগ কৰিবা কিংবাল প্রতীক্ষা কৰাব রীতি আছে । তৎপরে এতদ্বাবা বোণেব কিতুণ পৰিবৰ্ত্তন ঘটে তাহা দেখিয়া ঔষধ ব্যবস্থা কৰিতে হয় ।

সলফাৰ প্রয়োগোপযোগী বোণে প্রানই রক্ত-সঞ্চলনেব বিশৃঙ্খলা থাকে । শৈবিক রক্ত-সঞ্চলনেই প্রধানতঃ সলফাৰেব ক্রিয়া দৰ্শে বলিষা বোধ হয়, এবং ইহাব ক্রিয়াব এক প্রকাৰ বক্তাধিক্য জন্মে । কিন্তু এই বক্তাধিক্য বাস্ত-বিক সৰ্ব্বাঙ্গীন বক্তাধিকা নহে; বক্তঃ-সঞ্চলনেব অসামঞ্জস্ত বশতঃ শরী-বেব বোন কোন স্থানে বক্ত-সঞ্চব মাত্র । যত্ন-শিবাব বক্ত-পূর্ণতা জন্ত সচরাচৰ এই সকল বক্তসঞ্চয় সমুৎপন্ন হয় । সলফাৰেব ক্রিয়াজনিত বক্তসঞ্চ-

মনেব বৈষম্যের একটা দৃষ্টান্ত স্থল অব। সন্নিপাত স্বব বা পূর্ব-দৃষ্ট বস্তু জনিত জবে এই ঔষধের বিশেষ ব্যবহার নাই। স্কার্বেটিনা, টাইফয়েডজ্ব ও পারিসিকজ্বের সাধারণতঃ শোণিতের যে প্রকার বিধান বিকাব জন্মে, সলফারে রক্তের তদ্রূপ পরিবর্তন যে সাধিত হয় তাহাব কোন নিদর্শন পাওয়া যায়না। স্বল্প-পিবাম বা অবিবাম জবে সলফাব ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বিশুদ্ধ প্রাদাহিক জবে একোনাইট ব্যবহার কবিয়াও বোগীর গাত্রেব উত্তাপ ও পবিশুদ্ধতা থাকিযাগেলে এবং প্রাচীক্ৰিয়া বা জ্ব-বিচ্ছেদদর ঘৰ্ষ না হইলে এবোনাইটের পব সলফাব ব্যবহৃত হইতে পারে। এই জ্বের একেবারে বিবাম হয় না বলিয়া উহাকে অনিবাম বা স্ত জ্বর; অথবা সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি ও প্রাতঃকালে একটু হ্রাস পড়ে বলিয়া সন্ত-সারিবান বা স্বল্পবিবামজ্ব বলে। ঈদৃশ জ্বের সন্নিপাতাবস্থা উপস্থিত হইবার উপক্রম জন্মিলে অর্থাৎ উন্মাদ-দোষ, জিহ্বাব পবিশুদ্ধতা এবং উহাব শিথল ও প্রান্তভাগের আব-ক্ততা, জিহ্বাসিত প্রেশের ঘৌবে দীর্ঘ উত্তবদান, ও অতিশয় দাহ-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সলফার ব্যবহার করা যায়। সানিবাম সুবেও সলফাব প্রয়ো-জিত হইয়া থাকে। রোগীর নিশ্চেষ্টতা ও বাবে বোধে জিহ্বাসিত কথাব উত্তব-দান, স্নানীকীচত ঔষধ প্রয়োগেও জ্বের অনিয়ন্ত্রিত, বিশেষতঃ সবিবাম জ্বের স্বল্পবিবাম জবে অথবা স্বল্পবিবাম জ্বের সানিবাম জবে পরিণতি;— এই সকল লক্ষণে সলফাব ব্যবহৃত হয়।

ম্যালোরিবা জনিত পুণাতন জবে ডাঃ কুপার সলফাবের অতিশা প্রশংসা করেন এবং এই প্রকাশ জবে তিনি ইহাব মূল অবিষ্ট ব্যবস্থা কবিয়া থাকেন। ফলতঃ তদ্রূপ জবে ইপিথাক যেকপে ব্যবহৃত হয়, পুণাতন জবে সলফাব সেইরূপে সমবিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বোগীর লক্ষণগুলিব অপরিষ্কটতা নিবন্ধন বন্ধন প্রকৃত ঔষধ নিকপণ করা যায় না তখন সলফাব প্রয়োগ কারণে অপ্রকাশিত লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়া বোগের প্রকৃত প্রকৃতি পবিশুদ্ধ হইয়া পড়ে। এইরূপে সলফাব দ্বারা অস্ত্র ঔষধ নিস্যাচনে সাহায্য হয়। এবং কখন কখন কেবল সলফাব সেবনেও বোগ আবোগা হইয়া থাকে। (ইপি-কাক দ্রষ্টব্য)। চন্দ্র বোগ সহসা বিলোপেণ পববর্তী জ্বর, কুইনাইন সেবনে অবরুদ্ধ জ্বর, ও দোষ-বাত্ত দৃষ্ট ব্যাক্তিদিগের জ্বের এই ঔষধ বিশেষ ফল-

প্রদ । সবিরাম জরে কুইনাইন অপেক্ষা সলফার অধিকতর ব্যবহৃত হইলে নির্বিক্সে আবেগ্য লাভের অধিকতর সম্ভাবনা ।

**বিশেষ লক্ষণ ।**—মুখমণ্ডলের বর্ণের অপ্রগাঢ়তা ও সহজে ক্রোধের উদ্দীপনা; ক্ষীণদেহ ও কুজভাবে হাঁটা; ত্বকের ধবস্পর্শতা ও চর্ম্মবোগ-প্রবণতা; গাত্রে একপ্রকার বিশেষ দুর্গন্ধ, দেহ-তত্ত্ব ও কেশের স্থলত্ব; প্রাকালন ও স্নানে অস্থির বুদ্ধি; মস্তক-শিথিল ( মাথাব টাঁদি ) সর্বদা উত্তাপ, পা শীতল, কিছু পদতলে জ্বালা; শেষ রাত্রিতে বা অতি প্রত্যুষে মল-বেগ, শয্যা হইতে উঠিতে বিলম্ব সহ হয় না । হ্রাস-বুদ্ধি ।—সাবাহে বা দুইপ্রহর বাত্রির পবে, শয্যার উত্তাপে; বিশ্রামকালে, দণ্ডায়মান সময়ে, স্পর্শে, প্রক্ষালনে বা স্নানে; ও অনাবৃত বাবুতে বৃদ্ধি । সঞ্চালনে; ও বিচরণে উপশম ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—শীত ।—পিপাসা-শূন্য আভ্যন্তরিক শীত, অথবা একই সময়ে বাহ্যিক শীত আভ্যন্তরিক উত্তাপ ও আরক্ত মুখমণ্ডল, অনন্তর পিপাসা; পদাঙ্গুণী হইতে শীতের সম্প্রসারণ, এবং পৃষ্ঠের উর্দ্ধদিকে প্রাধান্য, প্রলাপ । উত্তাপ ।—অপবাহে বা সন্ধ্যাহে উত্তাপ, দৃক শুষ্ক, অতিশয় পিপাসা, অভ্যন্তরে মানি অনুভব; পদতলে উত্তাপ, অথবা পদের শীতলতা ও পদতলের জ্বালা, শীতল স্থানে বা শয্যার বাহিরে পা বাহির করিয়া রাখা । ঘর্ম্ম ।—বাত্রিতে বা বাত্রির শেষভাগে ঘর্ম্ম, কখন কখন ঘর্ম্মাবস্থায় বমন । বিরাম ।—জ্বরের আবেশান্তে অতি-শয় অবসন্নতা । সন্নিপাত জ্বর ।—জ্বরের তরুপ্রকৃতি, কিছু বলিলে বোগীর অতি দীর্ঘে দীর্ঘে তাহা বোধগম্য হওয়া, অনেককাল পবে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান; বাত্রিতে অনিদ্রা; মস্তকের উত্তাপ ও পূর্ণতা; প্রাচীন চক্ষু প্রদাহ; কর্ণের অতিশয় পবিশুদ্ধতা; মুখাকৃতির রুগ্নতা ও পাণ্ডুবতা; ওষ্ঠের সমুজ্জল আবদ্ধতা; জিহ্বার অগ্রভাগের লোহিতবর্ণ; নাসিকা ও দন্ত-মূল হইতে বক্তপাত; নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, অবিরত পবিবর্তনশীল পুণীষ-স্রাবী, বেদনাবহীন বা কুহন সংযুক্ত অতিশয়, মলত্যাগান্তে বোগীর তৎক্ষণাৎ নিদ্রা, অতি প্রত্যুষে অতিশয়ের বন্ধি, স্বপ্ন, দুর্গন্ধ, মলিন-

লোহিত, সঙ্কর অধঃক্ষেপপ্রাপ্তী মূত্র ; কুসকুসের প্রতিশ্রাব্য ও প্রদাহ, ( বিশেষতঃ বস-প্রসেকের প্রারম্ভ সময়ে ), ঘর্ম্মশূন্য পরিপাক্ত খবম্পর্শ ত্বক্ ; ত্বকের, বিশেষতঃ পদের ত্বকের অতিশয় উত্তপ্ততা ।

## সাইকিউটা ।

সবিরাম জ্বর ।—বক্ষঃস্থলে শীতের আবস্ত এবং তথা হইতে বাহ ও জজ্বায় সম্প্রসারণ, উষ্ণতা প্রাপ্তি ও অগ্নি সেবনেব ইচ্ছা ; কেবল আত্যন্তিক যৎসানাত্ত উত্তাপ, বাহ্রিতে ও বাহ্রিব শেবভাগে প্রধানতঃ উদরে ঘর্ম্ম ।

## সাইমেক্স ।

অনিয়মিত প্রকৃতির সবিরাম জ্ববে আর্সেনিক বা ইপিকাকে উপকায না দশিলে সাইমেক্স ব্যবহার করা যাইতে পাবে ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—শীত ।—মুষ্টি শীত ও তৎপবে পিপাসা, কিন্তু তাপাতাব ; -জলপান কালে খাস কষ্ট ও খাস-রোধক কাসি, শীতের পূর্বে পিপাসা ও জজ্বার শুরুত্ব, মুষ্টিবদ্ধ হস্ত ■ প্রবল ক্রোধাবেশ সহকারে শীতের আবস্ত, শীতাবস্থায় সমস্ত সন্ধিতে বেদনা ; কণ্ঠ-রাগুলি অতিরিক্ত হ্রস্ব অমুভব ; সাধারণতঃ জাহ্নু-সন্ধিব আকুঞ্চন, তজ্জন্ত জজ্বা প্রসাবণে অশক্তি , বক্ষঃস্থলে শেবব অমুভব, তন্নিমিত্ত বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণের প্রয়োজন, দুর্নিবার নিদ্রানুতা ; হস্ত-পদ অবশবৎ অমুভব । শীতাবসানে জজ্বার একপ্রকাণে শ্রান্তি অনুভব, ও তজ্জন্ত অবিরত অবস্থানের পবিবর্তন । শীতান্তে পিপাসা , কিন্তু জলপানে প্রবল শিরো-বেদনাব উৎপত্তি ; স্বঘেষ্ট্রে কণ্ঠয়ন, তন্নিবন্ধন শুষ্ক অবিরাম কাস, উত্তাপাবস্থার শেষ পর্য্যন্ত সেই কাসেব অবস্থিতি ; খাস-কষ্ট ; বক্ষঃস্থলের মধ্য-ভাগে গোবব ও উৎকর্ষা ; জলপানে পিবত থাকিলে এই সকল উপসর্গের লাঘব । **উত্তাপ ।**—খাসগোধ সহ উত্তাপ, গুল-নলী আকৃঙ্কিত অমুভব ।

দ্রব্য ।—প্রধানতঃ মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে বর্ষা, বর্ষাবস্থায় ক্ষুধা, ও অজ্ঞাপ্ত লক্ষণের অনেকটা শাস্তি ।

## সিড্রণ ।

ডাঃ ফ্যাবিংটন বলেন যে স্নায়বীয় ও উত্তেজনশীল ব্যক্তিদিগের বোগে, বিশেষতঃ স্নায়োলোকদিগের পক্ষে সিড্রণের বিশেষ উপযোগিতা দৃষ্ট হয় । এই ঔষধ জ্বাপক জ্বর ও স্নায়ু-শূন্য লক্ষণাটিক নির্দ্ধাবিত সময়ে প্রত্যাবৃত্ত হয় । উষ্ণ-প্রধান দেশে, বা নিম্ন সজল স্থানে সন্মুংগ্ন সর্বিবাম জ্ববে সিড্রণ ব্যবহৃত হয় । অনুপস্থলেব জ্ববে আবেগিয়াব সহিত সিড্রণের কতকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয় । প্রভেদ এই যে, উষ্ণপ্রধান স্থানের জ্ববেই সিড্রণের বিশেষ উপকাৰিতা এবং শীতল ও আর্দ্র স্থলেব শীত-প্রধান জ্ববে আবেগিয়াব উৎকৃষ্ট ফলবত্তা দেখা যায় । অপর, আবেগিয়াব জ্ববে শীতের প্রাবল্য ও উত্তাপের স্বল্পতা বা অভাব থাকে । পক্ষান্তরে সিড্রণের জ্বরে মস্তকে রক্ত-সঞ্চয়, পৰ্ণায়ক্রমে মুখমণ্ডলে উত্তাপাবেশ ও শীত, এবং পূর্ণ ও দ্রুত নাক্তী সহকাৰে পৰিণত উত্তাপ থাকে । সিন্ধোনাৰ সহিতও সিড্রণের কোন কোন দিববে সাদৃশ্য আছে কিন্তু সিন্ধোনাৰ জ্ববে জ্ববেদ অবস্থাত্রয় স্পষ্ট ও বিভিন্ন থাকে কিন্তু সিড্রণের জ্ববে এক অবস্থাব সহিত অল্প অবস্থা গিমিলিত দৃষ্ট হয়, যথা শীতের সহিত উত্তাপ, উত্তাপের সহিত শীত, এবং বর্ষের সহিত শীতোত্তাপ মিশিত দেখা যায় । ডাঃ হেল বলেন যে সর্বিবাম জ্ববে মস্তকে রক্তসঞ্চয় সিড্রণ প্রয়োগেব বিশেষ লক্ষণ । ডাঃ রডক বলেন যে সিড্রণ প্রকৃত পৰ্ণায়-নিবাবক ও সানাত্ত বিষয় জ্ববে অব্যর্থ । যদি প্রতি-দিন ঠিক একই সময়ে একই প্রকাৰ জ্বর উপস্থিত হয় তবে ইহা ব্যবহেয় । ডাঃ লিলিয়াস্তাপ নিম্ন সজল স্থানের গ্ৰীষ্মকালের ম্যালেরিয়া জ্ববে, ঘটিকা বস্ত্রাঙ্কপ ঠিক একই সময় জ্বর উপস্থিত হইলে ও অজ্ঞাপ্ত লক্ষণেব সহিত একা থাকিলে ইহা স্বব্যবস্থেয় মনে কবেন । সিড্রণের শীত নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধিত ; এবং উষ্ণগৃহে ও উষ্ণ পানীয় পানে উপশান্ত হয় ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরামজ্বর ।—জ্বরের পূর্বে অতিশয় স্নায়বীয় উত্তেজনা ও তৎপবে স্নায়বীয় অবসাদন । শীত ।—মস্তকে রক্ত সঞ্চয় সহ শীত ; পৃষ্ঠে শীতের আবৃত্ত, হস্ত, পদ, ও নাসিকাব ভূষাববৎ শীত-লতা । তাপ ।—সর্ব শবীবে উত্তাপ ; প্রাত্যহিক বা দ্যাহিক জ্ব, জ্বরের পূর্বে চিত্তেব অবসাদ, হৈম্ময়েব অপ্রথরতা, এবং মধ্যাহ্ন সময়ে শিরঃ-গীড়া, খল্লী, অনন্তর উদ্ধ ও অধঃশাখায় জ্বাক্কন ও ছিন্নবৎ বেদনা, এবং হস্তপদে শীতগতা অমুভব ; মুখেব শুষ্কতা, শীতলজন্সেব অতিশয় পিপাসা, ত্বৎস্পন্দন ও দ্রুতশ্বাস, দুর্বল ও প্রচাপিত নাড়ী ; তৎপবে শুষ্ক উত্তাপ অমুভব, অনন্তর \* প্রভূত ঘর্ষ, দ্রুত ও পূর্ণ নাড়ী, এবং আবৃত্ত মুখমণ্ডল ।

বিরাম কালে মুখমণ্ডলের শীতলতা ও পাণ্ডুবতা ।

## সিনা ।

সিনা ক্রিয়ায় মুখমণ্ডলেব পাণ্ডুবর্ণ জন্মে এবং জ্ব হহলেও এই পাণ্ডু-রতা বায না । ইপিকাক ও লাইওনিয়ায়ও বদনের এই পাণ্ডুবর্ণ লক্ষণ আংশিক দৃষ্ট হয় । কিন্তু সিনাব পাণ্ডুব (ফেকাসে) বদন সহকাবে প্রায়ই চক্ষুব চারিদিকে ব্লকবর্ণ মণ্ডল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । নয়নতাবা প্রসারিত হয় । বালক নিদ্রাকালে দন্ত কড় মড় কবে । নাসিকা খুঁটে বা নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করে । সে অস্থিভ ভাবে নিদ্রা যাইতে পাবে না, ও নিদ্রাব-স্থায় চিৎকার কবিবা উঠে । তাহার জিহ্বা পবিদ্ধাব থাকে । ইপিকাকেব লক্ষণেও কখন কখন জিহ্বাব পবিচ্ছন্নতা দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু ইপিকাকে বম-নেব অধিকতর প্রাবল্য থাকে । পূর্ববর্ণিত লক্ষণ কয়টি সিনার সাধাবণ লক্ষণ অর্থাৎ সিনাক্রাপক প্রায় সকল বোগেই উহাবা বর্তমান থাকে । সিনার লক্ষণের সহিত বোগীব সিনাসূচক প্রকৃতিও বিদ্যমান থাকে । যে সকল বালকেরা উত্তেজনশীল, স্নায়বীয়, খিটখিটে ও অবাধ্য এবং কাহা-কেও কাছে আসিতে দিতে চায়না, তাহাদেব পক্ষেই এই ঔষধ উপযোগী । সিনাক্রাপক বোগী নড়িমা চড়িয়া বেড়াইলে ভাল থাকে । এন্টিমোনিয়ম

ক্রুডম ও সিনাব লক্ষণে কতকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু সিনাব জাতি এন্টি-ক্রুডের জিহ্বা পবিচ্ছন্ন থাকেনা চূর্ণকামকবার জায় শুভ্র লেপারত থাকে । সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্ববে, বিশেষতঃ ক্রমি উপসর্গে সিনা বা স্যাণ্টোনিন ব্যবহৃত হয় । শীতাবস্থায় পিপাসা, এবং কখন কখন বা দাঁড়া-বস্থায় পিপাসা, অব্যব উত্তাপাবস্থায়ও মুখমণ্ডলেব পাণ্ডুবর্ণ ; অপিচ বমন, ও অতিবিক্তি ক্রুধা এবং পরিষ্কার জিহ্বা সিনাব প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরামজ্বর ।—শীত ।—সকল শীত, উষ্ণ অগ্নিকুণ্ডের নিকটেও শীত, শরীরের উর্দ্ধাংশ হঠাতে মস্তকে শীতের উত্তিতি ; মুখমণ্ডলেব \* পাণ্ডুবতা ও শীতলতা ; হস্তেব উষ্ণতা । উত্তাপ ।—সমগ্র মুখমণ্ডলে জ্বালাকব উত্তাপ, ও শীতল পানীয় দ্রবোব পিপাসা । ঘর্ম্ম । কপালে, নাসিকােব চতুর্দ্ভিজে, ও হস্তে, সাধারণতঃ \* শীতল ঘর্ম্ম । ঘর্ম্মান্তে ভূক্তদ্রব্য \* বমন, ও সেই সময় অতিরিক্ত ক্রুধা । ঐকাহিক জ্বব ।

## সিপিয়া ।

গর্ভাবস্থা বা স্মৃতিকাবস্থায় সবিরামজ্ববে, এবং স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের বোগ বা ষকৃৎতের বোগ গ্রস্তা দিগেব পুৰাতন জবে সিপিয়া ব্যবহৃত হয় । ডাঃ মেয়াব বলেন যে সংক্ষেপতঃ সিপিয়াব মুখ্য-ক্রিয়া বশতঃ শৈবিক রক্তসঞ্চয় উৎপন্ন হয় এবং এই মুখ্য ক্রিয়াব উপবই ইহাব অন্ত্যান্ত স্থানিক ক্রিয়া নির্ভব কবে । পীত-ঘর্ণ চিহ্ন বিশিষ্ট, মস্তিকা বা মোসেব জাতি মুখাকৃতি ; শরীরের কোমলাংশেব শীততা, মানসিক অবসাদ ও ওদাসিত্ত সিপিয়ায় প্রধান প্রয়োগ-লক্ষণ । সিপিয়াব লক্ষণ অপবাহে, ও বিশ্রামে বর্দ্ধিত ; এবং উত্তাপ প্রয়োগ, ও প্রবল ব্যায়ামে উপশমিত হয় ।

সবিরাম জ্বর ।—শীতাবস্থায় পিপাসা, অথবা একেবারেই পিপাসা-  
ভাব ; হস্তের অবশতা, অনাবৃত বায়ুতে ও সঞ্চালনে উহার বৃদ্ধি ; উত্তাপা-  
বস্থায় তাপের উর্দ্ধে উত্থান, কিম্বা তপ্তজল গাত্রে ঢালিয়া দেওয়ার স্থায় অমু-  
ভব ; কপিশ ও দুর্গন্ধি মুত্র ; দুর্গন্ধি অম্ল নৈশঘর্ম ।

## সিলিসিয়া ।

একাদশী হইতে অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় জরের পুনরুৎপত্তি ; পদ-তলের  
ঘর্ষাবরোধ জনিত জ্বর ; বিলেপীজ্বর, ক্রিমি-জ্বর ; এবং দৌকাগীন জরে  
সিলিসিয়া ব্যবহৃত হয় । সিলিসিয়ার সমস্ত লক্ষণই শীতলতায় বদ্ধিত ও  
উষ্ণতায় উপশমিত হয় । কেবল উষ্ণ আহার্য্য দ্রব্যে অপ্রবৃত্তি ও শীতলদ্রব্যে  
প্রবৃত্তি লক্ষণে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় । কেবল মস্তকে ঘর্ম সিলিসিয়ার  
একটী বিশেষ লক্ষণ ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—শীত ।—অধিক শীত,  
গাত্রবস্ত্র খুলিলে ও নড়িলে চড়িলে শীতের বৃদ্ধি, আভ্যন্তরিক শীত, গানের  
শীতলতা, বিশেষতঃ নাসিকা, বাহ, এবং জাম্বু হইতে চরণ পর্য্যন্ত তুষারবৎ  
শীতল ; পৃষ্ঠদিয়া শীতের উপর হইতে নীচে অবতরণ ; পবে প্রচণ্ড উত্তাপ ও  
উদরের ক্ষীণতা ; শীতাবস্থায় অতিশয় ক্ষুধা, ও আমাশয়ে বেদনা ; শীতের  
মধ্যে মধ্যে তাপাবেশ । উত্তাপ ।—তৃষ্ণা, শীতামুভব, ও শ্বাস-হ্রস্বতা সহ  
সর্ব্বাঙ্গীন উত্তাপ ; মস্তকে প্রবল উত্তাপ ; দিবসে বলকে বলকে উত্তাপাবেশ,  
অনন্তর অন্নঘর্ম ; সারারাত্রি অতিশয় উষ্ণ ও শ্বাস-কষ্ট । ঘর্ম্ম ।—রাত্রিতে  
সর্ব্বশরীরে প্রভূত ঘর্ম্ম ; কেবল মাত্র মস্তকে ও মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম ; অম্ল বা  
দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম, সামান্য পরিশ্রমে ঘর্ম্ম নিঃসরণ ; অথবা একেবারে ঘর্ম্মের  
অভাব । বিলেপীজ্বর ।—মলিন মুখাকৃতি ; শুষ্ক হ্রস্বশ্বাস ; শীর্ণতা ;  
ক্ষুধাহীনতা ; সামান্য বা প্রাতে জরের উত্তাপ, শ্বাস-হ্রস্বতা ; দুর্ব্বলতা, বিশে-  
ষতঃ সন্ধিস্থানে ; দীর্ঘকাল স্থায়ী শূন্যপ্রাব ; নৈশঘর্ম্ম । সম্মিপাত জ্বর ।—  
অতিশয় দুর্ব্বলতা, প্রভূতঘর্ম্ম, ত্যাগিত প্রয়োগের প্রবল-ইচ্ছা ও তদ্বারা দুর্ব্ব-  
লতার উপশম ; ধীরে ধীরে আরোগ্যোন্মুখতা, ব্রণ-শোধ ও ফোটকের



উৎপত্তি এবং তদ্বারা আভ্যন্তরিক বিষের বহির্গমন ও ক্রমে ক্রমে রোগের মোচন ।

## শ্রাবাডিল ।

শ্রাবাডিলার ক্রিয়ায় ঐশ্বরিক ঝিল্লীই বিশিষ্টরূপে আক্রান্ত হয় । কৃমির লক্ষণ ও কৃমিজনিত ন্যায়বীয় লক্ষণে ; ও অসম্পূর্ণ বিষমজবে অর্থাৎ জরের অবস্থাত্তয় যথানিয়মে প্রকাশিত না হইলে, এবং নবভম্বিকা ও পলসেটিলার জ্বায় আমাশয়ের বিশৃঙ্খলার লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে শ্রাবাডিল দ্ব্যবহৃত হয় । প্রথমে দক্ষিণপার্শ্বে, পরে বামপার্শ্বে রোগ-লক্ষণের প্রকাশও এই ঔষধের একটা লক্ষণ ।

**জ্বরের লক্ষণ ।** —নবিরাম জ্বর ।—কেবল তীব্র শীত, অত্যন্ত তৃষ্ণা অথবা তৃষ্ণার অভাব, শুষ্ক আক্ষেপিক কাস, শীতাবস্থায় অস্থিতে ছিন্নকর বেদনা, প্রলাপ, নিদ্রা ; বদনে বলকে বলকে উত্তাপাবেশ, শরীরের অবশিষ্টাংশে শীত, হস্ত-পদ শীতল, উত্তাপাবস্থায় অঙ্গ-মর্দ (আড়ামোড়া ভাঙ্গা) । ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে জ্বরের উপস্থিতি (সিড, আবেণ) । বিবাম-কালেও অবি-ন্নত শীত শীত অনুভব ।

## শ্ৰামুকস ।

শ্রামুকসেব ক্রিয়ায় প্রতিশ্রায় ও দুর্বলকর প্রভূত ঘর্ম উৎপন্ন হয় । এজন্য ঘর্ম-প্রধান সবিরাম জবে ইহা প্রয়োজিত হয় । ডাঃ সারল বলেন যে নিদ্রা-কালে আরক্ত ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল, সর্বশরীরেব ঘর্মশূন্য উত্তাপ, হস্ত-পদের শীতলতা ; নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবামাত্র মুখমণ্ডলে প্রচুর ঘর্ম, অনন্তর সর্বশরীরে ঘর্মোৎপত্তি ; জাগ্রতাবস্থায় অল্প বা অধিক ঘর্মজ্বাব ; এবং পুন-রায় নিদ্রাকালীন ঘর্মপরিশূন্য উত্তাপ এই ঔষধের বিশেষ নির্বাচন-লক্ষণ । চায়নার জরেও প্রচুর ঘর্মজ্বাব লক্ষণ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু চায়নার ঘর্মে রোগীই অতিশয় দৌর্য্যল্য জনে, শ্রামুকসেব ঘর্মে তত দুর্বলতা উৎপন্ন হয় না ; অধিকন্তু চায়নার লক্ষণে ঘর্মাবস্থায় পিপাসা বিদ্যমান থাকে, শ্রামুকসে

থাকেন। শীতের পূর্বে বিবমিষা ও তৃষ্ণা সহকারে গভীর শুষ্ককাস শ্বাস-কসের আর একটা বিশেষ ব্যবস্থা-লক্ষণ। শীতের পূর্বে ও শীতাবস্থার বির-ক্রিকর শুষ্ককাসে সাধারণতঃ রসটক্স ব্যবহৃত হয়। সিক্কোনা, ও সলফারেও রসটক্স জ্ঞাপক এই কাস লক্ষণ আছে। শ্বাসকসের কাস শীতের পূর্বে উপ-স্থিত না হইলে শীত ও উত্তাপাবস্থায়ও প্রকাশ পায়। এই ঔষধের লক্ষণ বিশ্রামকালে বিবদ্ধিত; এবং সকলনে; ও শয্যায় উঠিয়া বসিলে উপশমিত হয়।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—শীতের পূর্বে বিবমিষা ও পিপাসা সহ অল্প ঘণ্টাব্যাপী শুষ্ক কাস; ঘর্ম্ম। অনন্তর সর্বশরীরে শীত এবং স্থানে স্থানে স্ফুটস্ফুটি অল্পভব, পিপাসাশূন্য শুষ্ক ( ঘর্ম্মহীন ) উত্তাপ; উত্তাপাবস্থায় শয়নান্তে গাত্রাবরণ খুলিতে অপ্রবৃত্তি; দিবাভাত্তি \* প্রভূত, দুর্ব্বলকর ঘর্ম্ম, বিবামাবস্থায়ও ঘর্ম্ম। শর্দিজ্বর ।—শিউরিগেব প্রতিনিয়তঃ শ্বাস যেন বন্ধ হইতেছে একপভাবে শিশু যদি সহসা চমকিত হইয়া উঠে তবে শ্বাসকস ব্যবহৃত হয়। বিলেপীজ্বর ।—কাশি, লবণাক্ত বা মিষ্ট নিম্বেবন, বক্ষঃস্থলে বেদনা; নৈশঘর্ম্ম ।

## হাইওসায়েরমাস ।

স্বায়মীয়া উত্তেজনা ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াধিক্য হাইওসায়েরমাসের প্রকৃতি-গত প্রধান লক্ষণ। এই ঔষধের বিশেষ প্রকৃতি এই যে এতজ্ঞাত আক্ষেপ, উন্মাদ, প্রলাপ, কাস, ও নিদ্রাশূন্যতার সহিত প্রায়ই জব থাকে না। বেলে-ডোনায়ে জর থাকে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া-বিকারেই হাইওসায়েরমাস অধিক প্রয়োজিত হয়। হাইওসায়েরমাসে বেলেডোনার শ্বাস গ্রীবার ধমনীর প্রবল দপদপ এবং বদন ও নথনেব রক্তপূর্ণতার তত তীব্রতা থাকে না। বেলেডোনা অপেক্ষা নিস্তেজ প্রকৃতির বোগেই হাইওসায়েরমাস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগের প্রাবল্যাবস্থায় প্রলাপের প্রমত্ততা ও প্রচণ্ডতা থাকিলে বেলেডোনা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রোগের প্রবর্তিত অবস্থায় যখন অচৈতন্যের সমধিক প্রাবল্য জন্মে, রোগী শয্যা-বস্ত্র বা হস্তাঙ্গুলী গুলি একপ্রকার নিজাববিশ্লেষিত শ্বাস খুঁটিতে থাকে, এবং কখন কখন কিছু যেন

ধরিতেছে, একপভাবে শূন্য হস্ত প্রসারণ কবে তখন হাইওসায়েনাসই উপ-  
যোগী । হাইওসায়েনাসের রোগীর আলোকে বিশেষ বিদ্যেয় ; এবং কেহ  
দিশ খাওয়াইবে বা বিশ্বাসঘাতকতা করিলে বলিয়া অতিশয় আশঙ্কা থাকে ।  
শরীরের পেথী, চক্ষু, অক্ষিপট, এবং মুখমণ্ডলের স্পন্দন ও আক্ষেপ ; আক্ষে-  
পিক শুষ্ককাস, শয়ন করিলে সর্কসাই উহার বৃদ্ধি, এবং উঠিয়া বোজা হইয়া  
বসিলে উপশম, অনাবৃত থাকিতে ইচ্ছা ; শুষ্টাঙ্গের বস্ত্রোন্মোচন, প্রভৃতি  
এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ । ইহার লক্ষণগুলি সন্ধ্যাকালে, খানাহারান্তে,  
উষ্ণগৃহে, ও শত্ৰুকালে বিবর্তিত, এবং অদনত হইলে, ও তামাক খাইলে  
উপশমিত হয় ।

**জ্বরেরলক্ষণ ।**—সবিরামজ্বর ।—পা হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত,

বক্ত-সঞ্চয় জনিত শীত ( কজেষ্টিভ চিল ) ; শয্যায় শবীর উত্তপ্ত হয় না ; এক  
দিন পব একদিন পূর্বাঙ্ক ১১টাব সময় শীত, কাহারও কথা ভাল লাগেনা ।  
অথবা সামান্য গোলমাল শুনিতে পালা যায় না ; পণ্যায়ক্রমে শীতোত্তাপ ;  
জলপানে অনিচ্ছা ; সমস্ত রাত্রি জ্বালাকব উত্তাপ, তৎসহ ছিন্নকব কাস ;  
মুখে শ্লেষ্মা ও ছবিত আশ্বাদের বৃদ্ধি ; প্রধানতঃ জজ্বায় বর্ষ ; \* অগম্মা-  
রের ত্রায় আক্ষেপ ; \* চাতুর্থক জ্বর । সন্নিপাত জ্বর ।—ভয়বশতঃ  
ছুটিয়া যাইবার চেষ্টা সহকারে গুণ্ণবায়ুৎ ও দুর্বলতা জনিত প্রলাপ ;  
সম্পূর্ণ চৈতন্যহীনতা, ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞানপাবিশূন্যতা ; বহির্জগত সন্দ্বন্ধে বোগীব  
সম্যক জ্ঞানশূন্যতা, যেন অন্তর্জগতেই বাস কবিতেছে তাহার একপ করনা  
ও ভ্রম-দৃষ্টি-পূর্ণতা, কিছু জিজ্ঞাসা কবিলে প্রকৃত উত্তরদান, কিন্তু  
পুনবায় তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য ও প্রলাপ, জাগ্রত অবস্থায়ও প্রলাপ, এবং  
অবর্তমান ব্যক্তিদিগকে দর্শন ; অস্পষ্ট ও মূহ বাবদুকতা, শয্যাবস্ত্র খুঁটন  
সহকায়ে মূহপ্রলাপ ; দৃশ্যমান সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃতি সহকারে চতুর্পার্শ্বস্থ বস্তুর  
প্রতি অবিবত একদৃষ্টিপাত, অথবা অতিশয় অস্থিরতা সহ ছুটিয়া ছুটিয়া  
যাইবার বা লুকায়িত থাকিবাব ইচ্ছা ; আবরু ও প্রদীপ্ত স্থির-দৃষ্টি বিশিষ্ট,  
ঘূর্ণিত চক্ষু ; ত্রিধাগদৃষ্টি ; বধিরতা, বিকৃতবদন, হতবুদ্ধিৎ মুখাকৃতি :  
গোহিত বা কণিশ, পরিণুক্ত ও বিদ্যাবিত, তন্ত্রিত জিহ্বা, নির্বাকতা বা

অস্পষ্ট বাক্য ; মুখ হইতে পিত্তদেহের দ্বারা দুৰ্গন্ধ নির্গমন ; শ্বাস্য অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে মলস্রাব ; মূত্রনাশ বা মূত্র-রোধ ; অনিচ্ছায় মূত্র-স্রাব ; বারম্বার মূত্র-প্রবৃত্তি, কিন্তু মূত্রত্যাগে অশক্তি ; মলম্বার ও মূত্রাশয়ের মুখাবরক-বেশীর পক্ষাঘাত ; আক্ষেপিক গতি ; দস্তে দস্তে সংঘর্ষণ ; উৎক্ষেপণ , কণ্ডুবা-স্পন্দন ; কম্পন ; মুহুঃপ্রলাপসহ অনিদ্রা বা অবিরত নিদ্রা ; জাগ্রত তন্দ্রা ( কোমাদিজিল ) ; বুক 'ও উদরের উপর গোলাপী-রঙ্গের পীড়কা । সমগ্র শরীর যন্ত্রের নিশ্চেষ্টতা । সূতিকাজ্বর । — ভাব-বৃত্তির উত্তমতা বশতঃ রোগেব বিকাশ ; \* আক্ষেপিক লক্ষণ, দেহ-শাখা, বদন, চক্ষু পাভাদির উৎক্ষেপণ ; সপ্রলাপ সন্নিপাতাবস্থা ; পাত্তবস্ত্র উন্মোচন, বিবস্ত্র হইবার ইচ্ছা ।

## হিপার মলফার ।

স্বায়ম্ভুলে হিপারের কতকটা ক্রিয়া দর্শে । সেই ক্রিয়া বশতঃ স্বায়ুব অতিরিক্ত অমুভবাদিক্য জন্মে । স্তবৎ বোগীর বেদনামসহ হয়না এবং কখন কখন বেদনায় মূচ্ছাও জন্মে । প্রদাহিত স্থান ঘূর্ষবৎ অমুভূত হয় এবং উহাতে এমনই স্পর্শ-দেষ বিদ্যমান থাকে যে রোগী হস্ত বা পরিচ্ছদের স্পর্শ পর্যাঙ্ক সহ করিতে পারে না । এই অতিরিক্ত অমুভবাদিক্য হিপারের সার্বভৌমিক বিশেষ লক্ষণ । হিপার জ্বাপক সকল রোগেই এই লক্ষণটী বর্তমান থাকে । ধাতু-দ্রব্যের বিষ নাশে হিপারের প্রধান অধিকার ।

**জ্বরের লক্ষণ ।**—সবিরাম জ্বর ।—সাধারণতঃ সামান্য জ্বর, শীতের পূর্বে মুখে তিক্ত আশ্বাদ ; অনাবৃত বাবুতে অভিশয় শীত ; \* শীতের পূর্বে ও শীতাবস্থায় কণ্ডুয়ন ও হলবেধ বিশিষ্ট শীতপিত্ত, তখন অবিরত আবৃত থাকিবার ইচ্ছা ; ঘর্ম্ম এবং অল্পমাত্র অনাবৃত হইলেই পুনরায় শীত ; বদনের আরক্তিমা ও সারারাত্রি প্রবল পিণাসা সহকারে গুরু উত্তাপ ; ঘর্ম্ম সহকারে কলকে কলকে তাপাবেশ ; মুখের চতুর্দিকে অর-ফোট ; \* দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত শান্তিশূন্য ঘর্ম্ম ; দিবাভাগে সামান্য

মানসিক পরিশ্রমে বা শারীরিক সকলনের পর সহজে ঘর্ম্মশ্রাব ; শীতল,  
আঠা আঠা, অনেক সময় অগ্ন বা দুর্গন্ধি ঘর্ম্ম ; জিহ্বা-পৃষ্ঠে শুষ্ক কর্ম্মের  
ভ্রায় লেপ ।

